



אודות לקמבי®

חברת מידע למטופלים
והמלווים שלהם



למד למה לצפות לפני, במהלך
ולאחר הטיפול בלקמבי.





- 4..... מהי מחלת אלצהיימר?
- 4..... מהי לקמבי?
- 5..... כיצד הרופא יחליט אם לקמבי מתאימה לך
- 6..... הבנת משמעות הרקע הגנטי
- 7..... הטיפול בלקמבי בעירוי
- 8..... הכנה לקראת העירוי
- 9..... למה לצפות במהלך העירוי?
- 11..... מעקב ובדיקות
- 13..... תופעות לוואי אפשריות נוספות של לקמבי
- 14..... מהם המרכיבים בלקמבי?

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, רוב חוברת המידע נוסחה בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

מהי מחלת אלצהיימר?

מחלת אלצהיימר היא מחלת מוח ניוונית המחריפה עם הזמן וגורמת לבעיות בזיכרון, תקשורת וחשיבה.

הרופא שלך עשוי לעשות שימוש בבדיקות המיועדות להעריך את בריאות המוח ולסייע בבירור אם התסמינים שלך נובעים ממחלת אלצהיימר בשלביה המוקדמים. הוא יסביר לאילו בדיקות תזדקק כדי לוודא שלקמבי מתאימה לך.

מהי לקמבי?

לקמבי היא תרופת מרשם המיועדת לאנשים עם מחלת אלצהיימר.

למי מיועדת לקמבי?

לקמבי מיועדת לאנשים בשלבים המוקדמים של מחלת אלצהיימר, שכוללת:

- פגיעה קוגניטיבית קלה (MCI) בשל מחלת אלצהיימר
- דמנציה קלה על רקע מחלת אלצהיימר

אין להשתמש בלקמבי אם אתה סובל מתגובות אלרגיות חמורות ללקנמאב או לכל אחד מהמרכיבים האחרים בלקמבי (ראה "מהם המרכיבים בלקמבי?").

כיצד הרופא יחליט אם לקמבי מתאימה לך

מאחר שאופן הפעולה המיוחס ללקמבי הוא פינוי חלבוני עמילואיד מזיקים, לרבות רבדים עמילואידיים במוח, הרופא ישתמש באחת הבדיקות שלהלן להעריך הצטברות עמילואיד במוח:

- **בדיקת נוזל מוחי-שדרתי (CSF):**

בבדיקה זו ניטלות דגימות מהנוזל הנמצא סביב המוח וחוט השדרה.

- **סריקה באמצעות טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים (PET):**

בבדיקה זו נעשה שימוש במכונה מיוחדת המצלמת את המוח.

טרם קבלת לקמבי, דווחי לרופא על כל המצבים הרפואיים שלך, לרבות:

- אם את בהיריון או מתכננת להרות. לא ידוע אם לקמבי יזיק לעובר. דווחי לרופא אם הרית במהלך הטיפול בלקמבי.

- אם את מניקה או מתכננת להניק. לא ידוע האם לקנמאב (המרכיב הפעיל בלקמבי) עובר לחלב אם.

שוחחי עם הרופא על הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך במהלך הטיפול בלקמבי.

הבנת משמעות הרקע הגנטי

אנשים מסוימים הם בעלי גורם סיכון גנטי העלול להגביר את הסיכון לממצאי חימוט חריגים הקשורים לעמילואיד (ARIA). שוחח עם הרופא לגבי בדיקות המיועדות לבחון אם יש לך גורם סיכון זה.

דווח לרופא על כל התרופות שאתה נוטל, לרבות תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים ותוספים צמחיים. במיוחד יש לדווח לרופא אם אתה נוטל תרופות להפחתת ההיווצרות של קרישי דם (תרופות אנטי-תרומבטיות, לרבות אספירין). בקש מהרופא רשימה של תרופות אלו אם אינך בטוח מה הן. עליך להכיר את התרופות שאתה נוטל. שמור את רשימת התרופות הללו כדי להראות אותה לרופא ולרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

תרופות מסוימות עלולות להגביר את הסיכון לדימום באזורים גדולים יותר במוח, במטופלים הנוטלים לקמבי. שוחח עם הרופא כדי לברר אם אתה נוטל תרופות המגבירות סיכון זה.



הטיפול בלקמבי בעירו

הבנת תהליך העירו יכולה לעזור לך להתכונן לטיפול העתידי.

כיצד ניתנת לקמבי, כמה זמן נמשך הטיפול והיכן תקבל אותו:

לקמבי ניתנת בעירו תוך-וריד (IV). משמעות הדבר היא החדרת מחט לווריד בזרוע לצורך מתן התרופה. העירוים יינתנו במרכז רפואי, שבו ניתנות תרופות בעירו.



כל עירו נמשך כשעה אחת, אך תיתכן שהייה ממושכת יותר במרכז הרפואי.



העירו ניתן פעם אחת כל שבועיים. אם החמצת עירו של לקמבי, עליך לקבל את המנה הבאה בהקדם האפשרי.



הכנה לקראת העירוני

מה להביא:

- בגדים עליונים או שמיכה למקרה שתרגיש קור
- משחק, חומר לקריאה או לצפייה
- מטענים למכשירים ניידים
- אוכל ובקבוק מים

זכור:

- שתה כמות מים רבה לפני הטיפול.
- לבש בגד עם שרוולים קצרים או חולצה עם שרוולים הניתנים לקיפול כלפי מעלה להקלת מתן העירוני.
- אם ברצונך להגיע עם בן משפחה שישהה לצידך במהלך העירוני, אנא ודא שהדבר מותר.

למה לצפות במהלך העירו

התהליך המדויק עשוי להשתנות בהתאם למקום שאליו תגיע לעירו לקמבי.

שלב 1

איש צוות רפואי יבדוק סימנים חיוניים, כגון טמפרטורת גוף ולחץ דם, יתכן וימדד משקלך.



שלב 2

איש צוות רפואי יכין את התרופה, יחבר את הצנתר התוך-ורידי ויתחיל את העירו. במהלך קבלת התרופה, שים לב להרגשתך ודווח לאנשי הצוות על כל חשש.



שלב 3

לאחר סיום העירו, איש צוות רפואי יסיר את הצנתר התוך-ורידי. לאחר מכן, אנשי הצוות יאמרו לך מתי תוכל לעזוב וכיצד לקבוע מועד לעירו הבא.



תגובות הקשורות לעירוי הן תופעות לוואי אפשריות של הטיפול בלקמבי. אלו כוללות: חום, תסמינים דמויי שפעת (צמרמורת, כאבים בגוף, תחושת רעד וכאבי מפרקים), בחילות, הקאות, סחרחורת או תחושת סחרור, שינויים בקצב הלב או תחושת הלמות בחזה, שינויים בלחץ הדם, קושי בנשימה או קוצר נשימה. דווח לרופא או לצוות הרפואי מיד אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה. הם ידריכו אותך מה ניתן לעשות ואם ישנה תרופה שעשויה לעזור.

תגובות אלרגיות חמורות, הכוללות נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה או בלשון, סרפדת, או קושי בנשימה, נצפו במהלך עירוי לקמבי. דווח לרופא אם אתה חווה תסמינים כלשהם של תגובה אלרגית חמורה במהלך או לאחר העירוי של לקמבי. עקוב אחר הרגשתך בזמן ולאחר העירוים. דווח לאיש צוות רפואי מיד אם מתפתחת תופעה כלשהי.

אם תסבול מתגובה הקשורה לעירוי, הרופא עשוי:

- להתאים את קצב הזרימה או לעצור את העירוי.
- לתת לך תרופות לטיפול בתגובה הקשורה לעירוי. תרופות אלו עשויות לכלול אנטי-היסטמינים, תרופות נוגדות דלקת או סטרואידים.
- לתת לך תרופות, לפני העירוים העתידיים של לקמבי, להפחתת הסיכוי להופעת תגובה הקשורה לעירוי. תרופות אלו עשויות לכלול אנטי-היסטמינים, תרופות נוגדות דלקת או סטרואידים.

מעקב ובדיקות

במהלך הטיפול בלקמבי, הרופא יבצע מעקב רפואי. כמו כן, הוא יעקוב אחר הופעת תופעות לוואי. אחת מתופעות הלוואי האפשריות היא ממצאי דימות חריגים הקשורים לעמילואיד או ARIA (ראה "תופעות לוואי אפשריות נוספות של לקמבי"). הרופא יעקוב אחריו לזיהוי ARIA באמצעות סריקת דימות בתהודה מגנטית (MRI) טרם תחילת הטיפול ולפני עירוני מספר 3, 5, 7 ו-14.

כנה לרופא או גש לחדר המיון בבית החולים הקרוב ביותר מייד אם אתה חווה כאב ראש, בלבול, סחרחורת, שינויים בראייה, בחילות, קושי בהליכה או פרכוסים. עליך ליידע את אנשי הצוות הרפואי שלך שאתה מקבל לקמבי, שעלולה לגרום ל-ARIA, וכן ליידע כי התסמינים של ARIA עלולים להיראות דומים לתסמינים של שבץ.

התמדה בטיפול ומעקב אחר התקדמותך

חשוב להתמיד בכל חלק של תוכנית הטיפול, כולל היצמדות למועדי העירוניים.

להלן מספר עצות העשויות לעזור:

קבע מועדים לעירוויים הבאים מראש והקפד להוסיף את הביקורים ללוח השנה שלך.



עקוב אחר הרגשתך בזמן ולאחר העירוויים ודווח לרופא אם מתפתחת תופעה כלשהי.



תכנן מראש את כל הבדיקות הנוספות, כגון סריקות MRI למעקב לפני עירווי מספר 3, 5, 7 ו-14.



פנה לרופא אם החמצת עירווי. הוא יעזור לך להתאים את תוכנית הטיפול.



עבור המלווים למטופלים

סיוע בתיאום הביקורים ובדרישות הגורם המבטח יכול להקל על יקירכם בהתמדה בטיפול.

מידע בטיחותי חשוב: תופעות לוואי אפשריות נוספות של לקמבי*

הטיפול בלקמבי עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות, לרבות:

ממצאי דימות חריגים הקשורים לעמילואיד או ARIA - ARIA היא תופעות לוואי שבדרך כלל אינה גורמת לתסמינים, אולם עלולים להופיע תסמינים חמורים. מרבית המקרים, ARIA מתבטאת בנפיחות זמנית באזורים במוח, אשר על פי רוב חולפת עם הזמן. כמו כן, לאנשים מסוימים עלולות להופיע נקודות דימום קטנות בתוך המוח או על פני שטח המוח, ובמקרים נדירים, עלולים להופיע אזורי דימום גדולים יותר במוח. מרבית האנשים עם ARIA אינם חווים תסמינים; עם זאת, אנשים מסוימים עלולים לחוות תסמינים כגון כאב ראש, בלבול, סחרחורת, שינויים בראייה, בחילות, קושי בהליכה או פרכוסים.

* זוהי רשימת תופעות לוואי חלקית של לקמבי. למידע נוסף, פנה לרופא.

דיווח על תופעות לוואי חשודות של התרופה הוא חשוב. הוא מאפשר ניטור רציף, של מאזן התועלת/סיכון, עבור התרופה.

יש לדווח על כל אירוע חריג חשוד למשרד הבריאות לפי התקנה הלאומית באמצעות טופס מקוון <https://sideeffects.health.gov.il> או בדוא"ל ליחידת הבטיחות של בעל הרישום: eir_pv@eisai.net

מהם המרכיבים בלקמבי?



מרכיב פעיל: לקאנמאב.

מרכיבים בלתי פעילים:

arginine hydrochloride, histidine hydrochloride monohydrate, polysorbate 80, histidine and water for injection.

חברת זו ותוכנה אושרו על ידי משרד הבריאות
בספטמבר 2025 גרסה 02 IL-LECA-25-00030

