

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

1986 - (مستحضرات)

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

كارتيا

أقراص ذات تغليف معوي 100 ملغ

يحتوي كل قرص على:

حمض أسيتيل ساليسيليك 100 ملغ

(Acetylsalicylic acid 100 mg).

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يتوجب عليك تناول المستحضر بموجب تعليمات المقدار الدوائي في الفقرة 3. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص للمنع الأولي لمرض قلبي إكليلي لدى مرضى معرضين لخطورة عالية وللمنع الثانوي لأمراض القلب والدماغ الناتجين عن جلطة شريانية.

الفصيلة العلاجية: مضادات التخثر، مثبط تكوّس الصفائح الدموية.

يُنبط كارتيا من تكوّس الصفائح الدموية وبذلك يمنع تشكّل خثرات دموية.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● كنت حساساً (الرجي) لحمض أسيتيل ساليسيليك (المادة الفعالة) للسالييلات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية") ● كان لديك في الماضي رد فعل لأدوية معينة مضادة للألم، السخونة أو الإلتهاب (سالييلات أو أدوية أخرى مضادة للإلتهاب لا ستيررويدية)، الذي يتجلب بنوبات من الربو أو ردود فعل تحسسية أخرى ● كنت تعاني من تقرحات حادة في المعدة أو في الأمعاء ● وُجدت لديك قابلية لحدوث اضطرابات تؤدي إلى أزمة ● كنت تعاني من قصور كلوي أو كبدي ● كنت تعاني من قصور قلبي حاد غير معالج كما ينبغي ● كنت تتناول بالترزامن مينوثرينيكاس بمقدار دوائي قدره 15 ملغ أو أكثر في الأسبوع ● كنت في الثلث الأخير من الحمل وتتناولين مقداراً دوائياً يومياً أعلى من 100 ملغ (انظري فقرة "الحمل والإرضاع")

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ كارتيا، أخبر الطبيب إذا:

● كنت حساساً (الرجي) لأدوية أخرى مستكئة للألم، مضادات الإلتهاب، مضادات الروماتيزم (antirheumatic) أو لمواد أخرى تسبب الإلتهاب ● كنت تتناول أيضاً أدوية مضادة للإلتهاب لا ستيررويدية (NSAIDs)، مثل إيبوبروفن أو نابروكسين (أدوية لعلاج الألم، السخونة أو الإلتهاب). انظر الفقرة 2 "مستحضرات تضعف من تأثير الدواء" ● كنت تعاني من حساسيات أخرى (مع أعراض مثل أعراض جلدية، حكة أو شرى) ● كنت تعاني من الربو القصبي، حمى العلف (رشح تحسسي)، إنتفاخ مخاطية الأنف (زوائد أنفية) أو مرض تنفسي مزمن ● كنت تتعالج حالياً بمستحضرات مضادة للتحشّر في نفس الوقت (مثل مشتقات الكومارين أو الهيبارين، عدا الهيبارين بمقدار دوائي منخفض) ● وُجدت لديك سابقة لتقرحات في المعدة أو في الأمعاء أو سابقة لنزف في المعدة أو في الأمعاء ● كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي للكبد ● كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي الكلوي أو من تناقض تدفق الدم في القلب وفي الأوعية الدموية (مثل مرض الأوعية الدموية في الكلى، قصور القلب، تناقض حجم الدم، عملية جراحية كبيرة، خمج دموي أو حوادث نزفية ذات أهمية)، وذلك لأن حمض أسيتيل ساليسيليك يمكن أن يزيد بشكل أكبر من خطورة تضرر الأداء الوظيفي الكلوي وحدوث قصور كلوي حاد ● كنت مقبلاً على إجراء عملية جراحية، بما في ذلك عملية جراحية بسيطة (على سبيل المثال، عملية جراحية لإقتلاع السن)؛ قد تحدث زيادة في قابلية حدوث نزف. أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول كارتيا ● كنت تعلم بوجود خطر خطير بإنزيم جلوكوز - 6 - فوسفات - ديهيدرو جيناز (G6PD) ● إنخفاض مستوى ساليسيليك قد يؤدي بسرعة تفكك أو إحلال خلايا الدم الحمراء أو لنوع معين من فقر الدم. العوامل التي قد تزيد من الخطورة لذلك هي مثلاً: مقدار دوائي مرتفع، سخونة أو تلوثات حادة.

تحذيرات إضافية

● في المقادير الدوائية المنخفضة، يقلل حمض أسيتيل ساليسيلك من طرح حمض البول. هذه الحالة قد تحدث على حدوث نوبة غوت (gout) في ظروف معينة لدى مرضى لديهم ميل مسبق لحدوث ذلك ● إذا فرحت أو أصبت، فمن الجائز أن يستمر النزف لفترة أطول من المعتاد، يتعلق الأمر بطريقة في الدواء إن الجروح أو الإصابات الطفيفة (أثناء الحلاقة مثلاً) لا تشكل مشكلة عادة. في حال وجود نزف شاذ (في مكان غير معهود أو زوائد زمنية غير عادية)، استشر الطبيب ● لا يجوز تناول أدوية تحتوي على حمض أسيتيل ساليسيلك لفترات طويلة أو بمقادير دوائية عالية دون إستشارة الطبيب.

الأطفال والمراهقون

الدواء مُخصّص للكبار فوق عمر 18 سنة. يجب التوجه إلى الطبيب الذي لم هو دون هذا العمر. لا يجوز إستعمال كارتيا لدى الأطفال أو المراهقين الذين يعانون من أعراض ترافقها سخونة لا بتعليمات من الطبيب وبدون فשל وسائل علاج أخرى. إن التقيؤ المتواصل بظاهرة مثل هذا المرض قد يشكل علامة لمتلازمة راي، مرض نادر جداً لكنه يشكل خطراً على الحياة التي يتطلب علاجاً طبياً فورياً.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تتناول: مستحضرات تزيد من تأثير الدواء لدرجة إرتفاع الخطورة حدوث أعراض جانبية:

● أدوية مضادة للتحشّر الدم (مثل كومارين، هيبارين) وأدوية حالة للتحشّرات لحدوث إن حمض أسيتيل ساليسيلك قد يزيد من خطورة حدوث نزف إذا تم تناوله قبل العلاج بأدوية حالة للتحشّرات الدوائية. يجب الإبتعاد لعلامات نزف خارجية وداخلية (كدماث مثلاً) إذا كنت تتعالج بمثل هذا العلاج ● أدوية أخرى التي تثبّط تكسّس الصفائح الدموية (أدوية مثبّطة لتكسّس الصفائح الدموية)، مثل نيكلوبيدين، كلويدوبوجريل؛ زيادة خطورة حدوث نزف ● أدوية التي تحتوي على كورتيزون أو مواد شبيهة الكورتيزون (عدا تلك التي تستعمل للعلاج الموضعي أو العلاج ببدائل الكورتيزون لداء ألبوسون). تزداد خطورة حدوث نزف وتقرحات في المعدة وفي الأمعاء ● كول: زيادة الخطورة لحدوث تقرحات ونزف في المعدة وفي الأمعاء ● أدوية أخرى مسكئة للألام ومضادة للإلتهاب (مضادات الإلتهاب اللا ستيررويدية)، وأدوية مضادة للروماتيزم بمشاركة حمض أسيتيل ساليسيلك: زيادة خطورة حدوث تقرحات في الجهاز الهضمي وحدوث نزف ● أدوية الكسّر، مثل إيسونلين، تولوناميد، جليليكلايد (المسمى سوفلونيل يوريا) بمشاركة الكسّر، حمض ساليسيلك بمقادير دوائية مرتفعة: قد تتخفّض نسبة السكر في الدم ● ديجوكسين (دواء يؤدي لزيادة شدة تقلص عضلات القلب) ● مينوثرينيكاس (لعلاج السرطان وأعراض اللمفاوية معينة) ● حمض الفوليك (ميتوأل الصرع) ● أدوية لعلاج الإكتئاب من نوع SSRIs: زيادة خطورة حدوث نزف في المعدة وفي الأمعاء.

مستحضرات تضعف من تأثير الدواء:

● أدوية معينة تزيد طرح البول (المدرات البولية): مضادات الألدوستيرون، مثل سبيرولونكتون، كانثيونيد. العدرات البولية العروية مثل فوراسيميد) ● أدوية معينة لعلاج فرط ضغط الدم (خاصةً مضاد ACE) ● أدوية لعلاج النقرس (gout) التي تزيد من طرح حمض البول (مثل بروبينسيد، بنزوبرامورون) ● بعض الأدوية المضادة للإلتهاب اللا ستيررويدية (NSAIDs) (عدا حمض أسيتيل ساليسيلك، مثل إيبوبروفن ونابروكسين: إنخفاض في تأثير كارتيا على تثبّط تكسّس الصفائح الدموية والتخثر: قد يضعف من وقاية الدواء ضد النزوات القلبية والسكّنة ● ميتاميزول (مستحضر مُعدّ لتخفيف الألم والحارارة): إنخفاض مُتمثل في تأثير حمض أسيتيل ساليسيلك على تكسّس الصفائح الدموية عند تناول كلا الدوائين معاً. لذلك، يجب إستعمال هذا المزيج بحذر لدى المتعلّجين الذين يتناولون كارتيا بمقدار دوائي منخفض لحماية القلب.

قبل إستعمال حمض أسيتيل ساليسيلك، أطلع الطبيب على الأدوية الأخرى التي تتناولها. إذا كنت تستعمل حمض أسيتيل ساليسيليك بشكل دائم، استشر الطبيب قبل تناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية.

لا يجوز تناول كارتيا سوية مع إحدى الأدوية التي ذكّرت سابقاً بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول خلال فترة العلاج بحضض أسيتيل ساليسيلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرعضة، إذا كان لديك شك بأنك حامل، أو إذا كنت تحظينين الحمل، فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء. إذا بدأت أو واصلت تناول كارتيا خلال فترة الحمل وفقاً لتعليمات الطبيب، فلا يجوز تناول مقدار دوائي أعلى ملى وصفه الطبيب.

الحمل

في الثلث الأخير

خلال الثلث الأخير من الحمل، لا يجوز تناول أكثر من 100 ملغ من كارتيا في اليوم، وذلك بسبب خطورة حدوث ضرر للجنين أو مشاكل أثناء الولادة. قد يؤدي هذا المستحضر إلى مشاكل في الكلى والقلب لدى الجنين. وقد يكون هناك تأثير على الميل إلى حدوث نزف لدى الجنين وعلى الأم الأمر الذي يؤدي إلى تأخر وألم أثناء في مدة الولادة عن المتوقع. إذا كنت تتناولين حمض الأسيتيل ساليسيلك (المادة الفعالة في كارتيا) بمقدار دوائي منخفض (حتى 100 ملغ في اليوم)، فستتكون

هناك حاجة لمتابعة حثيثة أكثر للحمل، وذلك بحسب توصية الطبيب (راجعى أيضاً) فقرة 3 "يجوز إستعمال الدواء إذا:".

في الثلث الأول والثاني

لا يجوز تناول كارتيا في الثلث الأول والثاني من الحمل إلا عند الضرورة فقط بموجب تعليمات الطبيب. إذا كنت بحاجة إلى علاج خلال هذا فترة أو أثناء محاولتك الحمل، فيجب إستعمال أقل مقدار دوائي ممكن لأقصى وقت ممكن. بدءاً من 20- من الحمل، إذا كنت تتناولين كارتيا لأكثر من بضعة أيام، فمن الجائز أن يسبب المستحضر مشاكل في كلى الجنين، مما قد يؤدي إلى قلة السائل الأمنيوسي المحيط بالطف (قلة السائل السلولي)، أو إلى تضيق إحدى الأوعية الدموية (ductus arteriosus) في قلب الجنين. قد يحدث هذا العرض قريباً لموع بدء العلاج بـ كارتيا وعلى الأغلب ما يكفي من السائل لتعسّق عند إيقاف العلاج بالمستحضر. إن ما تشخيص قلة السائل الأمنيوسي والأوعية الدموية في قلب الجنين، فمما قد يرافق العلاج بـ كارتيا فوراً. إذا كنت بحاجة إلى علاج لأكثر من بضعة أيام، فقد يوصي الطبيب بمراقبة حثيثة أكثر (مع التشديد على كمية السائل الأمنيوسي والأوعية الدموية في قلب الجنين).

الإرضاع

إن حمض أسيتيل ساليسيلك ومستقلباته تنتقل بكميات قليلة إلى حليب الأم. لم يُبلّغ حتى يومنا هذا عن أية تأثيرات سلبية على الرضيع وذلك لا حاجة بالتوقف عن الإرضاع طالما أن المقدار الدوائي اليومي لا يزيد عن 150 ملغ. مع ذلك، عند إستهلاك مقادير دوائية أكبر (أعلى من 150 ملغ لليوم) يجب التوقف عن الإرضاع.

السيسا وإستعمال المكملات

لا حاجة بإتخاذ وسائل حذر خاصة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي كارتيا على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) في كل قرص، وبذلك يعتبر "خال من الصوديوم".

يحتوي كارتيا على المادة غير الفعالة Sunset Yellow FCF Aluminium Lake التي تعرّف أيضاً بـ FD&C Yellow #6، حيث قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج المستحضّر.

المقدار الوائى الإعتيادي عادة هو: قرص واحد لليوم.

يجب تناول القرص الأول وفق اليوم المُعلّم على ظهر اللوحة (بليستر).

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

كارتيا مخصّص للإستعمال طويل الأمد. يتوجب على الطبيب المعالج تحديدا مدة العلاج.

طريقة تناول

يجب بلّ القرص بشكّه الكامل مع الكثير من الماء قبل وجبة الطعام بنصف ساعة على الأقل.

منوع سحق، مضغ أو شطر القرص وذلك لأن الدواء ذو تغليف معوي (واقي).

لا يجوز إبقاء الدواء في الفم بما يتجاوز الزمن اللازم لبلمعه.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إن الدوار ورنين الأذنين يمكن أن تكونا علامتين لحدوث تسمم خطير، خاصة لدى الأطفال والمرضى المسنين. يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا كنت تظن بأنك تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً. سوف يقرّر الطبيب حول أية وسائل يجب إتخاذها بحسب درجة المقدار الدوائي المفرط الذي تم تناوله.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدّد، فيجب مواصلة تناول المقدار الدوائي بحسب التعليمات اعلاه في الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء"، أو كما خُدد من قبل الطبيب، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقداري دواء سوية للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي!

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول كارتيا بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن في حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توقرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كارتيا قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنتهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

لا يجوز تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية المُفضّلة لاحقاً. توقف عن تناول كارتيا بلّغ الطبيب، وذلك لكي يكون بمقدوره تقييم درجة خطورة الأعراض الجانبية وإتخاذ القرار حول كيفية التصرف.

يجب التوقف عن إستعمال كارتيا فوراً عند ظهور علامات أوليّة لفرط الحساسية (انظر لاحقاً أعراض شائعة نادرة).

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10):

● مشاكل في المعدة وفي الأمعاء مثل حرقان، غثيان وتقيؤات، آلام في البطن وإسهال

● فقدان دم طفيف من المعدة ومن الأمعاء.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100):

● ردود فعل جلدية (في حالات نادرة جداً، من الجائز حدوث إحتياج حاد لطفح جلدي مع مشاركة للأشعية المخاطية وسخونة Erythema exsudativum) (multiforme) ● نزف في المعدة وفي الأمعاء. إن الإستعمال المطول بـ كارتيا قد يؤدي لحدوث فقر دم (باعتبار قلة الحديد) نتيجة فقدان دم خفي في المعدة وفي الأمعاء ● تقرحات في المعدة وفي الأمعاء، التي قد تؤدي في حالات نادرة جداً لحدوث تنقّب ● إلتهاب في المعدة وفي الأمعاء.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تلاحظ برازاً أسوداً أو تقيؤاً دمويّاً (علامات لنزف جدي في المعدة، الرجاء أنظر لاحقاً بند "إجراءات مضادة")

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000):

● ردود فعل لفرط الحساسية في الجلد، في الجهاز التنفسي، في المعدة وفي الأمعاء ● في جهاز الإلتفاف والأوعية الدموية، خاصة لدى مرضى الربو. الأعراض يمكن أن تكون: إنخفاض ضغط الدم، نوبات من صعوبة التنفّس، إلتهاب مخاطية الأنف، إسدال الأنف، صدمة تأقية (رد فعل تحسسي شديد وخطير)، إنتفاخ الوجه، اللسان والحنجرة (وذمة وعائية).

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000):

● إرتفاع في نسب إنزيمات الكبد ● خلل في الأداء الوظيفي للكلى وقصور كلوي حاد ● إنخفاض ضغط السكر في الدم (hypoglycemia) ● في المقادير الدوائية المنخفضة قد يحدث حمض أسيتيل ساليسيلك من طرح حمض البول. هذه الحالة يمكن أن تحدث على عدول نوبة نقرس (gout) في ظروف معينة لدى مرضى لديهم ميل مسبق لحدوث ذلك.

أعراض جانبية لا يعرف شيوعها بالضبط:

● صداع، دوار، إرتباك، تناقض في السمع أو طنين (ردين في الأذنين) يمكن أن تكون علامات لفرط الدوائية الدوائي، خاصة لدى الأطفال والمعتالجين المسنين (انظر "إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر") ● بلّغ عن حدوث حالات نازفة خطيرة مثل نزف في الدماغ (خاصةً لدى مرضى فرط ضغط الدم والمرافق وأرق بالعلاج المشترك مع مضادات التخثر). يُقصد ببلاغات ذات شيوع نادر حتى نادر جداً، حيث أن بعض الحالات شكلت خطرّاً على الحياة ● تفكك متسارع أو إحلال خلايا الدم الحمراء وقصر الدم من نوع معين لدى المرضى الذين يعانون من نقص شديد في جلوكوز - 6 - فوسفات - ديهيدرو جيناز (G6PD) ● نزف زعاف، نزف من اللثة،

كدمات (أنزفة دموية تحت الجلد) أو أنزفة في المسالك البولية والأعضاء التناسلية، ومن الجائز أن تحدث إطالة في زمن النزف. يمكن أن يستمر هذا العرض 4 حتى 8 أيام بعد الإستعمال • عند وجود ضرر في مخاطية الأمعاء، قد تتشكل أغشية في جوف الأمعاء التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تضيق.

إجراءات مضادة:

يجب التوقف عن تناول كارتيا إذا كنت تشعر بالأعراض المذكورة أعلاه وإبلاغ الطبيب الذي سيقدر حول أية من الإجراءات يجب إتخاذها، وفقاً لشدة العرض الجانبي. يجب التوقف عن تناول كارتيا بشكل دائم عند ظهور العلامة الأولى التي تدل على رد فعل لفرط حساسية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ الشركة بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب • لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر • لا يجوز الإستعمال إذا كانت العبوة ممزقة أو معطوبة • شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية • لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعّال أيضاً على المواد غير الفعّالة التالية:

Guar gum, Hypromellose, Methylacrylic acid copolymer, Talc, Titanium dioxide, Triethyl citrate, Sunset Yellow FCF aluminium lake, Triacetin, PEG 3350, Colloidal anhydrous silica, Sodium bicarbonate, Sodium lauryl sulfate.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: كارتيا عبارة عن قرص برتقالي اللون ذو تغليف معوي (واقى). الأقراص متوفرة ضمن عبوة لويحة (بليستر) التي تحتوي على 28 قرصاً • صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات پاداچيس إسرائيل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهم • إسم المنتج وعنوانه: أسين فارما Pty م.ض.، داندونج، فيكتوريا، أستراليا • تم إعدادها في تموز 2025 • رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 5089.26384 • من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.