

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## ספטול®

תמיסה לחיטוי ידיים 500 מ"ל

הרכב  
כלורהקסידין גלוקונט 0.5% w/v (Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v)  
אתנול 70% w/v (Ethanol 70% w/v)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
עלך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.  
היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

### 1. למה מיועדת התרופה?

ספטול הינה תמיסה לחיטוי עור הידיים.

**קבוצה תרופית:** חומרים מחטאים ואנטיספטיים.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתכשיר:**

- אם אתה גרש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים אשר מכילה התרופה. במיוחד במטופלים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלורהקסידין.
- אם קיים חשש למגע עם העיניים, המוח, קרומי המוח, האוזן התיכונה או האוזן החיצונית כאשר עור התוף מחורר.
- אין להזריק.
- אין להשתמש בפתחי הגוף (לדוגמה אף, אוזניים).
- כאשר נעשה שימוש בדיאתרמיה (סוג של מכשור ניתוחי) לאחר השימוש בספטול – יש לוודא שאין הצטברות של ספטול ושהעור וכל אריג בסביבת המטופל יבשים.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- ספטול מכיל כלורהקסידין. כלורהקסידין ידוע כגורם לרגישות יתר, כולל תגובות אלרגיות כלליות והלם אנפילקטי. השכיחות של רגישות יתר לכלורהקסידין אינה ידועה. אין להשתמש בספטול במטופלים עם היסטוריה אפשרית של תגובה אלרגית לתרכובת המכילה כלורהקסידין.
- אם התכשיר ניתן בטעות באינפוזיה – יתכן ועירוי דם יהיה הכרחי כדי לנטרל את ההמוליה.
- השימוש בתמיסות כלורהקסידין עבור חיטוי העור לפני פרוצדורות פולשניות, הן על בסיס אלכוהול והן מימיות, נקשר עם כוויות כימיות אצל יילודים. הסיכון נראה גבוה יותר אצל תינוקות שנולדו לפני הזמן, במיוחד אלו שנולדו לפני שבוע 32 של ההריון ובתוך השבועיים הראשונים לחיים.

- אין לקרב את המוצר למקורות חום או אש.
- אין להדליק סיגריה או להחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.
- אין לאפשר מגע עם העיניים בגלל חשש לפגיעה בראייה. אם נגרם מגע עם העיניים – שטוף באופן מידי ויסודי עם מים. במקרה של גירוי, אודם או כאב בעין, או הפרעה לראייה פנה לליעוץ רפואי באופן מידי. מקרים חמורים של פגיעה מתמשכת בקרנית (פגיעה בפני שטח העין) שעלולה לדרוש השתלת קרנית דווחו כאשר מוצרים דומים באו בטעות במגע עם העין במהלך פרוצדורות כיורוגיות, בחולים בהרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

### אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

#### שים לב

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש להימנע ממגע עם העיניים ורקמות ריריות. במקרה של מגע יש לטוֹף עם הרבה מים ולפנות לרופא במידת הצורך.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

#### אופן השימוש:

לנחות השימוש מצורפת משאבה, יש להסיר את פקק הבקבוק ולהבריג את המשאבה עד לסגירה מלאה.

יש לצקת 3 מ"ל (לחיצה אחת במשאבה) מהתכשיר על ידיים נקיות, לפזר התמיסה על כל משטח העור ולחכך את הידיים עד להתנדפות מוחלטת של התמיסה.

#### אם בלעת בטעות ספטול

אם בטעות בלעת מהתמיסה היועץ ברופא מה לעשות.

**אין ליטול תרופות בחושך! בודק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספטול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה ולפנות לקבלת טיפול רפואי אם מופיעות התופעות הבאות:

- כלורהקסידין יכול לעיתים נדירות מאוד לגרום לרגישות יתר כולל הלם אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השתפיים, לחץ דם נמוך).

#### תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה:

- תגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת העור, גרד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחית).
- פגיעה בקרנית (פגיעה בפני שטח העין), וזקק קבוע לעיניים כולל ליקוי ראייה קבוע (בעקבות חשיפה מקרית של העיניים במהלך ניתוחי ראש, פנים וצוואר) בחולים תחת הרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

#### תופעות לוואי ביילודים ובתינוקות:

- יתכנו כוויות כימיות ביילודים ובתינוקות (שכיחות לא ידועה).
- אם מתרחשת אחת מהתגובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מידי.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש!

**יש לאחסן מתחת ל- 25°C.**

**לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר.**

#### 6. מידע נוסף

- **נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:** Glycerin, Citron D 3009 IF, D-Gluconolactone, FD&C Blue No.1, Purified water.

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

תמיסה צלולה בצבע תכלת בעלת ריח נעים.

כל בקבוק מכיל 500 מ"ל תמיסה.

#### שם היצרן:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת.ד. 114 בנימינה, ישראל.

#### בעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ, תל אביב.

נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 029.79.25425

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

teva

SEPTOL PL SH0824



נشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986  
يسوّق الدواء بدون وصفة طبيب

## סֵפְטוֹל

מחلول לטְהוּיַר הַיַּדִּים 500 מלל

#### התרכיב

כלורהקסידין גלוקונט 0.5% w/v (Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v)  
אתנול 70% w/v (Ethanol 70% w/v)

למעومات عن المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا وُجدت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

عليك إستعمال المستحضر حسب التعليمات في فقرة المقدار الدوائي في هذه النشرة.

إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

#### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

سپتول هو محلول لטְהוּיַר جلد الیדיين.

الْفَصِیلة العِلاجیة: مواد مطهرة ومعقمة.

#### 2) قبل إستعمال الدواء

**لا یجوز إستعمال المستحضر:**

- إذا كنت حساساً (الیرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات التي یحتویها الدواء. بالأخص لدى متعالجین لديهم سابقة لردود فعل تحسسية محتملة المتعلقة بـ كلورهیكسیدین.
- إذا وُجد شك لحصول تماس مع العینین، الدماغ، أغشية الدماغ، الأذن الوسطی أو الأذن الخاریجة عندما تكون طبلة الأذن متقوِّبة.
- لا یجوز الحنق.
- لا یجوز الإستعمال في تجاويف الجسم (مثلاً الأنف، الأذنین).
- عندما یتِم إستعمال جهاز یدائزومي (نوع جهاز جراحي) بعد إستعمال سپتول – یجب التأكد من عدم تراكم سپتول ومن جفاف الجلد وكل تسیج في محیط المتعالج.

#### تحذیرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- یحتوی سپتول على كلورهیكسیدین. یُعرف كلورهیكسیدین بكونه مسبب لفرط حساسیة، یشمل ذلك ردود فعل تحسسية عامة وصدمة تأقیة. إن شیوع فرط الحساسية من كلورهیكسیدین غير معروف. لا یجوز إستعمال سپتول لدى متعالجین لديهم سابقة محتملة لرد فعل تحسسي (الیرجي) لمركب یحتوی على كلورهیكسیدین.
- إذا تم إعطاء المستحضر بالخطأ عن طریق التسریب – فمن الجائز أن یكون من الضروري نقل الدم لإبطال إنحلال الدم.
- إن إستعمال محاليل كلورهیكسیدین لטְהוּיַר الجلد قبل الإجراءات الإختراقیة، سواء على أساس الكحول أو الماء، یرتبط ذلك بحدوث حروق كیمیائیة لدى حدیثي الولادة. الخطورة تبدو أكبر لدى الرضع الذین وُلدوا قبل الأوان، بالأخص عند أولئك الذین وُلدوا قبل أسبوع 32 من الحمل وخلال الأسبوعین الأولیین من حیاتهم.
- لا یجوز تقرب المنتج لمصادر الحرارة أو النار.
- لا یجوز إشعال سیجارة أو التعرض للنار حتى جفاف المستحضر بشكل كامل.
- لا یجوز إتاحة التماس مع العینین خشية تضرر الرؤیة. إذا حصل تماس مع العینین – إغسل فوراً وجیداً بواسطة الماء. في حال حصول تهيج، إجمار أو ألم في العين، أو إضطراب في الرؤیة توجه لتلقي إستشارة طبیة فوراً. بلغ عن حالات خطيرة لإصابة مستمرة للقرنیة (تضرر سطح العين) الأمر الذي یطلب زراعة قرنیة وذلك عندما لامتست بالخطأ منتجات مشابهة العين خلال إجراءات جراحیة، لدى مرضی تحت تأثير التخدير العام (نوم عمیق بدون ألم).

#### التداخلات/التفاعلات بین الأدوية

إذا كنت إستعمل، أو إذا إستعملت مؤخرًا، أدویة أخرى بما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیة وإضافات غذائیة، إحك للطیب أو الصيدلي عن ذلك.

#### 3) كیفیة إستعمال الدواء؟

عليك الإستیضاح من الطیب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطریقة العلاج بالمستحضر. إنتهبه

لا یجوز البُلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخاریج فقط.

یجب تجنب التماس بالعینین والأَسجَة المخاطیة. في حال التماس یجب الشطف بالكثیر من الماء والتوجه للطیب إذا دعت الحاجة ذلك.

یتبع <





**PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986**

The medicine is dispensed without a doctor's prescription

**Septol®**

Hand disinfection solution 500 ml

**Composition**

Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v

Ethanol 70% w/v

For information on inactive ingredients, see section 6 – "Further Information".

**Read the leaflet carefully in its entirety before using the medicine.** This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.

Use the preparation according to the instructions in the dosage section of this leaflet.

Consult the pharmacist if you need further information.

**1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?**

Septol is a solution for disinfecting the skin of the hands.

**Therapeutic group:** Disinfectants and antiseptics.

**2. BEFORE USING THE MEDICINE**

**Do not use the preparation:**

- If you are sensitive (allergic) to the active ingredients or to any of the additional ingredients contained in the medicine, especially in patients with a history of possible chlorhexidine-associated allergic reactions.
- If there is a suspicion of contact with the eyes, the brain, brain membranes, the middle ear or outer ear when the ear drum is perforated.
- Do not inject.
- Do not use in body cavities (e.g., nose, ears).
- When use of Septol is followed by diathermy (a type of surgical procedure) - ensure that there is no pooling of Septol and that the skin and all drapes surrounding the patient are dry.

**Special warnings regarding use of the medicine**

- Septol contains chlorhexidine. Chlorhexidine is known to induce hypersensitivity, including generalized allergic reactions and anaphylactic shock. The prevalence of chlorhexidine hypersensitivity is not known. Do not use Septol in patients with a potential history of an allergic reaction to a chlorhexidine-containing compound.
- If the preparation was accidentally administered by infusion – a blood transfusion may be necessary to counteract hemolysis.
- The use of chlorhexidine solutions, both alcohol-based and aqueous, for skin disinfection prior to invasive procedures, has been associated with chemical burns in neonates. The risk appears to be higher in preterm infants, especially those born before 32 weeks of gestation and within the first 2 weeks of life.
- Keep the product away from sources of heat or fire.
- Do not light a cigarette or be exposed to fire until the preparation has completely dried.
- Do not allow contact with the eyes due to the risk of visual damage. If it comes into contact with the eyes – wash immediately and thoroughly with water. In case of irritation, redness or pain in the eye, or visual disturbance, refer promptly for medical advice. Serious cases of persistent corneal injury (injury to the surface of the eye) potentially requiring corneal transplant have been reported when similar products have accidentally come in contact with the eye during surgical procedures, in patients under general anesthetic (deep painless sleep).

**Drug interactions**

**If you are taking, or have recently taken, other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist.**

**3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?**

Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain regarding the dosage and treatment regimen of the preparation.

**Attention**

Do not swallow! This medicine is intended for external use only.

Avoid contact with the eyes and mucous membranes. In case of contact, wash with plenty of water and refer to a doctor, if necessary.

**Do not exceed the recommended dose.**

**Directions for use:**

For your convenience, a pump is enclosed. Remove the bottle cap and screw the pump on until it is completely closed.

Pour 3 ml (one press of the pump) of the preparation onto clean hands, spread the solution over the entire skin surface and rub your hands until complete evaporation of the solution.

**If you accidentally swallowed Septol**

If you accidentally swallowed the solution, consult your doctor regarding what to do.

**Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take medicine. Wear glasses if you need them.**

**If you have further questions regarding use of the medicine, consult the doctor or pharmacist.**

**4. SIDE EFFECTS**

As with any medicine, use of Septol may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of them.

Discontinue use of the medicine immediately and seek medical treatment if the following side effects occur:

- Chlorhexidine can very rarely cause hypersensitivity, including anaphylactic shock (swelling of the throat or lips, low blood pressure).

**Additional side effects of unknown frequency:**

- Allergic reactions (e.g., skin inflammation, itching, redness, eczema, rash, urticaria, skin irritation, blisters).
- Corneal injury (injury to the surface of the eye) and permanent damage to the eyes including permanent visual impairment (following accidental ocular exposure during head, face and neck surgery) in patients under general anesthetic (deep painless sleep).

**Side effects in newborns and infants:**

- Chemical burns can occur in newborns and babies (frequency unknown).

If any of these reactions occur, stop the use and refer immediately to receive medical treatment.

**If a side effect occurs, if one of the side effect worsens or if you suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult with the doctor.**

**Reporting side effects**

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link "Reporting Side Effects of Drug Treatment" found on the Ministry of Health homepage ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) that directs you to an online form for reporting side effects, or by entering the link: <https://sideeffects.health.gov.il>

**5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?**

Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine, must be kept in a safe place out of the reach and sight of children and/or infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the doctor. Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that appears on the package. The expiry date refers to the last day of that month. Caution! Flammable material, keep away from fire!

**Store below 25°C.**

**Can be used for 6 months after first opening, but not beyond the expiry date of the preparation.**

**6. FURTHER INFORMATION**

**In addition to the active ingredients, the medicine also contains:**

Glycerin, Citron D 3009 IF, D-Gluconolactone, FD&C Blue No. 1, Purified water.

**What the medicine looks like and the contents of the package:**

A transparent, light blue solution with a pleasant smell.

Each bottle contains 500 ml solution.

**Name of Manufacturer:**

Vitamed Pharmaceutical Industries Ltd., P.O.B. 114, Binyamina, Israel.

**License Holder and its Address:**

Teva Israel Ltd., Tel Aviv.

Revised in August 2024.

Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health: 029.79.25425

**teva**

SEPTOL PL SH0824

تتمة

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

**كيفية الإستعمال:**

من أجل سهولة الإستعمال أُفقت مضخة للمستحضر، يجب نزع غطاء القنينة ولولبة المضخة عليها حتى الإغلاق التام. يجب سكب 3 مل (كبسة واحدة على المضخة) من المستحضر على يدين نظيفتين، بعثرة المحلول على كل سطح الجلد ومن ثم فرك اليدين حتى تبخر المحلول بشكل تام.

**إذا بلعت سيتول بالخطأ**

إذا بلعت بالخطأ من المحلول إستشر الطبيب ماذا عليك أن تفعل.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

**(4) الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال سيتول قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف فوراً عن إستعمال الدواء والتوجه لتلقي علاج طبي إذا ظهرت الأعراض التالية:

- بإمكان كلورهيكسيدات أن يسبب في أحيان نادرة جدا لفرط حساسية بما في ذلك صدمة تأقية (انتفاخ الحنجرة أو الشفتين، إنخفاض ضغط الدم).

**أعراض جانبية إضافية شيوها غير معروف:**

- ردود فعل تحسسية (مثل التهاب الجلد، حكة، إحمرار، إكزيما، طفح، شرى، تهيج في الجلد، حويصلات).
- تضمر القرنية (تضمر سطح العين)، وضمر دائم للعينين بما في ذلك خلل دائم في الرؤية (جراء التعرض العرضي للعينين خلال عمليات جراحية في الرأس، الوجه والرقبة) لدى مرضى تحت تأثير التخدير العام (نوم عميق بدون آلام).

**أعراض جانبية لدى حديثي الولادة والرضع:**

- من الجائز حدوث حروق كيميائية لدى حديثي الولادة والرضع (شيوخ غير معروف). إذا حصلت إحدى ردود الفعل هذه، يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه لتلقي علاج طبي فوراً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

**التبليغ عن أعراض جانبية:**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

**(5) كيفية تخزين الدواء؟**

تجنب التسهم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسهم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

تحذير! مادة سريعة للإشتعال، إحذر من النار!

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

بالإمكان الإستعمال لمدة 6 أشهر بعد فتح القنينة للمرة الأولى، لكن لا يتعدى ذلك تاريخ إنتقضاء صلاحية المستحضر.

**(6) معلومات إضافية**

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:

Glycerin, Citron D 3009 IF, D-Gluconolactone, FD&C Blue No.1, Purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

محلول رائق بلون أزرق نو رائحة لطيفة.

تحتوي كل قنينة على 500 ملل من المحلول.

إسم المنتج: فيتاميد للصناعات الصيدلانية م.ض. ص.ب. 114 بنيامينا، إسرائيل.

صاحب الإمتياز وعنوانه: تيفع إسرائيل م.ض. تل أبيب.

تم إعدادها في آب 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 029.79.25425

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للجنسين.

029.79.25425

310124, 610124-05 :0777

300X190 :711 192 :717 9

SEPTOL PL SH0824

