

**بطاقة معلومات وقائية للمتعالج
بتوفاسيتينيب تيفع
حامل/ة هذه البطاقة يتعالج/تتعالج
بتوفاسيتينيب تيفع**

اسم المتعالج/ة: _____

اسم الطبيب/ة: _____

رقم هاتف الطبيب/ة: _____

تاريخ البدء بالعلاج بتوفاسيتينيب تيفع:

تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائية هامة عن توفاسيتينيب تيفع.

إذا لم تكن المعلومات واضحة لك، فراجع رجاءً الطبيب أو الصيدلي ليشرح لك. يجب الاحتفاظ بالبطاقة وعرضها على كل طبيب أو صيدلي له دور في علاجك.

إذا توقفت عن استعمال توفاسيتينيب تيفع، فاحتفظ بالبطاقة لمدة لا تقل عن شهرين بعد تناول آخر جرعة من توفاسيتينيب تيفع. لمزيد من المعلومات، يجب قراءة نشرة المستهلك. يجب استعمال توفاسيتينيب تيفع وفقاً لنشرة المستهلك.

بلغ الطبيب أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تستعملها، بما في ذلك الأدوية الملزمة بوصفة طبيب، الأدوية غير الملزمة بوصفة طبيب، الفيتامينات والمكملات الغذائية النباتية. استعمال توفاسيتينيب تيفع سويًا مع أدوية معينة أخرى قد يزيد من خطر نشوء أعراض جانبية، كبت الجهاز المناعي ونشوء التلوثات.

قد يزيد العلاج بتوفاسيتينيب تيفع من خطر نشوء تلوثات وأمراض خبيثة (بما في ذلك سرطان الرئتين، الليمفوما وسرطان الجلد غير الميلانوما).

المتعالجون الذين يبلغون 65 عامًا من العمر فما فوق قد يكونون عرضةً لخطر عالٍ للإصابة بتلوثات ونوبة قلبية وأنواع معينة من السرطان. قد يقرر الطبيب أن توفاسيتينيب تيفع ليس مناسبًا لك.

توجّه فورًا إلى الطبيب إذا:

- نشأ لديك ضيق التنفس الفجائي أو صعوبات في التنفس، آلام في الصدر أو في الجزء العلوي من الظهر، تورّم في الرجل أو في الذراع، ألم أو حساسية في الرجل، أو احمرار أو تغيير اللون في الرجل أو في الذراع في فترة استعمال توفاسيتينيب تيفع، لأن هذه الأعراض قد تكون علامات لوجود خثرة في الرئتين أو في الأوردة.
- نشأت لديك أعراض تلوث مثل حمى، سعال متواصل، انخفاض الوزن أو تعب مفرط.
- نشأت لديك أعراض الهربس النطاقي (هربس زوستر)، مثل طفح جلدي أو حويصلات مؤلمة على الجلد.

- تعرّضتَ عن قرب لشخص مصاب بمرض السل.
- نشأت لديك آلام مبرحة أو ضغط في الصدر (قد تنتشر إلى الذراعين، الفك، الرقبة، الظهر)، ضيق التنفس، عرق بارد، إحساس بأنك على وشك الإغماء أو دوار فجائي لأن هذه العلامات قد تكون علامات نوبة قلبية.
- نشأ لديك تورّم في الغدد الليمفاوية في الرقبة، في الإبط أو في الأربية، كنت تشعر بالتعب بشكل دائم، نشأت لديك حمى، كنت تتعرق في الليل، كان لديك سعال متواصل أو أنه يتفاقم، نشأت لديك صعوبات في التنفس، بحة أو أزيز تنفسي، أو انخفاض لا مبرر له في الوزن.
- لاحظت ورمًا جديدًا على الجلد أو أي تغيير في الشامات أو النقاط القائمة.
- نشأت لديك أعراض للمرض الرئوي الخلالي (interstitial lung disease) مثل ضيق التنفس.
- إذا نشأت لديك علامات وأعراض بطنية مثل آلام في المعدة، آلام البطن، دم في البراز أو أي تغيير في عادات التبرز المصحوبة بالحمى.
- نشأ لديك اصفرار في الجلد، غثيان أو تقيؤات.
- كنت تخطط لتلقي لقاح ما. هناك أنواع معينة من اللقاحات يُمنع أن تتلقاها خلال فترة العلاج بتوفاسيتينيب تيفع.

الحمل والإرضاع:

- راجعي الطبيب فورًا إذا كنتِ حاملًا أو تخططين للحمل.
- لا يجوز استعمال توفاسيتينيب تيفع أثناء الحمل. يجب على النساء في سن الخصوبة أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بتوفاسيتينيب تيفع ولمدة لا تقل عن 4 أسابيع بعد تناول آخر جرعة.
- لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بتوفاسيتينيب تيفع.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة البوابة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة: www.health.gov.il أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية أيضًا لتيفع إسرائيل عبر البريد الإلكتروني: safety.israel@teva.co.il

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه البطاقة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.

صودق على هذه البطاقة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة في آذار/مارس 2025.