

أدوية يتم إعطاؤها بشكل متزامن

اسم الدواء	الجرعة

الحالات التي تستدعي التوجه للطبيب فوراً:

نزيف، الذي قد يشكل خطراً على الحياة.
ردّة فعل تحسّسية تشمل الطفح الجلدي، الوذمة، تورّم في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان و/أو في الحلق، صعوبات في التنفس (نادرة).

الأعراض الجانبية:

عند تناول مضاد للتخثر، قد تظهر أعراض جانبية، يجب أن تكون على دراية بها والتوجه للعلاج الطبي عند الحاجة. لقائمة الأعراض الجانبية الكاملة، يجب الاطلاع على نشرة المستهلك. العرض الجانبي الأكثر شيوعاً هو النزيف.

قد يتجسد النزيف، من ضمن عدّة أمور:

- نزيف من الجهاز الهضمي من شأنه أن يظهر على شكل دم في البراز (براز أسود/داكن)، آلام (مثل آلام البطن)، والانتفاخ
- دم في البول (لون البول أحمر أو وردي)، دم في البول يتم اكتشافه في فحص البول
- نزيف من العينين، الأنف أو اللثة
- سعال دموي أو تقيؤ دموي (تقيؤ الدم أو مادة شبيهة بحبيبات القهوة)
- إفراز دم أو سوائل من الشقوق والإصابات، إفراز الدم من الشقوق لفترات زمنية طويلة
- نزيف استثنائي أو نزيف لا يتوقف من تلقاء نفسه
- ألم الرأس (صداع)، دوار، فقر الدم (الأنيميا) يظهر على شكل تعب وشحوب، غثيان

قد تكون عوامل الخطورة للنزيف الشديد:

مرض كبد يسبب اضطراباً في التخثر وخطراً للنزيف.

إصابة أو حالة طبية تتطلب على خطورة زائدة للنزيف، مثل القرحة المعدية أو قرحة معوية نشطة أو حصلت مؤخراً، ورم خبيث مع خطر زائد لحصول النزيف، إصابة دماغية أو إصابة في العمود الفقري حصلت مؤخراً، نزيف داخل الجمجمة حصل مؤخراً، الدوالي المرئية أو الشك بوجودها، تشوّه شرياني-وريدي، تمدد الأوعية الدموية أو خلل جوهري في الأوعية الدموية في الدماغ أو في العمود الفقري.

إذا خضعت مؤخراً لجراحة في الدماغ، جراحة في العمود الفقري أو جراحة عيون.

إذا كنت تتناول مستحضرات أخرى مضادة للتخثر، عدا في حالات الانتقال من العلاج أو إلى العلاج بأبيكسبان ساندوز أو في حال وجود قسطار وريدي أو شرياني تدعو الحاجة لإعطاء الهيبارين عن طريقه لإبقائه مفتوحاً.

إذا كان من المقرر أن تخضع لجراحة أو إجراء طبي قد يسبب النزيف، بما في ذلك علاج الأسنان، يجب استشارة الطبيب. لهذا السبب، قد يطلب منك الطبيب التوقف عن العلاج بواسطة الدواء لفترة قصيرة. إذا لم تكن متأكدًا إن كان الإجراء الطبي قد يسبب النزيف، يجب استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية من خلال بوابة التبليغ عن الأعراض الجانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة: www.health.gov.il أو من خلال الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>
كذلك يمكنك إبلاغ صاحب التسجيل، ساندوز لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض. من خلال:
adverse.event.israel@sandoz.com

كُتبت هذه البطاقة بصيغة الذكر لأغراض التسهيل فقط. البطاقة موجهة للنساء والرجال على حد سواء.

تمت الموافقة على هذه البطاقة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في أيلول 2025.

بطاقة معلومات السلامة لمتلقي العلاج

أبيكسبان ساندوز® 2.5 ملغ

أبيكسبان ساندوز® 5 ملغ

(apixaban 2.5 mg, apixaban 5 mg)

SANDOZ

SANDOZ

ساندوز لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض.،
ص.ب. 9015، تل أبيب، إسرائيل.

يتلقى حامل هذه البطاقة العلاج بأبيكسبان ساندوز

اسم متلقي العلاج:	بيانات أحد أفراد عائلة متلقي العلاج لحالات الطوارئ (الاسم، القرابة، رقم الهاتف):
تاريخ الولادة:	زمرة الدم (مع توقيع الطبيب):
العنوان:	الوزن:
العلاج (الجرعة، أوقات تناول، مع أو بدون طعام):	وتيرة تصفية الكرياتينين في بداية العلاج:

الرجاء الحفاظ على بطاقة معلومات السلامة هذه في متناول اليد دوماً.
الرجاء التأكد من أنك تستخدم الإصدار الأكثر تحديثاً من البطاقة.

يجب الاطلاع على نشرة المستهلك للحصول على معلومات إضافية.

ملاءمة الجرعة في حال انخفاض أداء الكلى:

لا يوصى بأبيكسبان ساندوز إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي (تصفية كرياتينين أقل من 15 ملل/دقيقة) أو إذا كنت تتلقى العلاج بغسل الكلى.

بالنسبة لمتلقي العلاج المصابين بالرجفان الأذيني (NVAF) يجب ملاءمة الجرعة في الحالات التالية:

1. تصفية كرياتينين 15-29 ملل/دقيقة.
2. في حال استيفاء على الأقل اثنين من المعايير الثلاثة التالية:

- أ. جيل 80 عامًا أو أكثر.
- ب. وزن 60 كغم أو أقل.
- ج. تركيز الكرياتينين في المصل 1.5 ملغ/ديسليتر أو أكثر.

توجّه للطبيب المعالج إذا لم تكن متأكدًا ما إذا كانت هذه الشروط تنطبق عليك.

الهدف من العلاج



أبيكسبان ساندوز 2.5 ملغ/
أبيكسبان ساندوز 5 ملغ
لمنع السكتة الدماغية والانصمام
الجهازي لدى المرضى
المصابين بالرجفان الأذيني
غير الصمامي (NVAF)



أبيكسبان ساندوز 2.5 ملغ/
أبيكسبان ساندوز 5 ملغ
لعلاج الخثرات الدموية (الخثار)
في أوردة الرجلين (الخثار
الوريدي العميق - DVT) وفي
الأوعية الدموية في الرئتين
(الانصمام الرئوي - PE)



أبيكسبان ساندوز 2.5 ملغ
لمنع تكرار حصول الخثرات
الدوائية (الخثار) في أوردة
الرجلين (الخثار الوريدي
العميق - DVT) وفي الأوعية
الدوائية في الرئتين (الانصمام
الرئوي - PE)



أبيكسبان ساندوز 2.5 ملغ
لمنع حالات الخثار الوريدي:
- بعد جراحة اختيارية
لاستبدال مفصل الفخذ
- بعد جراحة اختيارية
لاستبدال مفصل الركبة

للتفصيل الكامل للاستطببات كما صادقت عليها وزارة الصحة، يجب الاطلاع على نشرة المستهلك.

الجرعة وأوقات تناول

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.
يتم أخذ الدواء مرتين في اليوم. حاول أخذ الدواء في أوقات ثابتة في كل يوم، للحصول على أفضل تأثير للعلاج.

طريقة تناول

- يجب ابتلاع الدواء مع الماء. بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.
- في حال كنت تواجه صعوبة في بلع القرص كاملاً، تحدث مع الطبيب بشأن طرق إضافية ممكنة لتناول أبيكسبان ساندوز.
- يمكن سحق القرص وخلطه مع الماء، جلودوز 5% بالماء، عصير التفاح أو التفاح المهروس قبل تناول مباشرة. لتوجيهات سحق المفصلة، الرجاء الاطلاع على نشرة المستهلك المرفقة بالعبوة.
- عند الحاجة، يمكن للطبيب أن يعطيك أبيكسبان ساندوز عن طريق أنبوب أنفي-معدي.
- يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك. قد تسبب الجرعة المفرطة نزيفاً دموياً. في حال حصول نزيف، قد تحتاج لتسريب الدم عبر الوريد أو لعملية جراحية.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة في أسرع وقت ممكن في نفس اليوم والاستمرار في تناول الدواء مرتين في اليوم (ليس أكثر من ذلك). يُمنع مضاعفة الجرعة لتعويض عن الجرعة المنسية. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية التصرف أو إذا فوّت أكثر من جرعة واحدة، عليك استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

المتابعة الموصى بها في كل زيارة:

- المواظبة على تعليمات العلاج والالتزام بها
- متابعة حالات النزيف والأعراض الجانبية الأخرى يوصى بإجراء فحوصات الدم وفقاً لتوجيهات الطبيب.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- إذا توقفت عن تناول الدواء، قد تعاني من تشكل الخثرات الدموية.

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة بذلك.

بصورة خاصة، يجب إبلاغ الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تتناول ريفامبيسين (مضاد حيوي)، فينتوين، فينوباربيتال وكارپامازبين (لعلاج الصرع)، هيبركوم (St. John's wort): أدوية تخفض تركيز أبيكسبان ساندوز في الدم ولذلك فإنها قد تخفض فاعليته.