

**SANDOZ**Сандоз Фармацевтика Израэль ЛТД.,  
П. Я. 9015, Тель-Авив, Израиль.

Если вы принимаете (или принимали в последнее время) другие препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу, фармацевту или медсестре.

В особенности следует сообщить врачу, фармацевту или медсестре, если вы принимаете рифампицин (антибиотик), фенитоин, фенобарбитал и карбамазепин (для лечения эпилепсии), зверобой (St. John's wort): лекарства, которые понижают концентрацию препарата Апиксабан Сандоз в крови, и, следовательно, могут снизить его эффективность.

#### Лекарства, принимаемые одновременно

| Название лекарства | Дозировка |
|--------------------|-----------|
|                    |           |
|                    |           |
|                    |           |
|                    |           |

7

#### В каких случаях следует незамедлительно обратиться к врачу:

Кровотечение, которое может представлять опасность для жизни.  
Аллергическая реакция, включая сыпь, отеки, отек лица, губ, полости рта, языка и/или горла, затрудненное дыхание (редко).

#### Побочные явления:

При приеме антикоагулянта могут появиться побочные явления, о которых следует знать и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Полный перечень побочных явлений см. в Инструкции по применению препарата. Самое распространенное побочное явление – это кровотечение.

#### Проявления кровотечений могут, среди прочего, включать в себя:

- кровотечение из пищеварительного тракта, которое может проявляться в виде крови в кале (черный/темный кал); боли (например, боли в животе) и вздутие
- кровь в моче (моча красного или розового цвета); кровь в моче, которая обнаруживается при анализе мочи
- кровотечение из глаз, носа или десен
- кашель с кровью или кровавая рвота (рвота кровью или веществом, похожим на кофейную гущу)

8

- выделение крови или жидкостей из порезов и ран; порезы, кровотечения на протяжении длительных периодов времени
- аномальное кровотечение или кровотечение, не останавливающееся самопроизвольно
- головная боль, головокружение, анемия, которая проявляется в виде усталости и бледности, тошнота

#### Факторами риска повышенной кровоточивости могут быть:

Заболевание печени, вызывающее нарушение свертываемости крови и риск кровотечений.  
Травма или медицинское состояние с повышенным риском кровотечений, например, активная или недавно возникшая язва желудка или кишечника; злокачественная опухоль с повышенным риском кровотечения; недавняя травма мозга или позвоночника; внутричерепное кровоизлияние, произошедшее недавно; варикозное расширение вен пищевода или подозрение на его наличие; артериовенозная мальформация, аневризма сосудов или серьезное поражение сосудов головного мозга или позвоночника.  
Если вы недавно перенесли операцию на мозге, позвоночнике или глазах.

Если вы принимаете другие антикоагулянты, за исключением случаев перехода от лечения или к лечению препаратом Апиксабан Сандоз, или если у

9

вас установлен внутривенный или внутриартериальный катетер, через который необходимо вводить гепарин во избежание его закупорки.

Если вам предстоит операция или медицинская процедура, которая может вызвать кровотечение, включая стоматологические процедуры, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, из-за этого врач попросит вас прекратить лечение препаратом на короткий период. Если вы не уверены, что медицинская процедура может вызвать кровотечение, проконсультируйтесь с врачом.

#### Сообщение о побочных явлениях

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения через портал для сообщения о побочных явлениях, находящийся на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>  
Кроме того, вы можете сообщить владельцам регистрации, Сандоз Фармацевтика Израиль ЛТД, по электронному адресу: [adverse.event.israel@sandoz.com](mailto:adverse.event.israel@sandoz.com)

Эта карточка утверждена согласно указаниям Министерства здравоохранения в сентябре 2025 года.

## Информационная карточка по безопасности лечения для пациента

Апиксабан Сандоз®

2.5 мг

Апиксабан Сандоз®

5 мг

(apixaban 2.5 mg, apixaban 5 mg)

**SANDOZ**

**Обладатель данной карточки получает лечение препаратом Аликсабан Сандоз**

|   |
|---|
| Имя и фамилия пациента:                           |
| Дата рождения:                                    |
| Адрес:  |
| Лечение (дозировка, часы приема, с едой или без): |
| Показания/цель лечения:                           |
| Дата начала лечения:                              |
| Лечащий врач, имя и фамилия/телефон:              |

1

|   |
|---|
| Данные родственника пациента для экстренных случаев (имя и фамилия, родство, номер телефона): |
| Группа крови (с подписью врача):  |
| Вес:  |
| Клиренс креатинина в начале лечения:  |

Пожалуйста, всегда держите данную Информационную карточку безопасности пациента под рукой.

Удостоверьтесь, что вы используете самую последнюю версию данной карточки.

См. Инструкцию по применению препарата для получения дополнительной информации.

2

**Коррекция дозировки в случае сниженной функции почек:**

Аликсабан Сандоз не рекомендуется к применению, если вы страдаете почечной недостаточностью (клиренс креатинина ниже 15 мл/мин) или если вы находитесь на диализе. Для пациентов с фибрилляцией предсердий (NVAF) следует корректировать дозировку в следующих случаях:

1. Клиренс креатинина 15-29 мл/мин.
2. В случаях соответствия **не менее, чем двум критериям из трех:**
  - а. Возраст 80 лет и старше.
  - б. Вес 60 кг или ниже.
  - в. Концентрация креатинина в сыворотке крови 1.5 мг/дл или более.

Обратитесь к лечащему врачу, если вы не уверены, что данные условия распространяются на вас.

**Цель лечения**



Аликсабан Сандоз 2.5 мг/  
Аликсабан Сандоз 5 мг  
Для профилактики инсульта и системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (NVAF)

3



Аликсабан Сандоз 2.5 мг/  
Аликсабан Сандоз 5 мг  
Для лечения тромбоза вен ног (тромбоз глубоких вен - DVT) и кровеносных сосудов легких (легочная эмболия - PE)



Аликсабан Сандоз 2.5 мг  
Для профилактики рецидива тромбоза вен ног (тромбоз глубоких вен - DVT) и кровеносных сосудов легких (легочная эмболия - PE)



Аликсабан Сандоз 2.5 мг  
Для профилактики случаев тромбоза вен:  
- после плановой операции по замене тазобедренного сустава  
- после плановой операции по замене коленного сустава

Полный перечень показаний, одобренных Министерством здравоохранения, см. в Инструкции по применению препарата.

4

**Дозировка и время приема**

Дозировка и способ лечения назначаются только врачом.

Препарат принимают два раза в день.

Постарайтесь принимать препарат в постоянные часы каждый день, чтобы добиться оптимального эффекта лечения.

**Способ приема**

- Следует проглотить препарат вместе с водой. Можно принимать препарат как с едой, так и без.
- Если вам сложно проглотить таблетку целиком, обсудите с врачом возможные альтернативные способы приема препарата Аликсабан Сандоз.
- Можно размельчить таблетку и смешать с водой, раствором глюкозы 5% в воде, яблочным соком или яблочным пюре непосредственно перед приемом. Подробные указания по размельчению см. в Инструкции по применению препарата, прилагаемой к упаковке.
- В случае необходимости врач может ввести вам Аликсабан Сандоз через назогастральный зонд.
- Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

**Если по ошибке вы приняли более высокую дозу препарата или если по ошибке препарат проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и принесите с собой упаковку от препарата.**

5

Передозировка может вызвать кровотечение. В случае кровотечения вам может потребоваться переливание крови или операция.

**Если вы забыли принять препарат** в назначенное время, следует принять эту дозу как можно скорее в тот же день и продолжить прием препарата дважды в день (и не чаще). Не следует удваивать дозу в качестве компенсации пропущенной дозы. Если вы не уверены в том, что следует делать, или если вы пропустили более одной дозы, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или медсестрой.

**При каждом посещении рекомендуется:**

- проверка регулярности приема и соблюдения инструкций по лечению
- мониторинг случаев кровотечения и других побочных явлений

Рекомендуется сдавать анализы крови по назначению врача.

Даже если в состоянии вашего здоровья наступило улучшение, не следует прекращать прием препарата, не проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.

**Если вы прекращаете прием препарата, у вас могут образоваться тромбы.**

6