

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

موكسيبن فورته 250 ملغ مسحوق لتكوين معلق

التركيبة:

تحتوي كل 5 ملل على: أموكسيسيلين (كتربيهدرات) 250 ملغ Amoxicillin (as trihydrate) 250 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ **النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تغطه للأخريين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

نشأت ردود فعل تحسسية شديدة تشتمل على رد فعل جلدي خطير والموت، لدى بعض الأشخاص الذين استعملوا مضادات حيوية من فصيلة البنينيسيلينات مثل موكسيبن فورته (أموكسيسيلين). إذا حدث لديك في الماضي رد فعل تحسسي لمضادات حيوية من فصيلة البنينيسيلينات أو السيفالوسپورينات أو لمسببات أخرى للحساسية، فليك إبلاغ الطبيب المعالج قبل البدء بالعلاج بموكسيبن فورته.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج التلوثات التي تسببها الجراثيم الحساسة لأموكسيسيلين. كذلك، فإن الدواء مخصص لمنع التلوث الجرثومي لدى المرضى المعرضين لخطر تطوير التهاب بطانة القلب (التهاب الشغاف) على خلفية جرثومية.

الفصيلة العلاجية

مضاد حيوي من فصيلة البنينيسيلينات.

هناك تلوثات تسببها الفيروسات، مثل الزكام. موكسيبن فورته 250 ملغ مسحوق لتكوين معلق لا يلحق الضرر بالفيروسات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء.
- وُجدت لديك حساسية لمركبات عبوة الدواء.
- وُجدت لديك حساسية لأدوية أخرى من فصيلة البنينيسيلينات أو السيفالوسپورينات أو لمضاد حيوي مشابه مثل أموكسيسيلين، أمبيسيلين، سيفالكسين وغير ها.
- كنت تعاني من داء كثرة الوحيدات (داء التقبيل) أو إذا وُجد شك بذلك.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بموكسيبن فورته 250 ملغ مسحوق لتكوين معلق أخبر الطبيب إذا:

- عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي لمضاد حيوي من فصيلة بيتا-لاكتام (مثل أمبيسيلين، بيبيرياسيلين). انظر البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كنت تتناول أدوية لمتبيع الدم (مثل وارفارين وما شابه).
- عانيت في الماضي من حالات إسهال أو من التهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون - كوليتيس) نتيجة لاستعمال مضاد حيوي.
- كنت تعاني من مشاكل في الكليتين.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- أدوية لعلاج السرطان (مثل ميتوثريكسات)
- أدوية للحرقة أو للنفرس (پروبينيسيد أو سيميتيدين)
- أدوية لمتبيع الدم (مثل وارفارين) - قد تسبب حالات نزيف دموي
- حبوب منع الحمل - قد يقلل أموكسيسيلين من فعالية الحبوب
- مضادات حيوية (مثل تينتراسيكلينات) - قد تقلل من فعالية أموكسيسيلين

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بين وجبات الطعام مع كأس من الماء.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو تخططين لإحداث حمل، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

إذا كنت مرضعاً أو تخططين للإرضاع، فاستشيري الطبيب بخصوص كيفية الإرضاع في فترة استعمال الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الملعقة الصغيرة (5 ملل) ولذلك يعتبر خاليًا من الصوديوم.
- يحتوي هذا الدواء على السوكروز (ما يقارب 3 غم في 5 ملل من المعلق). إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل تناول الدواء.
- يحتوي الدواء على مادة ملوِّنة حمراء FD&C red #40 (E129) قد تسبب ردود فعل تحسسية.
- يحتوي هذا الدواء على بينزوات الصوديوم (E211) (2.79 ملغ في 5 ملل من المعلق). قد يزيد بينزوات الصوديوم اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) لدى المواليد الجدد (حتى عمر 4 أسابيع).

يحتوي هذا الدواء على الكحول البنزلي (ما يقارب 1.5 ملغ في 5 ملل من المعلق)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية. يُستبه بأن الكحول البنزلي يشكّل عامل خطر لنشوء أعراض جانبية خطيرة، بما في ذلك المشاكل في التنفس لدى الأولاد الصغار. لا يجوز الاستعمال لدى المواليد الجدد (حتى عمر 4 أسابيع) إلا بتوصية من الطبيب. لا يجوز الاستعمال لمدة تزيد عن أسبوع لدى الأولاد الصغار (الذين عمرهم أقل من 3 أعوام)، إلا بتوصية من الطبيب، بسبب ارتفاع الخطر لتراكم المادة في جسمهم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

سيحدد الطبيب المعالج الجرعة الدوائية المطلوبة والمدة الزمنية التي يجب أن تتناول فيها الدواء وفقًا لنوع وخطورة التلوث الذي تعاني منه أو يعاني منه ولدك. أخبر الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على الحالة.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتبّعة عادة هي:

التلوث في المسالك التنفسية العلوية، في الرئتين، في الجلد أو في الأنسجة الرخوة:

البالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 10 أعوام: 250-500 ملغ، 3 مرات في اليوم، كل 8 ساعات.

الأولاد الذين عمرهم 2-10 أعوام: 125 ملغ، 3 مرات في اليوم، كل 8 ساعات. في التلوثات الخطيرة يمكن رفع الجرعة إلى 250 ملغ، 3 مرات في اليوم.

الأطفال الرضع الذين عمرهم أقل من عامين: 62.5 ملغ، 3 مرات في اليوم، كل 8 ساعات.

الجرعة الدوائية الموصى بها وفقًا لوزن الجسم هي 20 ملغ/كغم في اليوم، يتم تقسيمها إلى جرعة كل 8 ساعات. في التلوثات الخطيرة يمكن رفع الجرعة الدوائية إلى 40 ملغ/كغم في اليوم، يتم تقسيمها إلى جرعة كل 8 ساعات.

التهاب بسيط في المسالك البولية أو داء السيلان:

البالغون: 3 غم بإعطاء وحيد.

الأولاد: 100 ملغ/كغم بإعطاء وحيد.

العلاج للوقاية من التهاب الشغاف القلبي على خلفية جرثومية (في علاجات الأسنان):

البالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 10 أعوام: 3 غم بإعطاء وحيد، قبل البدء بالعلاج بساعة واحدة.

الأولاد الذين عمرهم أقل من 10 أعوام: 1.5 غم بإعطاء وحيد، قبل البدء بالعلاج بساعة واحدة.

يجب الحرص على قياس جرعة المعلق بملعقة القياس الصغيرة. يجب تناول الدواء بين وجبات الطعام مع كأس من الماء.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تحضير الدواء

يجب تحضير المعلق وفقًا لتعليمات التحضير الظاهرة على ملصق القنينة. يجب النقر على القنينة لتحرير المسحوق.

للقنينة التي تحتوي على مسحوق لتحضير 60 ملل: يجب إضافة 36 ملل من الماء المقطر.

للقنينة التي تحتوي على مسحوق لتحضير 100 ملل: يجب إضافة 60 ملل من الماء المقطر.

يجب خض القنينة جيدًا قبل كل استعمال.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء، حتى لو لم تشعر بأعراض.

قد تشتمل أعراض فرط الجرعة على: دوار خطير.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تنكرك. إذا تذكرت قريبًا من موعد تناول الجرعة القادمة، فتخطّ الجرعة المنسية واستمر بالعلاج كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعتين معًا للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

حتى لو زالت الأعراض، فمن المهم إنهاء العلاج بحسب توصية الطبيب. قد يؤدي إيقاف العلاج قبل أوانه، أو الاستعمال الخاطى أو فرط الاستعمال إلى نشوء مقاومة للدواء لدى الجراثيم وإلى عودة التلوث.

معنى ذلك أن الدواء قد لا ينفعك في المستقبل.

لا يجوز تناول الأدوية في العمّة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال موكسيبن فورته 250 ملغ مسحوق لتكوين معلق إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

قد يؤثر موكسيبن على نتائج الفحوص المخبرية. استشر الطبيب عند الحاجة.

يجب إيقاف العلاج والتوجه فورًا إلى الطبيب في الحالات التالية:

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1.000):

- تأق (رد فعل تحسسي حاد): انتفاخ في الأنف، في العينين، في الحلق، صعوبات في التنفس، حويصلات جلدية، طفح جلدي كُثلي وتقشرات جلدية، إغماء.
- وذمة وعائية عصبية: انتفاخ مؤلم في الوجه، في العينين، في الشفتين، في اللسان وأو في الحلق، في اليدين أو في الرجلين؛ طفح جلدي مثير للحكة، احمرار الجلد، شرى، الآم البطن، دوار وصعوبة في التنفس.

- حماى متعددة الأشكال (رد فعل جلدي خطير): طفح جلدي قد يظهر على شكل حويصلات شبيهة بالهدف (بقع مستديرة غامقة في المركز ، محاطة بمنطقة فاتحة تحيطها حلقة غامقة).

- مشاكل في الكليتين: بول متعكر، دم في البول وقد يكون مصحوبًا بطفح جلدي، بحمى، بالآم في المفاصل؛ أو بتدنّ في البتول.

- مشاكل في الكبد: غثيان وتقيؤات مرارًا وتكرارًا، الآم البطن، تعب شاذ، اصفرار العينين أو الجلد، بول غامق.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10.000):

- التهاب الأوعية الدموية على خلفية رد فعل تحسسي: طفح جلدي، بقع حمراء، شرى وحويصلات في الجزء السفلي من الجسم.
- رد فعل جلدي حاد قد يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى:

- تقشرات، قشرة أو حويصلات جلدية (مع أو بدون قيج) وقد تؤثر أيضًا على العينين، الفم، الأنف أو الأعضاء التناسلية، حكة، طفح جلدي حاد، نتوءات تحت الجلد، ألم في الجلد، تغير لون الجلد (احمرار، اصفرار أو لون أرجواني).

- انتفاخ واحمرار العينين أو الوجه.

- شعور شبيه بالإنفلونزا، حمى، قشعريرة، ألم في الجسم، غدد ليمفاوية منتفخة، سعال.

- ضيق التنفس، ألم أو انزعاج في الصدر.

- إحساس بالعطش، التبول بوتيرة أقل، انخفاض في حجم البول.

أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف:

- فقر الدم: تعب، صداع، شحوب الجلد، دقات قلب غير منتظمة، آلام في الصدر، برودة اليدين، دوار، تقلصات عضلية في الرجلين.
- التهاب السحايا الدماغية العقيم (الذي لا تسببه الجراثيم): ارتباك، حمى، غثيان، تعب، صداع بشكل فجائي أو تصلب الرقبة، حساسية للضوء، تقيؤات.
- التهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون على خلفية تلوث Clostridium difficile): إسهال شديد (مائي أو دموي)، مع أو بدون حمى، آلام في البطن أو حساسية بطنية.
- اختلاجات: ارتجاج غير خاضع للسيطرة مع أو بدون فقدان الوعي.

- متلازمة التهاب الأمعاء (التهاب معوي قولوني - إنتيروكوليتيس) الناتج عن الأدوية: تقيؤات بشكل متكرر (بعد تناول الدواء بـ 1-4 ساعات)، آلام البطن، ميل شاذ للنوم، إسهال وضغط دم منخفض. قد تدل هذه الأعراض على وجود رد فعل تحسسي خطير.

فقر الدم الانحلالي: شحوب الجلد، ضعف، تعب، ضيق التنفس، اصفرار الجلد وأو العينين، حمى.

- متلازمة كوينس (مشاكل في القلب تنجم عن رد فعل تحسسي): الآم في الصدر، إحساس بالضغط أو بالانزعاج في الصدر، خفقان القلب، غثيان أو تقيؤات، تعرّق، ضيق التنفس، تعب، جلد بارد ورطب، شعور بالقلق أو ميل للإغماء، ارتباك، انزعاج بطني.

- قلة الكريات البيضاء، قلة العدلات، ندرة المحببات (مستويات منخفضة لخلايا الدم البيضاء): حمى، قشعريرة، آلام في الحلق، نبض ووتيرة نفس سريعان، علامات أخرى تدل على وجود تلوث.

- قلة الصفائح (انخفاض في مستويات صفائح الدم): ورم دموي تحت الجلد أو نزيف دموي يستمر لمدة أطول من المعتاد، تعب وضعف.

يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100):

التهاب في اللسان (مظهر اللسان أسود ومكسو بالشعر)، تغير لون الأسنان لدى الأولاد (بقع بنية، صفراء أو رمادية)، دوار.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10.000):

صعوبة في الإغفاء (أرق - إنسومنيا)، ارتباك أو تغيرات في السلوك.

أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف:

- كثرة اليرزنيات (ارتفاع في عدد خلايا دم بيضاء): آلام البطن، طفح جلدي، انخفاض في الوزن، أزيز عند التنفس.

داء Iga الخطي: طفح جلدي مع حويصلات مرتبة على شكل حلقة مع جلبة مركزية أو بظهر يذكر بعقد اللؤلؤ.

- تلوث فطري يؤثر على الفم، المعدة، المسالك البولية أو المهبل: بقع بيضاء سمكية في الفم، على اللسان أو في الحلق، ألم في الحلق. حكة، لذع، طفح، ألم، انزعاج أو إفراز من المهبل.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- المسحوق الجاف: يجب تخزين المسحوق في مكان جاف، فيما دون 25°C.**

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

- المعلق الجاهز: يجب حفظه في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة واستعماله خلال 14 يومًا.**

- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sucrose, spray dried artificial flavor (cherry raspberry type), silicon dioxide, sodium citrate anhydrous, xanthan gum, sodium benzoate, FD&C red # 40.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

قنينة تحتوي على مسحوق لونه كريمي-وردي فاتح. بعد إضافة الماء، سيتم الحصول على سائل وردي اللون.

تتوفر العبوة بحجمين: عبوة تحتوي على مسحوق لتحضير 60 ملل من المعلق، وعبوة تحتوي على مسحوق لتحضير 100 ملل من المعلق.

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب الامتياز وعنوانه

تبيغ إسرائيل م.ض.، شارع دقورا هانيفينا 124، تل أبيب 6944020.

اسم المصنّع وعنوانه

تبيغ كندا م.ض.، تورونتو، أونتاريو، كندا.

خررت النشرة في حزيران/يونيو 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 132.01.31050

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

MOXYPEN FORTE SUSP PIL MW0625