

ENBREL®

PATIENT SAFETY INFORMATION CARD

כרטיס מידע בטיחותי למטופל

بطاقة معلومات لمتلقي العلاج حول
أمان الدواء



ENBREL PATIENT SAFETY INFORMATION CARD

This card contains important safety information that you need to be aware of before you are given Enbrel and during treatment with Enbrel. If you do not understand this information, please ask your doctor to explain it to you.

- Show this card to any doctor involved in your treatment.
- See the Enbrel package leaflet for more information.
- Keep this card with you for 2 months after the last Enbrel dose, since side effects may occur after your last dose of Enbrel.

It is important that you and your doctor record the brand name and batch number of your medication.

Infections

Enbrel may increase your risk of getting infections, which could be serious.

- You should not use Enbrel if you have an infection. If you are not sure, ask your doctor.
- If you develop symptoms suggestive of infections, such as fever, persistent cough, weight loss, or listlessness, seek medical attention immediately.
- You should be evaluated for tuberculosis (TB). Ask your doctor to record the dates and the results of your last screening for TB below:

Test: _____ Test: _____

Date: _____ Date: _____

Results: _____ Results: _____

- Please ask your physician to list your other medications that may increase your risk of infection.

Other Information (please complete):

Patient's Name: _____

Doctor's Name: _____

Doctor's Phone: _____

REPORTING OF SUSPECTED ADVERSE REACTIONS

Adverse events can be reported directly to the Ministry of Health using the adverse events reporting portal which is available on the home page of the Ministry of Health website: www.health.gov.il

or by this link: <https://sideeffects.health.gov.il>

Side effects can also be reported to Pfizer by email:

isr.aereporting@pfizer.com.

This card was approved according to the guidelines of the Ministry of Health on August 2025.

ENBREL®

PATIENT SAFETY INFORMATION CARD

כרטיס מידע בטיחותי למטופל

بطاقة معلومات لمتلقي العلاج حول
أمان الدواء



אנברל™ - כרטיס מידע בטיחותי למטופל

כרטיס זה מכיל מידע שיש לדעת על בטיחות התרופה לפני התחלת הטיפול באנברל ובמהלך הטיפול באנברל. אם המידע אינו מובן, יש לבקש הסבר מהרופא המטפל.

- יש להציג כרטיס זה בפני כל רופא המעורב בטיפול בך.
- יש לעיין בעלון לצרכן של אנברל לקבלת מידע נוסף.
- יש לשמור כרטיס זה למשך חודשיים לאחר הטיפול האחרון באנברל, מאחר שעלולות להופיע תופעות לוואי לאחר הטיפול האחרון באנברל.

חשוב לתעד ביחד עם הרופא המטפל את השם המסחרי ומספר האצווה של התרופה שלך.

זיהומים

הטיפול באנברל עלול להגביר את הסיכון לחלות בזיהומים, אשר עלולים להיות חמורים.

- יש להימנע מנשילת אנברל אם יש לך זיהום. אם אינך בטוח/ה, שאל/י את הרופא.
- במקרה של הופעת תסמינים המעידים על זיהום, כמו חום, שיעול ממושך, ירידה במשקל או תשישות, יש לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית.
- יש לעבור בדיקה לשחפת (TB). בקש/י מהרופא שלך לרשום כאן את התאריכים והתוצאות של הבדיקה האחרונה שלך לשחפת:

בדיקה: _____ בדיקה: _____
תאריך: _____ תאריך: _____
תוצאות: _____ תוצאות: _____

- בקש/י מהרופא שלך לרשום את שמות התרופות האחרות שלך העלולות להגביר את הסיכון שלך לחלות בזיהום.

מידע נוסף (נא למלא):

שם המטופל/ת: _____

שם הרופא/ה: _____

טלפון של הרופא/ה: _____

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il

או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפייזר במייל:

isr.aereporting@pfizer.com

כרטיס זה אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות באוגוסט 2025.

אינבריל™ - بطاقة معلومات لمتلقي العلاج حول أمان الدواء

ترد في هذه البطاقة معلومات حول أمان الدواء يجب معرفتها قبل البدء بالعلاج بإينبريل وخلالها. وفي حال كانت المعلومات غير واضحة، اطلب الشرح من الطبيب المعالج.

- يجب إظهار هذه البطاقة لأي طبيب يشارك في علاجك.
- يجب مراجعة نشرة المستهلك لإينبريل لأجل الحصول علمزيد من المعلومات.
- يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة لغاية شهرين بعد العلاج الأخير بإينبريل نظرًا لاحتمال نشوء الأعراض الجانبية بعد العلاج الأخير بإينبريل.
- من المهم أن تقوم أنت وطبيبك المعالج بتوثيق الاسم التجاري ورقم الدفعة للدواء الخاص بك.

التلوثات

من شأن العلاج بإينبريل أن يزيد من احتمال الإصابة بالتلوثات التي قد تكون خطيرة.

- يتوجب الامتناع عن تناول إينبريل إذا كنت مصابًا بتلوث ما. وفي حال لم تكن متأكدًا، استفسر الطبيب.
- في حالة ظهور أعراض تدل على نشوء التلوث، مثل الحمى، السعال المتواصل، فقدان الوزن أو الإرهاق، توجه فورًا إلى جهة طبية للحصول على المساعدة.
- يجب الخضوع لفحص لاكتشاف السل (TB). اطلب من طبيبك أن يسجل أدناه تواريخ ونتائج الفحص الأخير الذي خضعت له لاكتشاف السل:

الفحص: _____

الفحص: _____

التاريخ: _____

التاريخ: _____

النتائج: _____

النتائج: _____

- اطلب طبيبك بأن يسجل أسماء أدويةك الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابتك بالتلوث.

معلومات إضافية (رجاء التعبئة)

اسم متلقي العلاج: _____

اسم الطبيب: _____

رقم هاتف الطبيب: _____

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية من خلال بوابة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة على العنوان:

www.health.gov.il أو بالدخول إلى الرابط التالي:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ويمكن أيضًا إخبار شركة فايزر بالأعراض الجانبية على عنوان البريد الإلكتروني: isr.aereporting@pfizer.com

تمت الموافقة على هذه البطاقة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة بتاريخ أغسطس / آب 2025.