

بطاقة سوليريس للمريض

معلومات هامة عن السلامة للمرضى الذين يأخذون سوليريس (إيكوليزوماب)



يمكن أن يؤدي دواء سوليريس إلى خفض قدرة جهازك المناعي على مكافحة العدوى، وخاصة عدوى المكورات السحائية، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور أو طلب الرعاية الطبية الطارئة، ويفضل أن يكون ذلك في مركز رعاية طبية طارئة كبير:

- صداع مع غثيان أو قيء
- صداع مع تيبس الرقبة أو الظهر
- حمى
- طفح جلدي
- تشوش
- آلام عضلية شديدة مصحوبة بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا
- حساسية للضوء

احصل على رعاية طبية طارئة على الفور إذا كان لديك أي من هذه العلامات أو الأعراض وأظهر هذه البطاقة.



احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات أثناء العلاج ولمدة 3 أشهر بعد الجرعة الأخيرة من سوليريس. قد يستمر خطر الإصابة بعدوى المكورات السحائية لعدة أسابيع بعد تناول الجرعة الأخيرة من سوليريس.

معلومات لاختصاصي الرعاية الصحية

- تم وصف دواء سوليريس (إيكوليزوماب) لهذا المريض، الذي يزيد من قابلية المريض للإصابة بعدوى المكورات السحائية (المكورة السحائية) أو غيرها من العدوى العامة.
- يجب أن يتم تطعيم جميع المرضى قبل أسبوعين على الأقل من تلقي سوليريس. يجب على المرضى الذين يبدؤون العلاج بـ سوليريس بعد أقل من أسبوعين من تلقي لقاح المكورات السحائية أن يتلقوا المضادات الحيوية الوقائية المناسبة حتى أسبوعين بعد التطعيم.
- يجب على المرضى تلقي التطعيم وإعادة التطعيم وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية الحالية للتطعيم لاستخدام التطعيم.
- يمكن أن تصبح عدوى المكورات السحائية مهددة للحياة أو قاتلة بسرعة إذا لم يتم التعرف عليها ومعالجتها في وقت مبكر.
- قم بالتقييم فوراً إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بالعدوى وعالجها بالمضادات الحيوية المناسبة إذا لزم الأمر.
- اتصل بالطبيب الذي وصف لك الدواء (أدناه) في أقرب وقت ممكن.

لمزيد من المعلومات حول سوليريس، يرجى الرجوع إلى النشرة الطبية الكاملة المعتمدة في إسرائيل. في حالة وجود مخاوف تتعلق بالسلامة، اتصل على 1-800-250-255 أو على البريد الإلكتروني: drugsafety@neopharmgroup.com.

اسم المريض _____

المستشفى حيث تم العلاج _____

اسم الطبيب _____

رقم الهاتف _____

تاريخ (تواريخ) التطعيم: _____

تاريخ بدء العلاج بـ سوليريس: _____

معلومات عن التطعيم ضد المكورات السحائية:

العلامة التجارية للقاح	المجموعة المصلية للقاح	رقم الجرعة	التاريخ	السلسلة الأساسية/الجرعة المعززة	الوقاية بالمضادات الحيوية التي يتم تلقيها إذا تم البدء في استخدام سوليريس بعد أقل من أسبوعين من تلقي اللقاح
					☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء: _____
					☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء: _____
					☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء: _____

475-JUN-2025

تمت المصادقة على هذا المستند آخر مرة في يونيو 2025 من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.