

**Инструкция по применению в соответствии с Фармацевтическими правилами (препараты) – 1986 г.**

Препарат продается без рецепта врача

## **Синуклир® в таблетках**

**Активные ингредиенты и их концентрации:**

**Each coated tablet contains:**

Verbena herb, powdered 36 mg; Gentian root, powdered 12 mg; Common sorrel herb, powdered 36 mg; Elder flower, powdered 36 mg; Primula flower with calyx, powdered 36 mg.

**Каждая покрытая оболочкой таблетка содержит:**

Порошок вербены 36 мг, порошок корня горечавки 12 мг, порошок щавеля обыкновенного 36 мг, порошок черной бузины 36 мг, порошок чашечек цветков первоцвета 36 мг.

Список неактивных ингредиентов и аллергенов в лекарстве - см. в разделе 6.

Смотрите также раздел 2 – "Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства".

**Перед началом применения данного препарата внимательно прочитайте эту инструкцию до конца.** Эта инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат Синуклир® в таблетках предназначен для взрослых и детей старше 12 лет.

Принимайте лекарство в соответствии с указаниями в разделе о дозировках. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам нужна дополнительная информация.

Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются в течение 7-14 дней применения лекарства, или возобновляются.

### **1. Для чего предназначено лекарство?**

Препарат Синуклир® в таблетках предназначен для облегчения симптомов в носу и синусах, связанных с простудой, таких как: заложенность носа, насморк, головная боль и боль в области

синусов, у взрослых и детей старше 12 лет.

**Терапевтическая группа:** Растительный препарат для лечения простуды.

### **2. Перед применением лекарства:**

**Не применяйте это лекарство, если:**

Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к одному или нескольким из следующих видов растений: Вербена (Verbena), Горечавка (Gentian), Щавель обыкновенный (Common sorrel), Черная бузина (Elder), Первоцвет (Primula) или к любому из других ингредиентов, содержащихся в этом лекарстве. Перечень дополнительных ингредиентов см. в разделе 6.

**Особые предостережения относительно применения лекарства:**

**Обратитесь к врачу, если признаки Вашего заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются в течение 7-14 дней, или возобновляются.**

**Дети и подростки:** Не следует применять препарат Синуклир® в таблетках детям младше 12 лет, так как нет достаточной информации о его применении в этой возрастной группе.

**Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарства, в том числе лекарства, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.** До сих пор не известно о взаимодействиях между препаратом Синуклир® в таблетках и другими лекарствами.

**Применение препарата с пищей:** Можно принимать Синуклир® в таблетках вместе с едой, напитками или вне связи с приемом пищи. Если Вы страдаете от чувствительности желудочно-кишечного тракта, рекомендуется принимать препарат Синуклир® в таблетках после еды.

**Беременность и кормление грудью:**

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием препарата Синуклир® в таблетках, если Вы беременны или кормите грудью. Как и в случае с другими лекарствами, решение о применении препарата Синуклир® в

таблетках в период беременности или кормления грудью будет принято лечащим врачом после оценки риска и пользы.

**Вождение и управление механизмами:** Нет особых предупреждений или указаний касательно применения препарата Синуклир® в таблетках во время управления автомобилем или работы с механизмами.

**Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства:**

Препарат Синуклир® в таблетках содержит глюкозу, лактозу, сахарозу и сорбитол.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата Синуклир® в таблетках, если Вы страдаете непереносимостью некоторых сахаров.

Информация для страдающих диабетом: одна покрытая оболочкой таблетка Синуклир® в таблетках содержит в среднем около 0.2 грамма углеводов.

Препарат Синуклир® в таблетках не содержит глютенa.

### **3. Как применять лекарство?**

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом в случае сомнений.

**Обычная рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет:** одна покрытая оболочкой таблетка Синуклир® в таблетках 3 раза в день. **Не превышайте рекомендуемую дозу.**

**Способ применения препарата Синуклир® в таблетках:** следует принимать одну покрытую оболочкой таблетку Синуклир® в таблетках 3 раза в сутки (утром, днем и вечером). Следует запивать таблетку жидкостью (например, стаканом воды).

**Измельчение/деление/жевание:** не следует измельчать, жевать или ломать таблетку, покрытую оболочкой.

**Продолжительность лечения препаратом Синуклир® в таблетках:** в отсутствие других указаний врача, продолжительность лечения препаратом от 7 до 14 дней. Следует обратиться

к врачу, если признаки Вашего заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются в течение 7-14 дней, или возобновляются.

**Если Вы случайно приняли более высокую дозу,** следует уведомить об этом Вашего врача. Он примет решение о необходимости принятия каких-либо мер.

Если ребенок по ошибке проглотил этот препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку лекарства.

В случае передозировки препарата возможны более сильные побочные эффекты.

**Если Вы забыли принять препарат** вовремя, не принимайте двойную дозу. Примите следующую дозу в обычное время и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**Если Вы прекращаете прием препарата:**

прекращение лечения обычно не сопровождается симптомами отвыкания или особыми эффектами.

**Не принимайте лекарства в темноте! Проверяйте этикетку и дозировку каждый раз,** когда принимаете лекарство. При необходимости пользуйтесь очками.

**Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно этого лекарства,** проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

#### **4. Побочные эффекты:**

Как и любое лекарство, Синуклир® в таблетках может вызвать побочные эффекты у некоторых пациентов. Не беспокойтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что Вы не испытаете ни одного из них.

**Побочные явления, требующие особого внимания:**

Прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы при появлении первых признаков острой аллергической реакции: отека губ, языка, горла и/или гортани, сопровождающегося сужением

дыхательных путей (ангионевротический отёк), одышкой и отеком лица. Частота возникновения этих побочных эффектов редка.

**Нечастые побочные эффекты, возникающие у 1-10 пользователей из 1,000:**

Дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

**Редкие побочные эффекты, возникающие у 1-10 пользователей из 10,000:**

Кожные аллергические реакции, такие как сыпь, покраснение и зуд.

**Если у Вас появился побочный эффект, если один из побочных эффектов обострился или если Вы страдаете от побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.**

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку "תגובה לטיפול רפואי" ("side effects") расположенную на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), которая направит Вас к онлайн-форме для сообщения о побочных эффектах, или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

В дополнение, можно сообщить о побочных явлениях в фирму "Др.Самуэлов импорт и маркетинг" по электронной почте: [drsamuelov.co.il](mailto:drsamuelov.co.il)

#### **5. Как хранить лекарство?**

Избегайте отравления! Это лекарство и любое другое необходимо хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, во избежание отравления.

Не вызывайте рвоту, если не получили прямых указаний врача.

Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке и/или блистере. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Условия хранения: Не хранить при температуре выше 25°C.

#### **6. Дополнительная информация**

**В дополнении к действующему веществу препарат содержит следующие неактивные ингредиенты:**

Sucrose, talc, lactose monohydrate, calcium carbonate, potato starch, maize starch, dextrin, silica (colloidal anhydrous), stearic acid, titanium dioxide, liquid glucose, gelatin, shellac, light magnesium oxide, sorbitol, basic butylated methacrylate copolymer, montan glycol wax. Riboflavin (E101), indigo carmine (E132), aluminium hydroxide, cuprum chlorophylline (E141), castor oil (refined).

**Как выглядит лекарство и что содержится в упаковке:** препарат Синуклир® в таблетках представляет собой покрытую оболочкой зеленую, круглую, выпуклую таблетку с гладкой поверхностью и без разделительной линии.

Таблетки упакованы в пластиковые блистеры, которые расфасованы в картонные коробки. **Размер упаковки:** препарат Синуклир® в таблетках продается в картонной коробке, содержащей пластиковый блистер, в котором 15 или 20 покрытых оболочкой таблеток.

**Владелец лицензии и импортер:**

Др. Самуэлов импорт и маркетинг Лтд, Идентификатор компании 512260944, п/я 2486, Раанана 4365007. Телефон: 09-7483769, адрес эл. почты: [info@drsamuelov.co.il](mailto:info@drsamuelov.co.il).

**Производитель:** Бионорика SE, Ноймаркт 92318, Германия.

Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в мае 2017 года.

**Регистрационный номер лекарства в государственном реестре Министерства здравоохранения:** 158-57-34682-00