

<div><span><span></span></span></div>	<div><b>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986</b></div>
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד	

## פנטאמד 100 מק"ג

## פנטאמד 200 מק"ג

## פנטאמד 300 מק"ג

## פנטאמד 400 מק"ג

## פנטאמד 600 מק"ג

## פנטאמד 800 מק"ג

### טבליות תת לשוניות

**הרכב:**

כל טבלייה תת לשונית מכילה:

החומר הפעיל וכמותו:

**פנטאמד 100 מק"ג:**

פנטניל (כציטראט) \*100 מק"ג

**פנטאמד 200 מק"ג:**

פנטניל (כציטראט) \*200 מק"ג

**פנטאמד 300 מק"ג:**

פנטניל (כציטראט) \*300 מק"ג

**פנטאמד 400 מק"ג:**

פנטניל (כציטראט) \*400 מק"ג

**פנטאמד 600 מק"ג:**

פנטניל (כציטראט) \*600 מק"ג

**פנטאמד 800 מק"ג:**

פנטניל (כציטראט) \*800 מק"ג

\*שעבר מיקרוניזציה.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. התרופה מיועדת למבוגרים מעל גיל 18.

<ul style="list-style-type: none"><li>נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית (כולל מים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.</li> <li>תרופות ממשפחת האופיואידים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והינן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות. דאג כי הינך מכיר את שם התרופה, המינון שהינך לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי, תופעות לוואי הפוטנציאליים. מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור: <span>https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DoclLib/opioids_he.pdf</span></li></ul>
---

### 1. למה מיועדת התרופה?

פנטאמד מיועד לטיפול בכאב מתפרץ בחולים אנוקולוגים אשר מטופלים בתרופות חזקות לשיכון כאבים אופיואידים) בקביעות.

כאב מתפרץ הוא כאב שמופיע באופן פתאומי, למרות שהינך משתמש באופן קבוע בתרופה אופיואידית לשיכון כאבים.

**קבוצה תרפויטית:** החומר הפעיל בטבליות תת לשוניות פנטאמד הינו פנטניל משתייך לקבוצת תרופות נרקוטיות חזקות המשמשות לשיכון כאבים אשר נקראת אופיואידים.

### 2. לפני השימוש בתרופה

<b>אין להשתמש בתרופה אם:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, פנטניל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").</li> <li>אתה סובל מבעיות נשימה חמורות.</li> <li>אינך משתמש בקביעות בתרופת מרשם מסוג אופיואיד מדי יום ובזמנים קבועים במשך שבוע לפחות לצורך שליטה על כאבך המתמשך (לדוגמה תרופות אופיואידיות כגון: קודאין, פנטניל, הידרמורפון, מורפין, אוקסיקודון, פתידיון). אם אינך משתמש בתרופה מסוג זה, <b>אסור לך</b> להשתמש בפנטאמד מכיוון שהתרופה עלולה להעלות את הסיכון לנשימה איטית ו/או נשחיתת באופן מסוכן או להפסקת נשימה.</li> <li>אתה סובל מכאב קצר טווח השונה מכאב מתפרץ.</li> <li>אתה מטופל בתרופות המכילות סודיום אוקסיבט.</li></ul>

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

אחסן תרופה זו במקום סגור ובטוח, שבו אנשים אחרים לא יכולים לגשת אליה (למידע נוסף ראה סעיף 5 "איך לאחסן את התרופה").

**ספר לרופאך או לרוקח לפני הטיפול אם הינך סובל או סבלת בעבר מהמצבים הבאים, מכיוון שרופאך יצטרך להתחשב במידע זה בהתאמת המינון עבורך:**

- חבלת ראש, משום שפנטאמד עלול למסך את חומרת החבלה.
- בעיות נשימה או אם הינך סובל ממחלת חולשת השרירים (מיאסטניה גריבס).
- אם הינך סובל מבעיות לב ובמיוחד אם הינך סובל מקצב לב איטי.
- לחץ דם נמוך.

- מחלת כבד או כליות, ייתכן שרופאך יצטרך להתאים מינון ביתר זהירות.

ידיול במוח ו/או עלייה בלחץ תוך גולגולתי (עלייה בלחץ במוח הגורמת לכאבי חזקים, בחילות/תחושת ונטשטש ראיה).

כיבים בפה או דלקת רירית הפה (נפיחות ואודם בחלל הפה).

אם הינך נוטל תרופות נגד דיכאון או פסיכזזה, קרא בעיון את הסעיף הבא, "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות".

אם אי פעם פיתחת אי ספיקות יותרת הכליה או חוסר בהרמוני מין (חסר באנדרוגן) עם שימוש באופיואידים.

**בתקופת הטיפול בפנטאמד, עליך להודיע לרופא או לרופא השיניים שהינך מטופל בתרופה זו, אם:**

- אתה עתיד לעבור ניתוח כלשהו.
- אתה חווה כאב או רגישות מוגברת לכאב (hyperalgesia) אשר אינם מגיבים למינון גבוה יותר של התרופה כפי שנקבע על ידי הרופא.
- אתה סובל משילוב של התסמינים הבאים: בחילות, הקאות, אנורקסיה, עייפות, חולשה, סחרחורת ולחץ דם נמוך. שילוב התסמינים אלה עשוי להוות סימן למצב של סכנת חיים אפשרית הקרוי בשם אי ספיקות יותרת הכליה, מצב שבו בלוטות האדרנל אינן מייצרות מספיק הורמונים.

**שימוש בטוח ארוך וטביליות**

תרופה זו מכילה פנטניל שהיא תרופה אופיואידית. שימוש חוזר במשככי כאבים אופיואידים עלול לגרום לכך שהתרופה תהיה פחות יעילה (אתה מתרגל אליה, דבר המכונה טבילות לתרופות). אתה עלול גם להיות רגיש יותר לכאב בזמן השימוש בפנטאמד. זה ידוע בשם היפראלגזיה. הגדלת המינון של פנטאמד עשויה לעזור להפחית עוד יותר את הכאב לזמן מה, אך היא גם עלולה להזיק. אם אתה שם לב שהתרופה שלך הופכת פחות יעילה, שוחח עם הרופא שלך. הרופא של יחליט אם עדיף לך להעלות את המינון או להפחית בהדרגה את השימוש בפנטאמד.

**תלות והתמכרות**

שימוש חוזר בפנטאמד יכול גם להוביל לתלות, שימוש לרעה והתמכרות שעלולים לגרום למינון יתר מסכן חיים. הסיכון לתופעות לוואי אלו יכול לעלות עם מינון גבוה יותר ומשך שימוש ארוך יותר. תלות או התמכרות יכולים לגרום לך להרגיש שאתה כבר לא שולט בכמות התרופה שאתה צריך או בתדירות שאתה צריך להשתמש בה. אתה עשוי להרגיש שאתה צריך להמשיך להשתמש בתרופה שלך, גם כאשר זה לא עוזר להקל על הכאב שלך.

הסיכון לפתח תלות או להתמכר משתנה מאדם לאדם. ייתכן שיש לך סיכון גדול יותר לפתח תלות או להתמכר לפנטאמד אם:

- אתה או מישהו ממשפחתך אי פעם השתמש לרעה או היה תלוי באלכוהול, תרופות מרשם או סמים לא חוקיים ("התמכרות").
- אתה מעשן.
- היו לך אי פעם בעיות במצב הרוח שלך (דיכאון, חרדה או הפרעת אישיות) או טופלת על ידי פסיכיאטר בגלל מחלות נפש אחרות.

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הבאים בזמן השימוש בפנטאמד, זה יכול להיות סימן שהפכת תלוי או מכור:

- עליך להשתמש בתרופה למשך זמן רב יותר ממה שהומלץ על ידי הרופא שלך
- עליך להשתמש ביותר מהמינון המומלץ
- אתה משתמש בתרופה שלא מהסיבות שנקבעו, למשל, "להישאר רגוע" או "לעזור לך לישון"
- עשית ניסיונות חוזרים ונשנים שלא צלחו להפסיק או לשלוט בשימוש בתרופה
- כשאתה מפסיק לטיל את התרופה אתה מרגיש לא טוב (למשל בחילות, הקאות, שלשולים, חרדות, צמרמורת, רעד והזעה), ואתה מרגיש טוב יותר ברגע שאתה משתמש שוב בתרופה ("תופעות גמילה")

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הללו, דבר עם הרופא שלך כדי לדון במסלול הטיפול הטוב ביותר עבורך, כולל מתי נכון להפסיק וכיצד להפסיק בבטחה.

**בעיות נשימה הקשורות לשינה**

פנטאמד עשוי לגרום לבעיות נשימה הקשורות לשינה, כגון דום נשימה בשינה (הפסקות נשימה בזמן השינה) והיפוקסמיה בזמן השינה (רמת חמצן נמוכה בדם). התסמינים עלולים להיות: הפסקות נשימה בשינה, התעוררות בלילה עקב קוצר נשימה, קושי להמשיך לישון או נמנום מוגבר במהלך היום. אם אתה או מישהו אחר שמתם לב לתסמינים אלו, פנה אל הרופא. הרופא עשוי לשקול הפחתת מינון.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

תרופות מסויימות עלולות להגדיל או להקטין את ההשפעות של פנטאמד. לכן ספר לרופא אם אתה מתחיל טיפול, משנה מינון או מפסיק את הטיפול עם התרופות הבאות מכיוון שייתכן שהרופא יצטרך להתאים את המינון של פנטאמד:

- תרופות אנטי פטרייתיות המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים, לדוגמה קטוקונאזול או אסטרקונאזול.
- אנטיביוטיקות מקבוצת המאקרולידים המשמשות לטיפול בזיהומים, לדוגמה אריתרומיצין.
- תרופות אנטי ויראליות השייכות למשפחת מעכבי האנזים פרוטאז המשמשות לטיפול בזיהומים הנגרמים על ידי וירוסים, לדוגמה ריטונאביר.
- ריפאמפין או ריפאבוטין (תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים חיידיקים).
- קארבאמאזפין, פניטואין או פנובארביטאל (תרופות המשמשות לטיפול בעוויתות/פרוכוסים).
- תרופות ממקור צמחי המכילות הפיריקום (*Hypericum perforatum*) (St. John's wort).
- תרופות המכילות אלכוהול.
- תרופות ממשפחת מעכבי האנזים מנואמין אוקסידאז (MAOI), המשמשות לטיפול בדיכאון חמור ובמחלת פרקינסון. דווח לרופאך אם נטלת תרופה מסוג זה בשבועיים האחרונים.
- סוגים מסוימים של משככי כאבים חזקים, הנקראים אגוניסטים/אנטגוניסטים חלקיים, לדוגמה בופרורפין, נלבופין ופנטזוצין. ייתכן שתחוש תסמינים של תסמונת גמילה (כגון בחילה, הקאות, שלשול, חרדה, צמרמורת, רעד והזעה) בזמן השימוש בתרופות אלה.

**פנטאמד עלול להגביר את השפעתן המרדמה של התרופות הבאות (תרופות הרגעה) ובנוסף להגביר את הסיכון לדיכוי נשימתי וירידה בלחץ הדם:**

- תרופות אחרות לשיכון כאבים חזקים (תרופות ממשפחת האופיואידים לשיכון כאבים או שעול)
- משככי כאבים לכאבים עצביים (גאבאפנטין ופריגאבאלין)
- תרופות הדרמה כללית (המיועדות להרדמה בזמן ניתוחים)
- תרופות להרפיית שרירים
- תרופות להשריית שינה
- תרופות לטיפול ב:
  - דיכאון
  - אלרגיות (אנטיהיסטימינים מרדמים חוסמי H1)
  - חרדות ופסיכזזה (תרופות ממשפחת הברביטורטים, במודיאזפינים, למשל דיזאפאם, תרופות משרות שינה או נוגדות חרדה)
- תרופות המכילות קלונדין (לטיפול ביתר לחץ דם)

השימוש בפנטאמד במקביל לשימוש בתרופות שגורמות לך להרגיש ישוני (תרופות הרגעה) כמו במודיאזפינים, מגביר את הסיכון למנום, לקשיי נשימה (דיכוי נשימתי), לתרדמת ועשוי להיות מסכן חיים. לכן, יש לשקול שימוש בפנטאמד יחד עם תרופות הרגעה רק כאשר אין אפשרויות טיפול אחרות.

אולם אם הרופא בכל זאת מחליט על שימוש בפנטאמד יחד עם תרופות הרגעה, המינון ומשך הטיפול צריכים להיות מוגבלים על ידי הרופא.

אנג ספר לרופא על כל תרופות ההרגעה שאתה נוטל, ועקוב בקפידה אחר המינון שהומלץ לך על ידי הרופא. ייתכן שיהיה מועיל ליידע חברים או קרובי משפחה על מנת שהיו מודעים לסימנים ולתסמינים המפורטים לעיל. צור קשר עם הרופא כאשר אתה חווה תופעות כאלה.

הסיכון לתופעות לוואי מסוימות אחרות עולה אם אתה נוטל תרופות כגון נוגדי דיכאון או אנטי פסיכויטים, מכיוון שיתכן תגובה בין תרופתית המתבטאת בשינויים במצב הנפשי (לדוגמה אגיטציה (אי שקט), הזיות, תרדמת (קומה)) ותופעות אחרות כגון חום גבוה מעל 38°C, עלייה בקצב לב, לחץ דם נמוך וציב ופלקטים מוגברים, נוקשות שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תופעות במערכת העיכול (לדוגמה בחילות, הקאות, שלשול). במקרה זה, הרופא ייעץ לך אם פנטאמד מתאימה עבורך.

**שימוש בתרופה יחד עם מזון ושתייה**

מיץ אשכוליות עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי של פנטאמד ולכן אין לשתות מיץ אשכוליות בזמן הטיפול בפנטאמד.

**שימוש בתרופה וזריכת אלוכהול**

פנטאמד עלול לגרום לנמנום במטופלים מסוימים. אין לצרוך אלוכהול בעת הטיפול בתרופה מבלי להיוועץ ברופא כיוון שעלול להיגרם נמנום יתר.

**הריון והנקה**

**אין להשתמש בפנטאמד אם הינך בהריון,** אלא אם כן נאמר אחרת במפורש על ידי הרופא מכיוון שפנטניל עלול לגרום לתסמיני גמילה בילוד ולסכן את חייו.

**אין להניק במהלך הטיפול בפנטאמד** וינן להתחיל להניק לפני שחלפו לפחות 5 ימים מהמנה האחרונה של פנטאמד. פנטניל יכול לעבור לחלב אם ועלול לגרום לישנוניות ודיכוי נשימתי בתינוק היונק.

**אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני שימוש בתרופות.**

**נהיגה ושימוש במכוונת**

פנטאמד עלול לפגוע ביכולתך הנפשית ו/או הפיזית לבצע משימות בעלות סיכון אפשרי כגון נהיגה או הפעלת מכוונת.

אם הינך מרגיש סחרחורת, טשטוש ראייה או נמנום בזמן שימוש בפנטאמד, **אין לנוהג ברכב או להפעיל מכוונת.**

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

**פנטאמד מכיל נתרן**

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבלייה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

לפני התחלת הטיפול בפנטאמד רופאך יסביר לך כיצד עליך לקחת פנטאמד על מנת להשיג הקלה יעילה בכאב מתפרץ.

לפני תחילת הטיפול ובאופן קבוע במהלך הטיפול, הרופא שלך ידון איתך גם למה אתה עשוי לצפות מהשימוש בפנטאמד, מתי וכמה זמן עליך ליטול אותו, מתי לפנות לרופא שלך ומתי עליך להפסיק את השימוש (ראה גם סעיף 2).

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון הטיפול בהתכשיר.

התכשיר מיועד לשימוש **בלבד** לפי הנחיות רופאך. **התכשיר אינו לשימוש באדם אחר מלבדך, משום שהוא עלול להוות סיכון חמור לבריאות, במיוחד בילדים.**

פנטאמד היא תרופה שונה מתרופות אחרות שיתכן שנטלת בעבר לטיפול בכאב מתפרץ. **תמיד יש ליטול פנטאמד במינון הנקבע על לך ידי רופאך** – מינון זה יכול להיות שונה מהמינון של

תרופות אחרות שנטלת **בעבר** לטיפול בכאב מתפרץ.

התחלת הטיפול – ופוסן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**התחלת הטיפול – מציאת המינון המתאים ביותר**

על מנת שפנטאמד יפעל ביעילות, לנט הרופא לזהות את המינון המתאים ביותר לטיפול בכאבך המתפרץ. פנטאמד משווק במספר מינונים. ייתכן שתידרש לנסות מינונים שונים של פנטאמד במשך מספר התקפים של כאב מתפרץ על מנת למצוא את המינון המתאים ביותר עבורך.

רופאך יעזור לך בזאת וידרך איך ליצד למצוא את חוזק הטבלייה המתאים ביותר. אם אינך חש בהקלה מספקת בכאב לאחר מנה אחת, ייתכן שרופאך ידרוך אותך ליטול מנה נוספת לטיפול בהתקף של כאב מתפרץ.

**אין ליטול מנה נוספת, אלא אם כן רופאך הורה לך, משום שהדבר עלול להביא לצריכת מינון יתר.**

ייתכן שרופאך יורה לך ליטול מנה הכוללת יותר מטבלייה אחת ברצף. **ניתן לעשות זאת רק אם הרופא הורה על כך מפורשות.**

יש להמתין ששתיים לפחות מנטילת המנה האחרונה של פנטאמד ועד נטילת המנה הבאה לטיפול בהתקף נוסף של כאב מתפרץ.

**מנת אחזקה (המשך הטיפול) – לאחר שנמצא המינון המתאים ביותר עבורך**

ברגע שאתה ורופאך מצאתם את מנת הפנטאמד ששולטת בכאבך המתפרץ, אין ליטול מנה זאת יותר מארבע פעמים ביום. **מנת פנטאמד יכולה להכיל יותר מטבלייה אחת.**

יש להמתין ששתיים לפחות מנטילת מנת הפנטאמד האחרונה ולפני נטילת המנה הבאה לטיפול בהתקף נוסף של כאב מתפרץ.

אם לדעתך מנת הפנטאמד שהינך נוטל אינה שולטת בכאב המתפרץ שלך באופן מספק, דווח לרופאך, ייתכן שיש צורך להתאים מנה מחדש.

אין לשנות מינון פנטאמד, אלא אם כן נאמר מפורשות על ידי הרופא.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אופן השימוש:**

פנטאמד מיועד לשימוש מתחת לשלשון. יש להניח את הטבלייה מתחת לשלשון, שם היא התמוסס במהירות, וכך החומר הפעיל, פנטניל, יספג ברירית הפה. כאשר נספג, פנטניל מתחיל לשכך את הכאב.

**כאשר הינך סובל מכאב מתפרץ, קח את המנה שנקבעה על ידי רופאך באופן הבא:**

- אם פריך יבש, לגום מים בכדי ללחלוח. ניתן לירוק או לבלוע את המים.
- הואת את הטבלייה מארזית המגשית (בליסטר) **מייד** לפני השימוש באופן הבא:
  - לפרד את אחד מריבועי המגשית (בליסטר) על ידי תלישה לאורך קווי ההפרדה (השאר את שאר ריבועי המגשית [בליסטר] יחד).
  - קלף את קצה רידי האלומיניום בכיוון החץ המסומן והואצ בהירות את הטבלייה. אל תנסה לדחוף את הטבלייה דרך מסכה הרדיי, כיוון שהמדור עלול לפגום בה.
- מקם את הטבלייה מתחת לשלשון אחורה ככל האפשר עד להמסתה המלאה.

- פנטאמד יתמוסס במהירות מתחת לשלשון וייספג על מנת להקל על הכאב.

**אין למוצץ, לחצות, לכתוש, ללעוס או לבלוע את הטבלייה.**

**יש להניח את הטבלייה בשלמותה מתחת לשלשון.**

**אין לשתות או לאכול עד להמסה מלאה של הטבלייה מתחת לשלשון.**

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:**

- יש להוציא מיד שאריות התרופה מהפה.
- ספר על כך למטפל שלך או לאדם אחר.
- פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. על המלווה של המטופל לשמור על ערנות המטופל באמצעות דיבור עימו או נענועו מדי פעם.
- מנת יתר עלולה לגרום גם להפרעה מוחית המכונה ליקואנפאלופתיה רעילה.

**תסמינים של מינון יתר כוללים:**

- נמנום קיצוני
- נשימה נשחית ואיטית
- תרדמת

אם תסמינים אלו מופיעים יש להזעיק סיוע חירום רפואי מיד.

אם בטעות נטל מבוגר או ילד מן התרופה, יש להפנותו מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה**

אם אינך סובל יותר מכאב מתפרץ, אתה יכול להפסיק את השימוש בפנטאמד, אך עליך להמשיך להשתמש בתרופה האופיואידית הקבועה שלך לטיפול בכאב מתמשך על פי הוראות רופאך.

אם הינך סובל מתופעות גמילה או מודאג משיכון כאבך, עלייך להיוועץ ברופא. הרופא ישקול האם יש לך צורך בתרופה לטיפול בתופעות גמילה.

אל תפסיק לקחת פנטאמד בבת אחת, אלא אם כן הרופא שלך אמר לך לעשות זאת. אם אתה רוצה להפסיק לקחת פנטאמד, התייעץ על כך תחילה עם הרופא שלך. הוא יגיד לך איך לעשות זאת, בדרך כלל על ידי הפחתת המינון בהדרגה, כדי שלא תחווה תופעות לא נעימות. אם אתה מפסיק ליטול פנטאמד בבת אחת, ייתכן שתסבול מתופעות גמילה, כגון: עצבנות, חרדה, דפיקות לב, רעד או העעה.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**אם הינך מרגיש מנומנם באופן קיצוני או בלתי רגיל, או שנשימתך נעשית איטית או נשחית, יש לפנות מיד לרופא או להגיע לבית החולים הקרוב לקבלת טיפול דחוף (ראה גם סעיף 3 "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר").**

**תופעות לווא**