

أفكامول 500 ملغ

خبيبات في عبوات شخصية

التريكيب

تحتوي كل عبوة شخصية على:

پاراسيتامول 500 ملغ (Paracetamol 500 mg)

لمعلومات حول المركبات غير الفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر: أنظر البند 2 - "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

الدواء مخصص للبالغين وللأطفال من جيل 9 سنوات فما فوق. يجب عليك تناول هذا الدواء بموجب التعليمات في بند مقدار الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تنقش في غضون 5 أيام، على الرغم من استعمال الدواء.

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء مخصص لخفض السخونة ولتسكين الآلام الناتجة عن أسباب مختلفة، مثل حالات الصداع، الآلام الأسنان، الزكام، الإنفلونزا، الآلام الروماتيزمية والآلام الشهرية.

الفصيلة العلاجية:

مسكن الآلام وخافض للسخونة.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

وجدت لديك حساسية (أرجية) لـ پاراسيتامول أو لكل واحد من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

إذا كنت قد طورت في الماضي أعراضًا جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فيُمنع تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تحدث تالية أعراضًا جلدية خطيرة.

يجتنب المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:

- يعطى بجرعة بمقدار أعلى من الموصى به أو لفترة طويلة

- يتم شرب مشروبات كحولية أثناء العلاج
- يتم تناول أدوية إضافية تؤثر على وظيفة الكبد

- يُمنع استعمال هذا الدواء في أوقات مقاربة دون استشارة الطبيب.

- يُمنع تناول أدوية إضافية لخفض السخونة ولتسكين الآلام أو أدوية لزلات البرد دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، لتفادي جرعة مفرطة أو تسمم من الـ پاراسيتامول.

- يُمنع تناول أدوية إضافية من "عائلة أكامول" أو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.

- يجب تجنب تناول جرعة عالية (حتى لو كانت ضمن نطاق الجرعة الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- أخبر الطبيب قبل بدء العلاج بـ أفكامول إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- حساسية لطعام أيًا كان أو لدواء أيًا كان
- مرض كبدّي أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- إدمان على الكحول
- يرقان

إذا كنت حاملاً أو مرضعة

خلال استعمال الدواء، أخبر طبيبك فوراً إذا: كنت تعاني من مرض خطير، بما في ذلك خلل كلوي شديد أو إبتنان الدم (وهي حالة تنتشر فيها البكتيريا وسومها في مجرى الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، إدمان الكحول المزمن، أو إذا كنت تتناول أيضاً فولوكوكساسيلين (مضاد حيوي). تم الإبلاغ عن حالة خطيرة لدى الحماض الأيضي (خلل في الدم وسوائل الجسم) أثناء مرضي لديهم هذه الحالات عند تناولهم الباراسيتامول بالجرعة المتبعة لفترة مطولة أو عند تناولهم پاراسيتامول مع فولوكوكساسيلين. قد تشمل أعراض الحماض الأيضي: صعوبات شديدة في التنفس مع تنفس عميق وسريع، نعاس، شعور بالغثان وحالات تقيؤ.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء مخصص للأطفال من عمر 9 سنوات وما فوق، انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟".

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يُعطى للطفل.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية دون وصفة طبيب والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

- أدوية ضد تخثر الدم مثل وارفارين
- مستحضرات تحفز إنتاج إنزيمات في الكبد (مثلاً: ريفامبيسين، بربيتورات)
- أدوية المصراع - فينيتوين، كاربامازيبين
- مستحضرات مضادة للالتهاب لستيرويدية
- ميتوكلوراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثان، التقيؤ ومشاكل هضم إضافية)
- كلورامينفينول (مضاد حيويّ)
- بروبينيسيد (لعلاج النقرس)
- كوكستيرامين (لتقليل فرط الدهون في الدم)
- فولوكوكساسيلين (مضاد حيوي). هناك خطر حدوث اضطرابات في الدم وسوائل الجسم (هذا الاضطراب يسمى الحماض الأيضي)، وهي حالة تتطلب علاجاً عاجلاً (انظر البند 2).

استعمال الـ پاراسيتامول واستهلاك الكحول

يُمنع استهلاك الكحول أثناء العلاج بـ پاراسيتامول وذلك بسبب زيادة خطر الإصابة بضرر للكبد.

الحمل والإرضاع

الحمل

إذا كنت حاملاً أو مرضعة فيجب استشارة الطبيب قبل بدء استعمال الدواء.

يجب تناول أقل جرعة فعالة بالنسبة لك لتسكين الألم و/أو لخفض السخونة، لأصغر فترة زمنية ممكنة. استشريري الطبيب إذا لم يخف الألم أو السخونة أو إذا كنت بحاجة

إلى تناول الدواء في أوقات أكثر تواتراً.

الإرضاع

تنتقل كميات صغيرة من الـ پاراسيتامول إلى حليب الأم. يجب استشارة الطبيب قبل الإرضاع.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يؤثر پاراسيتامول في القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

- يحتوي على سوربيتول بكمية 801 ملغ في كل جرعة شخصية. سوربيتول هو مصدر للفركتوز، إذا أخبرك الطبيب أنك لديك حساسية لسكريات معينة أو تم تشخيصك أنك لديك عدم تحمل وراثي للفركتوز (HFI)، حالة وراثية نادرة لعدم القدرة على تفكيك الفركتوز، فيجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال. قد يسبب السوربيتول ألماً في البطن وإسهالاً.

- يحتوي على سكروز، إذا قيل لك من قبل الطبيب أنك حساس لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

- يحتوي على كبريتات. قد تسبب رد فعل شديد لفرط الحساسية وتشنج قضيبي في أوقات متباعدة (تشنج القصبات الهوائية في الرئتين).

- يحتوي على الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في كل جرعة وبالتالي يُعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب، فإن الجرعة المقبولة عادة هي:

الأطفال في عمر 9-12 سنة:

عبوة شخصية واحدة من أفكامول 500 ملغ أو عبوة شخصية واحدة من أفكامول 250 ملغ، كل 4-6 ساعات، حسب الحاجة.

يُمنع تناول أكثر من 4 عبوات شخصية في يوم واحد من أفكامول 500 ملغ أو 8 عبوات شخصية في يوم واحد من 250 ملغ (2 غرام پاراسيتامول).

يُتوفر منتج منفصل يحل يحتوي على پاراسيتامول 250 ملغ - أفكامول 250 ملغ.

البالغون والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق:

1-2 عبوات شخصية من أفكامول 500 ملغ، كل 4-6 ساعات، حسب الحاجة.

يُمنع تناول أكثر من 8 عبوات شخصية في يوم واحد (4 غرامات پاراسيتامول).

يُمنع تناول جرعة جزيئية من عبوة شخصية واحدة، لأنه لا يمكن تحديد الجرعة بدقة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب عليك التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تنقش في غضون 5 أيام، على الرغم من استعمال الدواء.

طريقة الاستعمال

يُمنع تناول الطعام مع الطعام. يجب فتح العبوة الشخصية من أفكامول 500 ملغ، تفرغ محتواها مباشرة داخل الفم، إلى اللسان، والبلع.

لا حاجة للماء.

