

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## צפוויט פורטה תרחיף, 250 מ"ג/5 מ"ל, אבקה להכנת תרחיף

הרכב:

כל 5 מ"ל מכיל:

צפלקסין (כמונוהידראט) 250 מ"ג - Cephalixin (as monohydrate) 250 mg.

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגיים בתרופה- ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

תרופה אנטיביוטית זו מיועדת לטיפול בזיהומים שנגרמים על ידי מיקרו-אורגניזמים הרגישים לצפלקסין.

**קבוצה תרופוטית:** צפלוספורינים מהדור הראשון.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (צפלקסין), לתרופות אנטיביוטיות אחרות מקבוצת הצפלוספורינים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). תגובה אלרגית עלולה לכלול: פריחה, גרד, קשיי נשימה, או נפיחות בפנים, בשפתיים, בגרון או בלשון.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בצפוויט פורטה תרחיף, ספר לרופא אם:

- אי פעם פיתחת פריחה עורית חמורה או קילוף עור, שלפוחיות ו/ או פצעים בפה לאחר נטילת צפלקסין או תרופות אנטיביוטיות אחרות.
- הייתה לך תגובה אלרגית לצפלקסין, לצפלוספורינים, לפניצילינים, או לתרופות אחרות בעבר.
- אתה מפתח שלשול חמור או ממושך במהלך או לאחר נטילת צפלקסין.
- אתה סובל מהפרעה כלייתית חמורה (ייתכן שתצטרך מינון נמוך).

### אזהרה מיוחדת נוספת

פוסטלויזיס תיפרחתיית מופשטת חדה (AGEP) דווחה בשימוש בצפלקסין. AGEP מופיעה בתחילת הטיפול כפריחה אדומה קשקשית נרחבת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלווה בחום. המיקום השכיח ביותר: בעיקר בקפלי העור, בגו ובגפיים העליונות. הסיכון הגבוה ביותר להתרחשות של תגובת עור חמורה זו הוא בשבוע הראשון לטיפול. אם אתה מפתח פריחה עורית חמורה או תסמיני עור נוספים אלו, הפסק לטול צפוויט פורטה תרחיף ופנה לרופא שלך או פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

### בדיקות ומעקב

ספר לרופא שלך אם אתה עומד לעבור בדיקות דם ו/ או שתן. צפוויט פורטה תרחיף עלול להפריע לבדיקות אלו.

### תגובות בין תרופתיות:

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- כל אנטיביוטיקה אחרת (כגון גנטמיצין, טוברמיצין, צפורוקסים).
- תרופות משתנות חזקות כגון פרוסומיד (לטיפול בלחץ דם גבוה או בבצקת - אצירת נוזלים).
- פרובנציד (לטיפול בשיגדון - גאוס).
- מטפורמין (לטיפול בסוכרת).
- תרופות המשמשות לטיפול בלוקמיה.

גם אם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות הרשומות לעיל, ייתכן שהטיפול בצפוויט פורטה תרחיף עדיין נכון עבורך, על פי החלטת הרופא שלך.

### שימוש בתרופה ומזון

ניתן לטול צפוויט פורטה תרחיף עם או ללא מזון.

### היריון והנקה:

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

### נהיגה ושימוש במכונית:

התרופה לא צפויה להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונית.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- התרופה זו מכילה סוכרוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך או לילדך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת התרופה או מתן התרופה לילדך.
- התרופה זו מכילה 25 מ"ג סודיום כנזאט בכל 5 מ"ל צפוויט פורטה תרחיף. סודיום כנזאט עלול להגביר צהבת (הצהבה של העור והעיניים) אצל ילידים (עד גיל 4 שבועות).
- התרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול של נתרן (23 מ"ג) ב- 5 מ"ל, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

### המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**למבוגרים ולמתבגרים מעל גיל 12 שנים:**

המינון ליממה הוא 1-4 גרם, הניתן במנות מחולקות (2-8 מנות של 500 מ"ג, או 4-16 מנות של 250 מ"ג), בהתאם לסוג ולחומרת הזיהום.

### מינון לילדים מתחת לגיל 12 שנים:

הרופא יחשב את המינון המדויק לילדך לפי משקל הגוף. המינון המקובל הוא 25-50 מ"ג/ק"ג משקל גוף ליממה, הניתן במנות מחולקות כל 8 או 12 שעות.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

### משך הטיפול-

אם לא חל שיפור במצבך בתוך מספר ימים, פנה לרופא בשנית. יש להשתמש בתרופה במרווחי זמן קבועים, בהתאם להוראות הרופא.

### הוראות הכנת התרחיף

יש להכין את התרחיף בהתאם להוראות ההכנה המופיעות על גבי תווית הבקבוק:

הרוקח יוסיף 36 מ"ל מים מזוקקים לבקבוק, להכנת 60 מ"ל של תרחיף וינער היטב עד לקבלת תרחיף אחיד (הומוגני).

### צורת הנטילה:

- יש לנער את הבקבוק היטב לפני כל שימוש.
- יש להקפיד על מדידת מנת התרחיף בכוסית המדידה המצורפת.
- ניתן לטול את התרופה עם או ללא מזון.

### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזת התרופה איתך.

### אם שכחת לטול את התרופה

אם שכחת לטול את התרופה בזמן הדרוש, יש לטול מנה מייד כשזכרתך, אך אם כמעט הגיע הזמן לטול את המנה הבאה; דלג על המנה שנשכחה והמשך בטיפול כרגיל. אין לטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם התסמינים נעלמו, חשוב להשלים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן המומלץ עלולה להוביל להתפתחות עמידות חידקים לתרופה ולחזרת הזיהום.

**אין לטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בצפוויט פורטה תרחיף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**פנה מייד לרופא שלך** אם אתה סובל מצפצופים פתאומיים, קושי בנשימה, התנפחות של העפעפיים, הפנים, או השפתיים, פריחה או גרד (במיוחד אם זה משפיע על כל הגוף שלך).

**תופעות לוואי חמורות:** תופעות הלוואי הבאות הן חמורות. עליך להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא באופן מיידי אם אתה חווה אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- קילוף חמור או שלפוחיות על העור.
- שלשול חמור.

- פריחה אדומה וקשקשת נרחבת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלוות בחום בתחילת הטיפול (פוסטולוזיס תיפרחתית ממושטת חדה - AGEP). ראה גם בסעיף 2 "אזהרה מיוחדת נוספת".

**תופעות לוואי נוספות:**

- שלשול
- בחילה
- הקאה
- הפרעות עיכול
- כאבי בטן
- פריחה דמוית חצבת (ללא תסמינים נלווים)
- גירוד
- חבורות אדומות על העור (אורטיקריה) (ללא תסמינים נלווים)
- פריחה עם כאבי מפרקים ממושטים ו/ או נוקשות מפרקים, בלוטות לימפה נפוחות, חום וייתכן גם שתן עכור.
- שינויים בספירת תאי הדם, שעלולים להתבטא בחבורות או תחושת עייפות קיצונית. יש צורך בבדיקת דם כדי לאשר זאת.
- פגיעה בכבד או בכליות, שניתן לגלות בבדיקת דם ו/ או שתן.
- צהבת (הצהבה של העור ושל הלחמיות בעיניים)
- חולשה
- עילפון
- התנהגות נרגשת מהרגיל
- אי שקט
- עייפות
- כאב ראש
- בלבול
- סחרחורת
- שמיעה או ראייה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- אנצפלופתיה (מחלת מוח לא דלקתית)
- פרנסים
- מיקולנוס (תנועות בלתי רצונית של השרירים)
- גירוד של הנרתיק או פי הטבעת הנגרם כתוצאה מפטרת (קנדידה).

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או אם כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס הדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

**5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/ או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

**• תנאי אחסון:**

- **אבקה יבשה:** יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.

- **תרחיף מוק:** יש לאחסן את התרחיף המוכן במקרר (2°C-8) ולהשתמש בו בתוך 14 ימים.

- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

**6. מידע נוסף**

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Sucrose, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Strawberry Flavour, Simethicone, Citric Acid Anhydrous, Yellow Iron Oxide (E 172), Banana Flavour, Peach Flavour, Disodium Edetate.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

בקבוק עם פקק הגנה מפני פתיחה על ידי ילדים. המכיל אבקה בצבע כתום עד צהוב וכוסית מדידה.

לאחר הוספת מים מזוקקים, יתקבל תרחיף בצבע כתום עד צהוב, בעל ריח פירותי.

**גודל אריזה מאושר:** 60 מ"ל.

**יצרן ובעל הרישום:** ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

רח' הטחנה 6, ת"ד 114, בנימינה 3055002, ישראל.

נערך באוקטובר 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 026-83-25148-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.