

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אקסידול, קפלוית

כל קפליה מכילה:

חומצה אצטילסליצילית 250 מ"ג

פרצטמול 250 מ"ג
Acetylsalicylic acid 250 mg

פאפאין (אנהידרוס) 65 מ"ג
Paracetamol 250 mg

קפאין (אנהידרוס) 65 מ"ג
Caffeine (anhydrous) 65 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגיים בתכשיר, ראה סעיף 6 **"מידע נוסף"**.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרת שתתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממניתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לטיול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף 3 – **כיצד תשתמש בתרופה?**• היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 5 ימים לטיפול בכאב או לאחר 3 ימים לטיפול בכאב המלווה בחום (ראה סעיף 3 **"כיצד תשתמש בתרופה?"**).

1. למה מיועדת התרופה?

אקסידול מיועד להקלה זמנית על כאבי ראש, כאב ראש קל עד בינוני הקשור למיגרנה, כאבי וסת וכאב המלווה בחום.

קבוצה תרופתית:

חומצה אצטילסליצילית – נוגד דלקת שאינו סטרואידי (NSAID). פרצטמול – משכך כאבים ומוריד חום.

פאפאין – קסנטין אלקלואיד, מעורר את מערכת העצבים המרכזית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש באקסידול אם:

• **אתה גריש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף")**• **הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לתרופות אחרות המשמשות לטיפול בכאב, בדלקת או בחום,** כגון חומצה אצטילסליצילית, סליצילאט, דיקלופנאק או איבופרופן.
תסמינים של תגובה אלרגית עלולים לכלול: אסתמה, צפצופים או קוצר נשימה, פריחה עורית או חרלת, התנפחות של הפנים או הלשון, גומל, או אינך בטוח, שאל את הרופא או הרוקח שלך
• **יש לך ניב קרבה או ניב במעיים,** או אם יש לך היסטוריה של **ניב עיכולי (פפטי)** • **הבחנת בדם בצואה או בצואה שחורה (תסמינים של דימום או נקבים במערכת העיכול)** • **הנך סובל מהמופליה או הפרעות אחרות בדם** • **הנך סובל מבעיות חמורות בלב,** **בכבד ובכליות** • **הנך נוטל יותר מ15 מ"ג מתורקסט לשבוע** (ראה סעיף **"אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות"**) • **הנך נמצאת בשלושת החודשים האחרונים של ההריון** (ראי סעיף **"הריון, הנקה ופוריות"**).

אזהרות מיוחדות לגבי הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באקסידול, ספר לרופא אם:
• לא אוכזבת בעבר כסובל ממיגרנות, מאחר שיש לשלול לפני הטיפול מצבים שעשויים להיות חמורים אשר קשורים למוח או למערכת העצבים • **הנך סובל ממיגרנה** שהיא כה חריפה אשר **דורשת מנוחה במיטה,** או אם יש לך כאב ראש שונה מהמיגרנות הרגילות שלך, או אם הנך סובל **מהקאות יחד עם כאבי הראש של המיגרנה** • **התחלת לסבול מכאבי ראש לאחר או עקב פגיעת ראש, מאמץ, שיעול או התכוופות** • **יש לך כאבי ראש כרוניים** (חמישה עשר ימים או יותר בחודש במשך יותר משלושה חודשים), או אם חווית את כאב הראש הראשון לאחר גיל 50

• **הנך סובל מבעיות בכבד או בכליות,** תת משקל או תת תזונה או שהנך שותה אלכוהול באופן רגוע. ייתכן שתצטרך להימנע לחלוטין משימוש במוצר או שתצטרך להגביל את צריכת פרצטמול • **הנך סובל מזיהום חמור,** תת תזונה חמורה, תת משקל חמור או הנך שותה אלכוהול תמיד. זה עלול להגביר את הסיכון לחמצת מטבולית. סימנים של חמצת מטבולית: קשיי נשימה (נשימה מעוקה, מהירה), בחילות, הקאות ואובדן תיאבון. יש לפנות לרופא מיידית אם הנך חווה תסמינים אלה • **אתה סובל מצמצם תורשתי הנקרא חסר באינזי G6PD (גלוקו-6-פוספט דהידרוגנאז) אשר משפיע על כדוריות הדם האדומות ועלול לגרום לאנמיה,** גחבת או הגדלת הטחול, כאשר יש חשיפה למזונות מסוימים ולתרופות כגון תרופות נוגדות דלקת מסוימות [כגון חומצה אצטילסליצילית (אספירין)]. או לגרום למחלות אחרות • **סבלת בעבר מבעיות במערכת העיכול** כגון ניב קיבה, דימום או צואה שחורה. אם הייתה לך אי נוחות בטנית או צרבת לאחר נטילת משככי כאבים או תרופות נוגדות דלקת • **הנך סובלת מהפרעות ל דימומים או דימום מהנרתיק אשר אינו תקין** בשונה מהווסת (כגון דימום וסתי ממשך וכבד באופן יוצא דופן). **עברת לאחרונה ניתוח (כולל ניתוחים קטנים כגון ניתוח שיניים) או הנך עומד לעבור ניתוח** במהלך שבועת הימים הקרובים • **הנך סובל מאסתמה מבוגרים, קדחת השחח (זלת אלרגית), פוליפים באף, מחלה נשימתית כרונית או שהנך מפתח תסמינים אלרגיים** (כגון תגובות עוריות, גרד, סרפדות). • **הנך סובל משיגדון (גאטו), סוכרת, פעילות יתר של בלוטת התריס, הפרעות בקצב הלב, יתר לחץ דם לא מבוקר, ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד** • **הנך סובל מהמתכרות לאלכוהול** (ראה בהמשך סעיפים – **שימוש בתרופה ומזון**) **"שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול"** • **הנך נוטל תרופות אחרות המכילות חומצה אצטילסליצילית (אספירין) או פרצטמול,** או תרופות אחרות, מאחר שתרופות מסוימות עלולות להפריע לאקסידול ולגרום לתופעות לוואי (ראה בהמשך **"אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות"**) • **הנך נמצא בסכנת לדייבשות (לדוגמה: הקאות, שלשול, או לפני או אחרי ניתוח גדול)** • **גילך פחות מ-18 שנים.** יש קשר אפשרי לחומצה אצטילסליצילית (אספירין) לתסמונת ריי כאשר ניתן לילדים ולמתבגרים. תסמונת ריי הינה תסמונת נדירה, אשר משפיעה על המוח והכבד ועלולה להיות קטלנית. מסיבה זו, אין להשתמש באקסידול במתבגרים וילדים מתחת לגיל 18 ללא הנחיה מפורשת מהרופא.

אזהרות נוספות

כמו בנטילת כל סוג של משככי כאבי ראש, נטילת אקסידול לעיתים קרובות מדי (כלומר, יותר מעשרה ימים בחודש עבור תרופה זו) כאשר יש כאבי ראש כרוניים (חמישה עשר ימים או יותר לחודש), למשך יותר משלושה חודשים, עלולה להחמיר את כאב הראש או המיגרנה שלך.

אם אתה חושב כי זה עשוי להפית המקרה, פנה לרופא שלך להתייעצות. ייתכן שתצטרך להפסיק את נטילת אקסידול כדי לפתור את הבעיה.

אקסידול עלול להפחית תסמיני זיהום (כגון כאב ראש, חום גוף גבוה) ולכן עשוי לגרום לכך שקשה יותר לזהות את הזיהום. אם אינך מרגיש טוב ועליך לפנות לרופא, זכור לומר לו כי אתה נוטל אקסידול.

ילדים ומתבגרים

אקסידול אינו מיועד לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 12 שנים.

בדיקות ומעקב

אקסידול עלול להשפיע על תוצאות של בדיקות מעבדה. אם התבקשת לבצע בדיקות דם, שתן או בדיקות מעבדה אחרות, זכור לספר כי אתה נוטל אקסידול.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרוקח או לרוקח. לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

• **כל תכשיר אחר אשר מכיל פרצטמול, חומצה אצטילסליצילית (אספירין), או כל משכך כאבים/מוריד חום אחר** • **תרופות למניעת קרישת דם** כגון נוגדי קרישה פומיים (לדוגמה וארפין), הפרין, תרופות להמסת טיק (לדוגמה סטרפטוקינאז), או תרופות נוגדות טסיות אחרות (טיקלופדיין, קלופידוגרל, צילוסטאזול) • **קורטיקוסטרואידים** (שמשמשים להקלה בדלקת) • **לרביטורטים ובנזודיאזפנים** (טיפול בחדתי ובנדודי שינה) • **ליתיום, מעכבי קליטה חוזרת בררניים של סרוטונין (SSRI) או פלובוקסמין** (טיפול בדיכאון) • **סולפוניל-אוריאה ואינוסלין** (לטיפול בסוכרת) • **מתורקסט** (טיפול בסוגים מסוימים של סרטן, דלקת פרקים או פסח) • **תרופות מסוימות לטיפול בזיהום בקולד** (טיפול במחמט טיק (לדוגמה סטרפטוקינאז), או תרופות חומצה פיפמידית) • **לבותירוקסין** (טיפול בתת פעילות של בלוטת התריס) • **מטוקולפראמיד** (טיפול בבחילות בהקאות) • **תרופות לטיפול באיילפסה** • **תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ובאי ספיקת לב** • **תרופות משתנות** (להגברת ייצור שתן והפחתת עודף נוזלים) • **תרופות לטיפול בשיגדון (גאטו)** • **אמצעי מניעת הריון פומיים** • **זידובודין** (טיפול בגנף השל החיסוני האנושי) • **תרופות לטיפול בפניני קיבתי ארטי** (כגון פרופנולין) • **קלזאפנין** (טיפול בסכיזופרניה) • **תרופות סימפנומיטיות** (להעלת לחץ דם או לטיפול בגודש באף) • **תרופות נגד אלרגיה** (טיפול או להקלה באלרגיות) • **תאופילין** (טיפול באסתמה) • **טריבופנין** (לטיפול בזיהומים פטרייתיים) • **סימטידין** (טיפול בצרבת ובניב פפטי) • **דיסולפלאם** (טיפול בתלות באלכוהול) • **ניקוטין** (מגמליה מעישון) • **כולסטיראמין** (טיפול ברמות כולסטרול גבוהות) • **פלוקלוקסצילין** (אנטיביוטיקה), עקב סיכון רציני להפרעות בדם ובנוזלים (high anion gap metabolic acidosis) אשר מחייבת טיפול דחוף ועלולה לקרות במיוחד במקרים של פגיעה ללייחית חמורה, אלח דם (מצב בו הידיקים והרעלים שלהם נמצאים כנוי ומובילים לפגיעה באיברים), תת תזונה, אלכוהולים כרוני ובמקרים שיש שימוש במינון יומי מקסימלי של פרצטמול.

שימוש בתרופה ומזון

הינה המומלצת של תרופה זו כוללת כמות קפאין דומה לזו שיש בכוס קפה. התקופות השימש בתרופה, הגבל צריכת התרופות, מאלים ומקשות הכוללים קפאין כיוון שיתר מדי קפאין עלול לגרום לעצבנות, חוסר שקט, נדודי שינה, ולעיתים לדפיקות לב מהירות.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע מצריכת אלכוהול בזמן השימוש בתרופה. אם אתה צורך שלשה או יותר משקופות של אלכוהוליים בכל יום, שאל את הרופא שלך אם עליך לטיול תרופה או לנטילת אחרות האלקתל כאב/הורדת חום. פרצטמול וחומצה אצטילסליצילית (אספירין) עלולים לגרום לזנח בכבד ולדימום בקיבה.

הריון, הנקה ופוריות

תרופה זו אינה מומלצת במהלך הריון.

אם את בהריון, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, **ספרי לרופא שלך ואל תטלי אקסידול.**

הריון – שליש אחרון

חשוב במיוחד של לטיול אקסידול במהלך שלושת החודשים האחרונים של ההריון, מאחר שהדבר עלול להזיק לעובר או לגרום לבעיות בזמן הלידה. זה עלול לגרום לבעיות כלביות או בלב בעובר. לבלול להשפיע על הנטייה שלך או של התינוק שלך לזמא או לגרום ללידה מאוחרת מהצפוי.

הריון – שליש ראשון ושני

בשל תכולת האספירין, אין לטיול תרופה זו במהלך 6 החודשים הראשונים להריון, אלא אם הטיפול הכרחי ובהמלצת הרופא שלך בלבד.

אם את צריכה טיפול במהלך תקופה זו, יש להשתמש במינון הנמוך ביותר ולהקפזה הקפריה ביותר. אם נטלת תרופה זו למשך יותר מימה ימים משבוע 20 להריון ואילך, אספירין עלול לגרום לבעיות בכליות בתינוק שטרם נולד, מה שמוביל לרמות נמוכות של מי שפירי משקפיים את תינוקך או להיצרות של כלי הדם בלב תינוקך (ductus arteriosus). אם תדקקי לטיפול ממשך יותר מכמה ימים, הרופא עשוי להמליץ כולל בדיקות מעקב נוספות.

אקסידול אינו מומלץ בזמן הנקה.

התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בכל תרופה.

אקסידול שייך לקבוצת תרופות (NSAIDs) אשר עלולות לפגוע בפוריות בנשים. השפעה זו הינה הפיכה כאשר מפסיקים את נטילת התרופה.

נהיגה ושימוש במכוונת

לנטילת אקסידול אין השפעה ידועה על יכולתך לנהוג ולהשתמש במכוונת.

אם אתה מבחין בתופעות לוואי כגון סחרחורת או נמנום, עליך להימנע מנהיגה ומשימוש במכוונת. ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לדיקוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

לטיפול בכאב ראש המקווש למיגרנה:

מבוגרים: שתי קפלויות. באם התרופה נלקחה למיגרנה ולא חלה הטבה או שחלה החמרה לאחר מנה ראשונה, יש להתייעץ עם רופא. יולדים מתחת לגיל 18: יש להתייעץ עם רופא.

לכאבי ראש, כאבי וסת וכאב המלווה בחום:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2 קפלויות כל 6 שעות.

הקלה בכאב עשויה להיות מורגשת תוך 15 דקות מלקיחת המנה. אין לטיול יותר מ-8 קפלויות ב-24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין להשתמש בתרופה לפרק זמן העולה על 5 ימים לכאב או 3 ימים לכאב המלווה בחום ללא התייעצות עם רופא.

קשישים:

אין המלצה למינון מיוחד. אם יש לך משקל גוף נמוך, עליך להיוועץ עם הרופא או הרוקח.

יש לבלוע את הקפליה בשלמותה עם כוס מים מלאה.

אין לחצות או לכתוש את הקפליה. אין מידע לגבי חצייה/כתישה/לעיסה.

אין לשכב 15-30 דקות לאחר נטילת התרופה.

קפלויות אקסידול מכילות חומצה אצטילסליצילית (אספירין), פרצטמול וקפאין. אין לטיול יותר מהמינון המומלץ ואין לטיול תרופות אחרות אשר עשויות להכיל מרכיבים אלו או מרכיבים אחרים המשמשים לטיפול בכאב, בדלקת או בחום גבוה (תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות) במהלך השימוש באקסידול.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את ארית התרופה איתך. טיפול רפואי מיידי הוא קריטי, **לאור הסיכון האפשרי לזנח בלתי הפיך לכבד** בגלל הפרצטמול. אל תחכה להופעת התסמינים מאחר שבהתחלה מנת היתר עשויה שלא לגרום לתסמינים שניתן להבחין בהם.

אם מופיעים תסמינים של מנת יתר הם עשויים להיות:

• **עבור חומצה אצטילסליצילית (אספירין):** סחרחורת, צלזולים באוזניים, חשות, היעה, נשימת יתר, חום גבוה, בחילות, הקאות, כאב ראש, בלבול או חוסר מנוחה, קריסה סירקולטורית (של זרימת הדם) או כשל נשימתי • **עבור פרצטמול:** התסמינים הראשונים שעלולים להופיע – בחילות, הקאות, חוסר תיאבון, חיוורון, ישנוניות, הזעה ולאחר מכן כאב בטן • **עבור קפאין:** חרדה, עצבנות, חוסר מנוחה, דדודי שינה, תרגישות, התכוונות שרירים, בלבול, פרוכוסים, היפרגליקמיה, סטרקדריה (קצב לב מהיר) או הפרעות בקצב הלב.

אפילו אם תסמינים אלו לא מופיעים או אם הם נעלמים, חיוני לגשת לעזרה רפואית באופן מיידי.

אם שכחת לטיול את התרופה

יש לטיול את התרופה ברגע שנזכרת אך אל תיטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה ששכחה.

אין לטיול יותר מ-8 קפלויות בפרק זמן של 24 שעות.

אין לטיול תרופות נוספות. בדוק את תהותי והזמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקסידול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן של סכובל מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה חווה אחת או יותר מתופעות הלוואי החמורות הלול:

• **תגובה אלרגית** עם נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון. הדבר עלול לגרום לקשיי בליעה, צפצופים בעת נשימה, קשיי נשימה, ותחושת לחץ בחזה (סימנים של אסתמה). עלולה להיות לך חם פריחה או גרד, או שתחווה עליפון • **פריחה עורית (כולל חרלת, גרד),** אדמומית של העור, שלפוחיות בשפתיים, בעיניים או בפה, קילוף של העור, פצעים, כיבים בפה • **דימום בקיבה או במעיים,** הזעה ולאחר מן כיב במעיים, אשר עלולים להיות מלווים בכאב בטן חריף, הקאה דמית, צואה דמית או שחורה, או הקאה דמית. כמו בטיפול עם כל משככי כאבים ומורדי חום, תופעות אלו עלולות לקרות בכל זמן במהלך הטיפול. ללא היסטוריה קודמת עלולות להיות קטלניות. תופעת לוואי זו חמורה במיוחד בקשישים • **הצטבה של העור** או העיניים (סימנים לכשל כבדי) • **סחרחורת או כאב ראש קל** (סימנים של לחץ דם גבוה) • **קצב לב לא סדיר** • **חווית בעיות נשימה** עם חומצה אצטילסליצילית או נוגד דלקת אל סטרואידי, והנך חווה תגובה דומה עם אקסידול • **חבורות או דימומים בלתי מוסברים** • **עלייה במספר הדיומוים** מהאף או החבלות • **נפיחות או אגירת מים** • **צלזולים באוזניים** או איבוד שמיעה זמני • **שינויים בהתנהגות, בחילות והקאות** – זה עלול להיות סימן לתסמונת ריי.

תופעות לוואי נוספות

תופעות הלוואי שלהלן דווחו ב-16 מחקרים קליניים שבוצעו על למעלה מ-4,800 מ-10 מטופלים.

ספר לרופא שלך אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי האלו:
תופעות לוואי שכוחות (common) – תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 10 משתמשים:

• **עצבנות, סחרחורת** • **בחילות, אי נוחות בטנית**
תופעות לוואי שאינן שכוחות (uncommon) – תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 100 משתמשים:
• **נדודי שינה, רעד, תחושת נימול, כאב ראש** • **יובש בפה, שלשול, הקאות** • **עייפות, תחושת עצבנות** • **עלייה בקצב הלב**
תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 1,000 משתמשים:
• **כאב גרון, קשיי בליעה,** תחושת נימול או קצצופים סביב הפה, עודף רוק • **ירידה בתיאבון, שינויים בחוש הטעם** • **חרדה, אופוריה, מתח** • **הפרעות קשב, אובדן יזכרון, שינוי בקואורדינציה (תיאום תנועות)** • **תחושת כאב בלחיים ובמצח** • **כאב עיניים, הפרעות אריהי** • **גלי חום, בעיות בכלי דם היקפיים** (כגון ברורעות או בגרגלים) • **דימום באף, נשימה אריתית שטחוה,** נזלת גיהוקים, נפיחות בוזים) • **הזעת יתר, גרד, פריחה מוגדלת, עלייה ברגישות העור** • **קשיון של השרירים, העצמות או המפרקים;** כאב צוואר, כאב גב, התכוונות שרירים • **חולשה, אי נוחות בחזה**
תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

תופעות הלוואי שלהלן דווחו גם מאז תחילת שיווק התרופה. באופן כללי לא ניתן לקבוע מדויק את השכיחות בזמן המעקב בהקופה שלאחר השיווק, ולכן השכיחות מוצינת כ-"לא ידועה":
• **חוסר מנוחה, הרגשה כללית לא טובה או לא תקינה** • **ישנוניות, מיגרנה** • **אדמומית של העור, פריחה.** דווחו מקרים נדירים מאוד של תגובות עוריות חמורות • **דפיקות לב,** קוצר נשימה, קשיי נשימה פתאומיים ותחושה של לחץ בחזה עם צפצופים או שיעול (אסתמה) • **כאב בטן, אי נוחות בטנית** לאחר ארוחות • **עליה באינזימ כבד** • **נפיחות וגזרי בתן האף** • **בעיות בכליות**
דייווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי מרופא הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המנחה תוספס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כתיסה לקשור: **https://sideeffects.health.gov.il**

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה: **padagis.co.il**

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם וטווח ראייהם של ילדים ולאז תינוקות ועל ידי כך מנעו הרעלה. אל תגרום להיקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס לזיהום האחרון של אותו חודש • **הנאי אחסון:** האחסן בתפוגת מתיחה לנמוכה מ-25°C
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 9 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה. זה עלול להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:** Microcrystalline cellulose, hypromellose, stearic acid, crospovidone, titanium dioxide, pregelatinized starch, propylene glycol, povidone, carnauba wax, saccharin sodium, blue No. 1 FD&C lake.

- כיצד נרשמת התרופה ומח** 24 שנים: **אפילו** התרופה מגיעה עם כבידוקונתים המכילים **ומה** 50 או 100 קפלויות לבינו עם הטבעה "L374" בעד אחד. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים. אריזאה מכילה סופח לחות. אין לבלוע את סופח הלחות או להוציא מהבבקבוק.
- בחל הרישום וכתובתנו:** פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ, רמת רפת 1 שוהם.
- שם היצרן וכתובתנו:** חברת פריגו, אלאגן, מישיגן, ארה"ב.
- מספר במרץ 2025.**
- נוספי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 13677.31055
- לשם הפטנט והלקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.

<p>למידע נוסף על התכשיר ולעלונים מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סירקו את הקוד הבא:</p> <p>For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:</p> 
<p>ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני: cs_pharma@padagis.com או בטלפון מספר: 1-800-388-288.</p> <p>To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: cs_pharma@padagis.com or by telephone: 1-800-388-288.</p>