

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
מרבוציל 2% תמיסה להזרקה וטרינרי

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון
1 מ"ל תמיסה מכיל:
מרבופלוקסצין (marbofloxacin) 20 מ"ג

מרכיבים בלתי פעילים: דיסודיום אדטאט 0.1 מ"ג/מ"ל, תיוגליצרול 0.5 מ"ג/מ"ל,
מ-קרסול 2 מ"ג/מ"ל.
לרשימה מלאה של מרכיבים בלתי פעילים, ראו סעיף 13 בהמשך העלון.

3. למה מיועדת התרופה
בעגלים יונקים ובעגלים מעלי גרה:

- טיפול בזיהומים במערכת הנשימה הנגרמים על ידי זנים רגישים של *Pasteurella multocida*,
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica וכן *Mycoplasma bovis*.

בחזירים:

- טיפול בזיהומים במערכת הנשימה הנגרמים ע"י זנים רגישים של *Actinobacillus*,
Mycoplasma hyopneumoniae, *pleuropneumoniae* וכן *Pasteurella multocida*.

יש להשתמש רק לאחר בדיקת רגישות הזנים לתכשיר.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים לשימוש סיסטמי.

4. התוויות נגד

אין להשתמש במקרה של חיידקים העמידים לפלואורוקווינולונים אחרים (עמידות צולבת).
אין להשתמש בבעל חיים עם רגישות יתר ידועה למרבופלוקסצין או לקווינולון אחר.

5. תופעות לוואי

עגלים וחזירים:

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)	בצקת במקום ההזרקה ¹ ; כאב במקום ההזרקה ² ; נגע במקום ההזרקה ^{3,2}
--	--

¹ תגובה חולפת, במקרה של מתן תת-עורי או תוך שרירי.

² במקרה של מתן תוך שרירי.

³ נגעים דלקתיים יכולים להימשך עד 6 ימים בחזירים ו-12 ימים בעגלים.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה: בקר וחזירים לפיטום.

7. מינון ואופן המתן

בעגלים יונקים ובעגלים מעלי גרה:

2 מ"ג מרבופלוקסצין לכל ק"ג משקל חיה, כלומר: 1 מ"ל של תמיסה לכל 10 ק"ג של משקל חיה, בהזרקה יומית, תת עורית או תוך שרירית למשך 3 עד 5 ימים. הזריקה הראשונה יכולה להינתן תוך ורידית.

בחזירים:

2 מ"ג מרבופלוקסצין לכל ק"ג משקל חיה, כלומר 1 מ"ל של תמיסה לכל 10 ק"ג של משקל חיה בהזרקה יומית תוך שרירית, למשך 3 עד 5 ימים.

8. אופן השימוש בתכשיר

תמיסה להזרקה. ראה הוראות בסעיף 7.

9. זמן המתנה

בשר וחלקי פנים: עגלים יונקים ועגלים מעלי גרה: 6 ימים.
חזירים: 4 ימים.

חלב: אין לתת את התכשיר לבעלי חיים המייצרים חלב לצריכת בני אדם.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
יש לשמור את השימוש בפלואורוקווינולונים לטיפול במצבים קליניים שלא הגיבו טוב, או כאשר צפוי כי הם לא יגיבו היטב לסוגים אחרים של אנטיביוטיקה. ככל האפשר, לפני השימוש בפלואורוקווינולונים יש לבצע בדיקות לרגישות החיידקים ויש לקחת בחשבון את המדיניות הרשמית והמקומית לגבי שימוש באנטיביוטיקות.
שימוש בתכשיר שלא בהתאם להתוויה המאושרת עלול להביא לעליית השכיחות של חיידקים עמידים לפלואורוקווינולונים והוא עלול להוריד את היעילות של הטיפול בקווינולונים אחרים, בגלל הסיכון לעמידות צולבת.
- היריון והנקה של בעל החיים המטופל
במחקרים בחיות מעבדה (חולדות, ארנבים) לא נצפו עדויות להשפעות טרטוגניות, רעילות לעובר או לאם כתוצאה ממרבופלוקסצין.
השימוש רק לפי הערכת תועלת/סיכון של הווטרינר.
במקרה של שימוש בפרות שנותנות חלב יש לעיין ב פרק "זמן המתנה".
- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות
לא ידוע.
- מינון יתר
לא נצפו סימני מינון יתר לאחר מתן של מנה הגדולה פי 3 מהמנה המומלצת של מרבופלוקסצין.
מינון יתר של מרבופלוקסצין עלול לגרום לסימנים כגון הפרעות נירולוגיות אקוטיות אשר צריכות להיות מטופלות סימפטומטית.
- חוסר תאימות (incompatibility)
אין לערבב תכשיר זה עם תכשירים רפואיים אחרים.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.
לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 28 ימים.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Mannitol, gluconolactone, m-cresol, thioglycerol, disodium edetate, water for injection

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה מימית בצבע צהוב-ירוק עד צהוב-חום, בבקבוקון זכוכית בנפח 100 מ"ל בצבע ענבר, עם פקק גומי.

בעל הרישום: אליעזר לינביץ' בע"מ, רח' אדום 6, ת.ד. 7006, אזור התעשייה כנות.

שם היצרן: Vetoquinol, BP 189, 70204 Lure Cedex, France

נערך בנובמבר 2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות: 083-94-92387-00