

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג
טבליות מצופות 7.5 מ"ג

הרכב:

כל טבלייה מכילה: זופיקלון 7.5 מ"ג Zopiclone 7.5 mg
למידע על חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג מיועדת לטיפול קצר טווח בבעיות שינה במבוגרים.
אין להשתמש לטווח ארוך. הטיפול צריך להיות קצר ככל האפשר, כיוון שהסיכון לתלות עולה עם משך הטיפול. יש להתייעץ עם הרופא.

קבוצה תרפויטית: היפנוטי ומרדים מקבוצת הציקלופירולונים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לזופיקלון או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). סימנים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
- הנך סובל מבעיה שגורמת לחולשת שרירים חמורה (מיאסטניה גרביס).
- הנך סובל מבעיה בתפקוד הריאות (אי ספיקה נשימתית).
- הנך סובל מבעיה בעקבותיה הנך מפסיק לנשום לפרקי זמן קצרים בלילה (דום נשימה בשינה).
- הנך סובל מבעיות חמורות בכבד.
- הנך מתחת לגיל 18. הבטיחות והיעילות של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 טרם נקבעו.
- חווית בעבר הליכה תוך כדי שינה או כל התנהגות חריגה אחרת (כגון נהיגה, אכילה, ביצוע שיחת טלפון או קיום יחסי מין וכו') בזמן שאינך ער לחלוטין לאחר נטילת זופיקלון.

אל תיטול תרופה זו אם אחד מהמצבים מעלה מתייחס אליך. אם אינך בטוח, דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג, ספר לרופא שלך אם:

- הנך סובל מבעיות כלשהן בכבד (ראה גם בסעיף "אין להשתמש בתרופה אם"). ייתכן והרופא יצטרך לתת לך מינון מופחת של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג.
- הנך סובל מבעיות כלשהן בכליות. ייתכן והרופא יצטרך לתת לך מינון מופחת של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג.
- הנך סובל מבעיות נשימה קלות. הרופא יחליט אם עליך לקבל זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג (ראה גם בסעיף "אין להשתמש בתרופה אם").
- הייתה לך בעבר הפרעה נפשית (כולל דיכאון והפרעת אישיות) או שהשתמשת לרעה או היית תלוי באלכוהול או בסמים.
- השתמשת לאחרונה בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג או בתרופות דומות אחרות למשך יותר מ- 4 שבועות.

סיכון לשימוש לרעה ולתלות:

השימוש בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עלול להוביל להתפתחות של שימוש לרעה ו/או תלות גופנית ופסיכולוגית. הסיכון לתלות עולה עם המנה ועם משך הטיפול והוא גדול יותר כאשר השימוש בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג ארוך יותר מ- 4 שבועות, ובמטופלים עם היסטוריה של הפרעות נפשיות ו/או שימוש לרעה באלכוהול, בחומרים בלתי חוקיים או בסמים. התרופה אינה מיועדת לטיפול בדיכאון.

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג ובריאות הנפש:

אנשים מסוימים שמקבלים טיפול בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עשויים לחוות בעיות בבריאות הנפש כגון מחשבות על דברים שאינם אמיתיים (דלזיות), ראייה או שמיעה של דברים שאינם אמיתיים (הזיות), תחושת בלבול או חוסר התמצאות (דליריום), כעס, עצבנות, חוסר מנוחה או דיכאון. בנוסף, מספר מחקרים הראו סיכון מוגבר למחשבות אובדניות, ניסיון להתאבדות והתאבדות במטופלים הנוטלים תרופות מסוימות להרגעה ותרופות לבעיות שינה, כולל תרופה זו. אולם, לא נקבע אם זה נגרם מהתרופה או אם עשויות להיות סיבות אחרות. אם יש לך מחשבות אובדניות, פנה לרופא שלך בהקדם האפשרי לייעוץ רפואי נוסף.

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג והתנהגות חריגה:

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עשוי לגרום להליכה תוך כדי שינה או להתנהגות חריגה אחרת (כגון נהיגה, אכילה, ביצוע שיחת טלפון או קיום יחסי מין וכו') בזמן שאינך ער לחלוטין. בבוקר למחרת, ייתכן שלא תזכור שעשית משהו במהלך הלילה. פעילויות אלה עשויות להתרחש בין אם אתה שותה אלכוהול או נוטל תרופות אחרות שגורמות לך לנמנום יחד עם זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג, ובין אם לא. אם אתה חווה אחת מהתופעות הנ"ל, הפסק את הטיפול בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג מיד וצור קשר עם הרופא או איש הצוות הרפואי שלך. לפני נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג, חשוב לוודא שתוכל לישון לפחות 7 עד 8 שעות של שינה רצופה, על מנת לעזור להפחית את הסיכון לתופעות לוואי מסוימות (ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי"). במידה ואינך בטוח אם אחד המצבים מעלה מתייחס אליך, דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב:

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עלולה לשנות את רמות אנזימי הכבד המופיעות בבדיקות דם. זה עלול להעיד על תפקוד לקוי של הכבד שלך. אם הנך עומד לבצע בדיקת דם, חשוב לספר לרופא שלך שהנך נוטל זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה, או אם אתה עשוי לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת מכיוון שזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עלולה להשפיע על פעילותן של תרופות מסוימות אחרות. כמו כן, תרופות מסוימות עלולות להשפיע על פעילותן של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג. במיוחד אם אתה לוקח:

- זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עלולה להגביר את ההשפעה של התרופות הבאות:
- תרופות לטיפול במחלות נפשיות (אנטיפסיכוטיים)
- תרופות לטיפול בדיכאון
- תרופות לטיפול באפילפסיה (נוגדי פרכוסים)
- תרופות המשמשות בנייתוחים (תרופות הרדמה)
- תרופות להרגעה או להפחתת חרדה או תרופות לבעיות שינה (היפנוטיים)
- תרופות לטיפול בקדחת השחת, בפריחות, או באלרגיות אחרות, שעלולות לגרום לך לישנוניות (אנטיהיסטמינים מרדמיים) כגון כלורפנמין או פרומתזין
- תרופות מסוימות לשיכוך כאב בינוני עד חזק (משככי כאבים נרקוטיים) כגון קודאין, מתדון, מורפין, אוקסיקודון, פתידין או טרמדול

התרופות הבאות עלולות להגביר את הסיכוי לתופעות לוואי אם נלקחות יחד עם זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג. על מנת להפחית את הסיכוי, ייתכן והרופא שלך יחליט להוריד את מינון הזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג שהנך נוטל:

- אנטיביוטיקות מסוימות כגון קלריתרומיצין או אריתרומיצין
- תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים פטריתיים כגון קטוקונאזול ואיטרקונאזול
- ריטונאביר (ממשפחת מעכבי פרטאז) - לטיפול בזיהום ב-HIV
- שימוש במקביל בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג ובאופיואידים מעלה את הסיכון לנמנום, קשיי נשימה, תרדמת ומוות. השימוש בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג ובאופיואידים במקביל יעשה רק כשאפשרויות טיפול אחרות אינן מספקות. אנא ספר לרופאך על כל התרופות האופיואידיות שהנך נוטל והקפד להיצמד להמלצות הרופא בנוגע למינון.

התרופות הבאות עלולות להפחית את ההשפעה של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג:

- תרופות מסוימות לטיפול באפילפסיה כגון קרבמזפין, פנוברביטל או פניטואין
- ריפמיצין (אנטיביוטיקה) - לטיפול בזיהומים
- St. John's wort (תרופה על בסיס צמחי) - לטיפול בשינויי מצב רוח ובדיכאון

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתות אלכוהול בעת השימוש בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג. אלכוהול עלול להגביר את השפעת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג ולגרום לך לישון עמוקה מאוד, כך שתנשום באופן שאינו תקין או שיהיה לך קושי להתעורר.

היריון והנקה: היריון

השימוש בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג במהלך ההיריון אינו מומלץ. אם הנך בהיריון, חושבת שיייתכן והנך בהיריון או מתכננת להרות היוועצי ברופא שלך לפני נטילת התרופה. אם נעשה שימוש במהלך ההיריון, קיים סיכון כי התינוק יושפע. כמה מחקרים הראו כי ייתכן סיכון מוגבר לשפה וחיך שסועים (נקרא לפעמים "שפת ארנבת") ביילוד. תנועת עובר מופחתת ושינויים בקצב הלב של העובר עלולים להתרחש לאחר נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג במהלך הטרימסטר השני ו/או השלישי של ההיריון. אם זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג ניטלת בסוף ההיריון או במהלך הלידה, תינוקך עלול להראות חולשת שרירים, ירידה בטמפרטורת הגוף, קושי בהאכלה ובעיות נשימה (דיכוי נשימתי). אם תרופה זו נלקחת באופן קבוע בשלבי ההיריון מאוחרים, תינוקך עלול לפתח תלות גופנית ועלול להיות בסיכון לפתח תסמיני גמילה כגון עצבנות או רעידות. במקרה כזה יש לנטר את היילוד באדיקות במהלך התקופה שלאחר הלידה.

הנקה

אין ליטול זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג אם הנך מניקה או מתכננת להניק. זאת משום שכמויות קטנות עלולות לעבור לחלב אם. אם הנך מניקה או מתכננת להניק, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני שימוש בתרופה כלשהי. יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני שימוש בכל תרופה, אם הנך בהיריון או מניקה.

נהיגה ושימוש במכונית:

בדומה לתרופות אחרות המשמשות לבעיות שינה, זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עלולה לגרום להאטה בתפקוד התקין של המוח (דיכוי מערכת העצבים המרכזית). הסיכון לפגיעה פסיכומוטורית, כולל פגיעה ביכולת לנהוג, עולה אם:

- הנך מבצע פעולות שדורשות ערנות בתוך 12 שעות מנטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג
- הנך נוטל מינון גבוה יותר מהמינון המומלץ של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג
- הנך נוטל זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג בעת שהנך נוטל כבר תרופה אחרת שמדכאת את מערכת העצבים המרכזית או תרופה אחרת שמעלה את רמות זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג בדמך, או בעת שתיית אלכוהול

אין לעסוק בפעילויות מסוכנות הדורשות ערנות מלאה, כגון נהיגה או הפעלת מכונית אחרי נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג, ובייחוד, במהלך 12 שעות לאחר נטילת התרופה. לקבלת מידע נוסף לגבי תופעות לוואי אפשריות שעלולות להשפיע על הנהיגה שלך, ראה סעיף 4 בעלון זה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג מכילה:
• **נתרן:** תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

הטיפול צריך להיות קצר ככל האפשר ולא יעלה על 4 שבועות כולל שלב הפסקת הטיפול.
יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

מבוגרים:

המינון המקובל הוא טבלייה אחת של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג (7.5 מ"ג) מיד לפני השינה.

קשישים:

המינון ההתחלתי המקובל הוא חצי טבלייה (3.75 מ"ג) מיד לפני השינה. יתכן שהרופא יחליט להעלות את המינון שלך, אם הדבר נדרש.

ילדים ומתבגרים:

זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. היעילות והבטיחות של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים טרם נקבעו.

מטופלים עם בעיות בכבד, בנשימה או בכליות:

המינון ההתחלתי המקובל הוא חצי טבלייה (3.75 מ"ג) מיד לפני השינה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול:

משך הטיפול המקובל הוא יומיים עד 3 שבועות.

צורת הנטילה:

- יש לבלוע את התרופה עם מים.
- אין מידע לגבי כתישה/לעיסה של הטבליות.
- ניתן לחצות את הטבלייה במידה ונדרש מינון מופחת של 3.75 מ"ג.
- יש לקחת את המנה הנדרשת של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג בפעם אחת ואין ליטול מנה נוספת באותו לילה.
- יש לקחת את התכשיר כאשר הנך במיטה, מיד לפני השינה, ולוודא שתוכל לישון 7-8 שעות ללא הפרעה.

אם נטלת מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

נטילת מינון יתר של זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג מאוד מסוכנת. הנך עלול לסבול מהתופעות הבאות:

- תחושת נמנום, בלבול, שינה עמוקה ואף אפשרות של תרדמת
- רפיון שרירים (היפוטוניה)
- תחושת סחרחורת, ערפול או עילפון. תופעות אלו הן עקב לחץ דם נמוך
- נפילות או איבוד שיווי משקל (אטקסיה)
- נשימה שטחית או קשיים בנשימה (דיכוי נשימתי)

אם שכחת ליטול את התרופה:

יש ליטול זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג רק מיד לפני השינה.
אם שכחת ליטול את התרופה מיד לפני השינה, אין ליטול את התרופה בשום זמן אחר. אחרת, הנך עלול להרגיש מנומנם, מסוחרר ומבולבל במהלך היום.
בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד במקום המנה שנשכחה!

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:

יש להמשיך ליטול זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עד שרופאך אומר לך להפסיק. אל תפסיק ליטול זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג באופן פתאומי, אלא ספר לרופאך אם ברצונך להפסיק. הרופא יצטרך להפחית את המינון שלך ולהפסיק את הטיפול בהדרגה לאורך תקופת זמן.

אם הנך מפסיק טיפול בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג באופן פתאומי, בעיות השינה שלך עלולות לחזור, והנך עלול לסבול מ"תופעת גמילה".

אם קורה מצב זה, הנך עלול לסבול מחלק מהתופעות המפורטות להלן.
יש לפנות לרופא מיד אם הנך סובל מתופעה כלשהי מהתופעות הבאות:

- חש חרד, חסר יציבות, עצבני, נסער, מבולבל או שיש לך התקפי חרדה
 - הזעה
 - כאב ראש
 - דפיקות לב מהירות יותר או לא סדירות (פלפיטציות)
 - רמת ערנות נמוכה ובעיות ביכולת להתמקד או להתרכז
 - סינטי לילה, ראייה או שמיעה של דברים שאינם אמיתיים (הזיות)
 - רגישות גדולה מהרגיל לאור, רעש ומגע
 - תפיסת מציאות לקויה
 - חוסר תחושה ותחושת עקצוץ בידיים ובכפות הרגליים
 - כאבי שרירים
 - בעיות בבטן
- במקרים נדירים עלולות להופיע גם התכווצויות (פרכוסים).

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לבית חולים אם:

- הנך סובל **מתגובה אלרגית** לזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג. הסימנים יכולים לכלול: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם הנך סובל מתופעה כלשהי מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי נדירות (rare), תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000:

- פגיעה בזיכרון מאז נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג (שכחה). תוכל להפחית סיכוי לתופעה זו, אם תוודא שתוכל לישון 7-8 שעות של שינה רצופה ללא הפרעה לאחר נטילת זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג.
- ראייה או שמיעה של דברים שאינם אמיתיים (הזיות)
- נפילות, בעיקר בקשישים

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- מחשבות על דברים שאינם אמיתיים (דלזיות)
- הרגשת דכדוך או עצב (מצב רוח ירוד)

יש לפנות לרופא או לרוקח אם תופעה כלשהי מתופעות הלוואי הבאות מחמירה או מתמשכת יותר ממספר ימים:

- תופעות לוואי שכיחות (common), תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100:
- טעם מעט מריר או מתכתי בפה או יובש בפה
 - הרגשת נמנום או ישנוניות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon), תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000:

- בחילה או הקאה
- הרגשת סחרור או ישנוניות
- כאב ראש
- סיוטים
- הרגשת עייפות פיזית או נפשית
- עצבנות

תופעות לוואי נדירות (rare), תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000:

- תחושת בלבול
- פריחה מגרדת, גבשושית (אורטיקריה)
- הרגשת עצבנות או תוקפנות
- ירידה בחשק המיני
- קושי לנשום או קוצר נשימה

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- הרגשת חוסר מנוחה או כעס
- הרגשת סחרחורת או בעיות בקואורדינציה
- ראייה כפולה
- תנועה לא יציבה או מתנדנדת
- חולשת שרירים
- הפרעה בעיכול
- היווצרות תלות בזופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג
- נשימה איטית יותר (דיכוי נשימתי)
- תחושות לא רגילות בעור כגון חוסר תחושה, עקצוץ, דקירות, צריבה או נמלול (פרסתזיה)
- בעיות מנטליות כגון פגיעה בזיכרון
- קושי להתרכז
- הפרעה בדיבור

- זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג עשוי לגרום להליכה תוך כדי שינה או להתנהגות חריגה אחרת (כגון נהיגה, אכילה, ביצוע שיחת טלפון או קיום יחסי מין וכו') בזמן שאינך ער לחלוטין.
- דליריום (שינוי פתאומי וחמור במצב המנטלי שעשוי לגרום לשילוב של בלבול, חוסר התמצאות ו/או הפרעת קשב)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C.

אל תזרוק תרופה כלשהי באמצעות שפכים או פסולת ביתית.
שאל את הרוקח שלך איך לזרוק את התרופות שאתה כבר לא משתמש בהן. צעדים אלו יסייעו להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Calcium hydrogen phosphate (E341 (ii)), maize starch, cellulose, microcrystalline (E460), sodium starch glycolate (type A), hypromellose (type 2910) (E464), macrogol poly (vinyl alcohol) grafted copolymer (E1209); talc (E553b); titanium dioxide (E171); magnesium stearate (E572), glycerol monocaprylocaprate (type 1) (E471); poly (vinyl alcohol) (E1203).

ניצוד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות זופיקלון גרינדקס 7.5 מ"ג הן טבליות עגולות, לבנות, מצופות פילם, קמורות בצידן האחד ובעלות גומה עם קו חצייה בצדן השני, עם פני שטח חלקים.
גודל אריזה: 20,30 טבליות באריזה בליסטר. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה אנא פנה לרופא.

שם בעל הרישום והיבואן וכתובתו: איי.אל.מדי-מרקט בע"מ, רח' הקטיף 3, פארק תעשיות עמק חפר, 3877701, ישראל.

שם היצרן וכתובתו: JSC Grindeks, 53 Krustpils street, Riga, LV-1057, Latvia

נערך בספטמבר 2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 179-76-37738-99.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלוני מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית סירקו את הקוד הבא

For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the code:



<https://israel drugs.health.gov.il/#!/medDetails/179%2076%2037738%2099>

ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני humane-info@medi-market.co.il או בטלפון מספר 09-8844451.

For a printed copy of the patient information leaflet in English, please contact the registration holder by email humane-info@medi-market.co.il or by phone 09-8844451.