

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يسُوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

جابايينتين تيفغ 300 ملغ كبسولات	
التركيبية	تحتوي كلَّ كبسولة على: جابايينتين 300 ملغ Gabapentin
التركيبية	تحتوي كلَّ كبسولة على: جابايينتين 400 ملغ Gabapentin 400 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأريجة انظر البند 2 تحت "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة **يابعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدليّ.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. قد يضرّهم الدواء حتى لو بدا لك أنّ حالتهم الطيِّبة مشابهة.

هذا الدواء مخصّص لعلاج الصرع لدى البالغين والمرافقين الذين سنهم فوق 12 عامًا. هذا الدواء مخصّص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى البالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

الصرع:

لعلاج إضافي للنوبات الجزئية المصحوبة أو غير المصحوبة بتعميم ثانوي لدى البالغين والمرافقين (من سن الـ 12 فما فوق) المصابين بالصرع.

سيصف لك الطبيب جابايينتين تيفغ للمساهمة في علاج الصرع لديك عندما لا ينتج العلاج الحاليّ الذي تتلقاه السيطرة التامة على وضعك.

ألم الاعتلال العصبي:

لعلاج الألم الاعتلال العصبي في الاعتلال العصبي السكري أو الاعتلال العصبي التالي للهربس (neuralgia) لدى البالغين.

سيصف لك الطبيب جابايينتين تيفغ لعلاج ألم الاعتلال العصبي (ألم مزمن ينجم عن ضرر عصبي) بعد الإصابة بالهربس النطاقي أو نتيجةً للسكري لدى البالغين. يمكن أن توصف أحاسيس الألم على شكل إحساس بالحرق، إحساس بالذبح، ألم خفاقي، ألم فجائي، إحساس بالطنن، ألم حاذ، تنفّسات، إحساس بالوخز، انعدام الإحساس (خدر)، الإحساس "بالدبابيس والإبر" وما شابه ذلك.
الفصلية العلاجية: ينتمي لفصلية أدوية تُستعمل لعلاج الصرع والم الاعتلال العصبي المحيطي (ألم مطول ينجم عن ضرر للأعصاب).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسيةٌ (أرجية) للمادة الفعّالة (جابايينتين) أو لأيّ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء. انظر البند 6.

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء

قبل العلاج جابايينتين تيفغ، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. يُحتمل أن يغير الطبيب البرنامج العلاجي.
- كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي لطرد الفضلات في أعقاب قصور الكليتين. أخبر الطبيب إذا نشأ لديك ألم *و/أو* ضعف في العضلات.
- نشأت لديك علامات مثل الام متواصل في البطن، غثيان وتقيؤات. توجه فورًا إلى الطبيب، لأن هذه قد تكون أعراضًا للتهاب البنكرياس الحاد.
- وُجدت لديك اضطرابات في الجهاز العصبيّ، اضطرابات في التنفّس، أو إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا. قد يصف لك الطبيب نظام تجرع مختلفًا.
- عافت ذات مرة الكحول أو أدوية ملزمة بوصفة طبيب أو المخدرات غير القانونية، أو كان لديك اعتماد عليها. قد يكون لديك تزايد في خطر نشوء اعتماد على جابايينتين تيفغ.

اعتماد على الدواء

قد ينشأ لدى بعض الأشخاص اعتماد على جابايينتين تيفغ (إحساس بالحاجة إلى مواصلة استعمال الدواء). يُحتمل أن تظهر أعراض انسحابية عند إيقاف استعمال الدواء (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء" تحت "إذا توقفت عن استعمال الدواء").

إذا وُجد لديك تخوُّف بخصوص إمكانية نشوء اعتماد على جابايينتين تيفغ، فمن المهم أن تستشير الطبيب.

إذا انتهيت لإحدى العلامات التالية أثناء العلاج، فيُحتمل أن اعتمادًا على الدواء قد نشأ لديك:

- تشعر بالحاجة إلى استعمال الدواء لمدة أطول مما أوصى به الطبيب.
- تشعر بالحاجة إلى استعمال جرعة أعلى مما أوصى به.
- تستعمل الدواء لأعراض تختلف عن تلك التي وُصفت لك.
- حاولت التوقف عن استعمال الدواء أو السيطرة على الجرعة ولم تنجح في ذلك.
- تشعر بالمرض عندما تتوقف عن استعمال الدواء، وتشعر بتحمُّس عندما تبدأ باستعماله من جديد.

إذا لاحظت وجود إحدى هذه العلامات – فتوجه إلى الطبيب لمناقشة طرق العلاج المناسبة، بما في ذلك متى وكيف يمكن إيقاف العلاج بشكل آمن.

نشأت أفكار انتحارية أو أفكار عن الإضرار بالنفس لدى عدد صغير من المرضى الذين عولجوا بأدوية مصادة للصرع مثل جابايينتين تيفغ. توجه فورًا إلى الطبيب إذا وُجدت لديك أفكار كهذه.

معلومات هامة عن ردود فعل خطيرة محتملة

هناك بلاغات عن طفوح جلدية خطيرة تتعلّق جابايينتين، تشمل متلازمة ستيفينس-جونسون، تشكّر الأنسجة الممتّمة البشروية بالتنسيمي (toxic epidermal necrolysis) ورد الفعل الدوائي المصحوب بكثرة اليوزينيات والأعراض الجهازية (DRESS). توقف عن استعمال جابايينتين وتوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي إذا لاحظت وجود أحد الأعراض المرتبطة بردود الفعل الجلدية الخطيرة الموصوفة في البند 4.

اقرأ وصف الأعراض الخطيرة في البند 4 تحت "**يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية**" بعد تناول الدواء لأنها قد تكون خطيرة.

توجه فوراً إلى الطبيب في حالات الضعف، الحساسية أو الألم في العضلات وخاصةً إذا شعرت بالتزامن مع ذلك بأنك مريض أو كانت لديك حمى مرتفعة. قد تكون هذه علامات على انحلال غير سوي للعسل قد يشكّل خطرًا على الحياة ويسبب مشاكل في الكليتين. بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن يطرأ تغير على لون البول وتكون هناك تغيرات في نتائج فحص الدم (ارتفاع ملحوظ في مستويات كرياتين فوسفوكيناز في الدم).

الأدوية الأخرى وجابايينتين تيفغ

إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

خاصةً إذا كنت تستعمل الآن أو استعملت مؤخرًا:

- أدوية للاختلاجات، اضطرابات النوم، الاكتئاب، الفلق أو أي مشاكل أخرى متعلقة بالأعصاب أو بالطب النفسي.
- أدوية من فصيلة الأفيونيات مثل المورفين – قد تزيد هذه من تأثير جابايينتين تيفغ. بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب دمج جابايينتين تيفغ مع الأفيونيات ميلاً إلى النوم، تعبًا (تهيئة)، انخفاضًا في وتيرة التنفس أو موتًا.
- مضادات الحمض التي تحتوي على الألومنيوم والمغنيزيوم – تتأولها بالتزامن مع جابايينتين تيفغ قد يسبب انخفاضًا في امتصاص جابايينتين تيفغ من المعدة. لذلك يوصى بتناول جابايينتين تيفغ بعد ساعتين على الأقل من تناول مضادات الحمض.
- من غير المتوقع أن يؤثر جابايينتين تيفغ على فعّالية الأدوية الأخرى المضادة للصرع أو حبوب منع الحمل.
- قد يؤثر جابايينتين تيفغ على نتائج فحوص مخبرية معيَّنة. إذا تعيّن عليك إعطاء عيِّنة بول، فأخبر الطبيب أو الطاقم الطبي عن الأدوية التي تستعملها.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- إذا كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل، فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب ومناقشته بشأن المخاطر المحتملة التي قد يشكّلها الدواء على الجنين.
- لا يجوز إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب.
- إذا كنت تخططين للحمل، فعليك استشارة طبيبك بأسرع وقت ممكن قبل أن تحملي.
- إذا كنتِ مرضعًا أو تخططين للإرضاع، فاستشيري طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

الحمل

يمكن استعمال جابايينتين تيفغ خلال الثلث الأول من الحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا كنت تخططين للحمل أو كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل، فاستشيري طبيبك فورًا. إذا حملت وكنت مصابة بالصرع، فمن المهم ألا تتوقفي عن استعمال الدواء دون استشارة طبيبك أولاً، لأن هذا الشيء قد يفاقم مرضك ويؤدي إلى توران مجدّد للاختلاجات. تلقّم الصرع قد يشكّل خطراً وعلی جنينك.

في دراسة استقصت معطيات عن نساء في الدول النوردية (شمال أوروبا) ممن تناولن جابايينتين في أول 3 أشهر من الحمل، لم يكن هناك تزايد في خطر نشوء عيوب خلقية أو مشاكل في تطوّر الأداة الوظيفي الدماغي (اضطرابات في التطور العصبي). مع ذلك، كان هناك تزايد في خطر الوزن المنخفض عند الولادة والولادة المبكرة لدى الأطفال الرضع الذين أنجبتهن نساء استعمالن جابايينتين في فترة الحمل.

عند استعماله في فترة الحمل، قد يؤدي جابايينتين تيفغ إلى نشوء أعراض الانسحاب (الغطام) لدى الأطفال الرضع الذين ولدوا للتو. قد يزداد هذا الخطر عند استعمال جابايينتين سوياً مع مسكّنات الألم الأفيونية (أدوية لعلاج الألم الشديد).

الإرضاع

جابايينتين، المادة الفعّالة في جابايينتين تيفغ، تنتقل إلى حليب الأم. بما أن تأثيرها على الطفل الرضيع غير معلوم، يوصى بعدم الإرضاع في فترة استعمال الدواء.

في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات لم يكن هناك تأثير على الخصوبة.

السياقة وإستعمال الماكنت

استعمال هذا الدواء قد يسبب الدوار، والتعب.

يجب عليك الامتناع عن السياقة، تشغيل الماكنت أو القيام بنشاطات أخرى من شأنها أن تكون خطرة، حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك وعلى قدرتك على تنفيذ هذه الأعمال.

بالنسبة للأولاد، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء جابايينتين تيفغ بجرعة 300 ملغ على صيغ أصفر رقم 6 (FD&C Yellow 6 / Sunset Yellow FCF)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّداً من الجرعة الدوائية ومن كميّته العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكميّيته العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائيّة المُتّبعة هي:

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة، كما حدّد من قبل الطبيب المعالج.

سيتمّ عادة إعطاء علاج الجرعة الدوائيّة التي سيحددها لك الطبيب، بشكل تدريجيّ. تتراوح الجرعة الدوائيّة الابتدائيّة بين 300 ملغ إلى 900 ملغ في اليوم. بعد ذلك قد يأمرك الطبيب برفع الجرعة الدوائيّة، حتى جرعة دوائيّة يوميّة قصوى من 3600 ملغ، مقسّمة إلى 3 جرعات منفردة، يعني مرّة واحدة في الصباح، مرّة واحدة في الظهر ومرّة واحدة في المساء.

هذا الدواء مخصّص لعلاج الصرع لدى البالغين، المراهقين والأولاد الذين يزيد عمرهم عن 12 عامًا.

هذا الدواء مخصّص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى البالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين أو كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي

قد يصف لك الطبيب جرعة دوائية و/أو نظام تجرع مختلفين.

إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا

عليك تناول جرعة جابايينتين تيفغ الدوائية المتبّعة إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. قد يصف لك الطبيب جرعة دوائية و/أو نظام تجرع مختلفين إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. إذا كان لديك انطباع بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول

يجب دائماً بلع الكبسولة بأكملها مع الكثير من الماء.

لا يجوز فتح الكبسولة ونثر محتواها! لأن تأثير شكل الإصّاع هذا لم يُفحص.

يوصى بتناول جابايينتين تيفغ بعد ساعتين على الأقلّ من تناول مضادات الحمض.

يجب الاستمرار في استعمال جابايينتين تيفغ إلى أن يرشّحك الطبيب إلى التوقف عن ذلك.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

قد يسبب تناول جرعة دوائية مفرطة ازدياد الأعراض الجانبية بما في ذلك فقدان الوعي، الدوار، الرؤية المزدوجة، الكلام (النطق) غير الواضح، التعباس والإسهال.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب فيجب جرعة فور تنذكرك إلا إذا حان موعد الجرعة التالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة بأيّ حال من الأحوال للتعويض عن الجرعة المنسيّة. يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا توقفت عن استعمال الدواء

إذا تتوقف عن استعمال الدواء إلا بموجب أمر من الطبيب. إذا كان عليك إيقاف العلاج فيجب فعل ذلك بشكل تدريجي طوال أسبوع على الأقلّ. إذا توقفت عن استعمال الدواء بشكل فجائيّ أو قبل تلقّي إرشاد إلى فعل ذلك من الطبيب فيسيزداد خطر حدوث الاختلاجات. بعد إيقاف علاج قصير الأمد أو طويل الأمد جابايينتين تيفغ، قد تنشأ لديك أعراض جانبية معيَّنة، تسمى أعراض الانسحاب. يمكن أن تشمل هذه الأعراض على الاختلاجات، فلق، صعوبات في النوم، غثيان، ألم، تعرق، ارتجاف، صداع، اكتئاب، إحساس غريب، دوار وشعور عام بالمرض. تظهر هذه الأعراض عادةً خلال 48 ساعة بعد التوقف عن استعمال الدواء. إذا نشأت لديك أعراض الانسحاب، فعليك مراجعة طبيبك.

لا يجوز تناول الأدوية في العمّة! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كلّ مرّة تناول فيها دواء. ضع النظارات الطيِّبة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء، قد يؤديّ استعمال جابايينتين تيفغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقّ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- بقع على الجسم شبيهة بالهذف أو مستديرة، لونها ضارب إلى الحمرة، ليست مرفوعة، غالبًا مع حويصلات في المركز، تقشّر الجلد، فروح في الفم، في الحلق، في الأنف، في الأعضاء الجنسية وفي العينين.** يمكن أن يسبق هذه الطفوح الجلدية الخطيرة ظهور **حتى وأعراض شبيهة بالانفلونزا (متلازمة ستيفينس-جونسون، تقشّر الأنسجة الممتوتة البشرية التسممي).**
- طفح جلدي موسع، حرارة جسم مرتفعة وعند بلغمافية متضخمة (متلازمة DRESS – متلازمة فرط الحساسية للأدوية).**

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك أحد الأعراض التالية بعد تناول الدواء، لأنّها قد تكون خطيرة:

- ألم متواصل في البطن، غثيان وتقيؤ – لأنّ هذه قد تكون أعراضًا للتهاب البنكرياس الحاد.
- مشاكل في التنفّس، في الحالات الخطيرة قد تحتاج إلى علاج طارئ لكي تستمرّ بالتنفّس بشكل عادي.

- قد يسبّب جابايينتين تيفغ ردّ فعل تحسّسيًا خطيرًا أو مهدّدًا للحياة وقد يؤثر على الجلد أو على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد أو خلايا الدم. قد يظهر الطفح، أو لا يظهر، كجزء من ردّ الفعل هذا. من المحتمل أن تضطر إلى الرقود في المستشفى أو التوقف عن استعمال جابايينتين تيفغ نتيجة لردّ الفعل هذا. راجع الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:
 - طفح واحمرار في الجلد و/أو تساقط الشعر
 - شرى
 - حصى
 - تورم لا يتلاشى في الغدد
 - انتفاخ الشفتين، الوجه واللسان
 - اصفرار الجلد أو بياض العينين
 - ظهور كدمات شاذة أو نزيف دمويّ شاذّ
 - تعب أو ضعف شديدان
 - ألم غير متوقّع في العضلات
 - تولّوات متواترة

قد تكون هذه الأعراض علامات أوّلية على ردّ فعل خطير. يجب أن يقوم طبيب بفحصك وبالتّخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تستطيع أن تستمرّ في استعمال الدواء.

- إذا كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي، فأخبر الطبيب إذا نشأ لديك ألم و/أو ضعف في العضلات.

اعراض جانبية إضافية:

اعراض جانبية شائعة جدًّا (اعراض تظهر عند أكثر من مستعمل 1 من بين 10):

- تؤلّث فيروسيّ
- شعور بالتعب، دوار، انعدام التناسق الحركيّ
- شعور بالتعب، حتى

اعراض جانبية شائعة (اعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100):

- التهاب الرتئين، تلوّثات في المسالك التنفسية، تلوّثات في المسالك البولية، التهاب الأذنّين أو تلوّثات أخرى
- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء
- قيم (نوريسكيا)، زيادة في الشهية
- غضب تجاه الآخرين، ارتباك، تغيرات في المزاج، اكتئاب، فلق، عصبيّة، صعوبة في التفكير
- اختلاجات، حركات لا-إرادية، صعوبات في الكلام (النطق)، فقدان الذاكرة، ارتجاف، صعوبات في النوم، صداع، جلد حشاش، انعدام الإحساس (خدر)، صعوبات في التناسق الحركيّ، حركات غير عادية للعينين، تزايد أو ضعف أو غياب المنعكسات
- رؤية مشوّشة، رؤية مزدوجة
- دوار (فيرتيجو)
- ضعف دم مرتفع، تورّد الوجه أو تورّع الأوعية الدموية
- صعوبات في التنفّس، التهاب القصبات، ألم في الحلق، سعال، جفاف في الأنف
- تقيؤ، غثيان، مشاكل في الأسنان، التهاب اللثة، إسهال، ألم في البطن، عسر الهضم، إمساك، جفاف في الفم أو الحلق، غازات
- انتفاخ الوجه، كدمات، طفح جلديّ، حكة، حبّ الشباب
- ألم في المفاصل، ألم في العضلات، ألم في الظهر، تشنجات
- ضعف جنسي لدى الرجال
- انتفاخ في الرجلين والذراعين، صعوبات في المشي، ضعف، ألم، شعور بالمرض، أعراض شبيهة بالانفلونزا
- انخفاض في كمّيّة خلايا الدم البيضاء، ارتفاع الوزن
- إصابة عارضة، كسر، خدش
- في الدراسات السريرية، يُبلّغ عن سلوك عدواني وحركات قفّازة

اعراض جانبية غير شائعة (اعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1,000):

- عدم الهدوء (حالة من التملزل المزمن والحركات غير المقصودة والعدمية الهدف)
- ردّ فعل تحسّسيّ مثل الشرى
- انخفاض في الحركة
- نفض سريع
- صعوبة في البلع
- انتفاخ قد يشمل الوجه، الجسم والأطراف
- نتائج شاذة في فحوص الدم تشير إلى وجود مشاكل في الكبد
- مشاكل نفسيّة
- حالات وقرح
- ارتفاع في مستوى الجلوكوز في الدم (يشاهد غالبًا لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري)
- اعراض جانبية نادرة (اعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10,000):**
- انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم (يشاهد غالبًا لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري)
- فقدان الوعي
- صعوبة في التنفّس، أنفاس ضحلة (تثبيط تنفسي)

اعراض جانبية تمّ التبليغ عنها بعد تسويق الدواء ومدى شيوعها غير معروف:

- انخفاض في مستوى المصانع النموّية
- أفكار انتحارية، هلوسات
- حركات جسمانية شاذة مثل الالتواء، حركات لا إرادية وتصلّب
- طنين في الأذنّين
- اصفرار الجلد وبياض العينين (يرقان)، التهاب الكبد
- قصور كلوي حاد، سلس البول
- تضخّم نسيج الثدي، تضخّم الثديين
- أعراض جانبية نتيجةً لتوقف الفجائي عن استعمال جابايينتين تيفغ (فلق، صعوبات في النوم، غثيان، ألم، تعرق)، ألم في الصدر
- انحلال الألياف العضليّة (انحلال الربيدات)
- تغيّر في نتائج فحص الدم (ارتفاع في مستويات كرياتين فوسفوكيناز)
- مشاكل في الأداء الوظيفيّ الجنسيّ بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الإشباع، تأخير القذف
- مستوى منخفض للصدوديوم في الدم
- تأق (رد فعل تحسسي خطير ويشكّل خطرًا على الحياة، يشمل على صعوبات في التنفّس، انتفاخ الشفتين، الحلق واللسان، وضغط دم منخفض مما يستلزم علاجًا طارئًا)
- نشوء اعتماد على جابايينتين تيفغ (اعتماد دوائي)
- بعد إيقاف علاج قصير الأمد أو طويل الأمد جابايينتين تيفغ، قد تنشأ لديك أعراض جانبية معيَّنة، تسمى أعراض الانسحاب (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء" تحت "إذا توقفت عن استعمال الدواء").

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الترنيمية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستشارة المصلّة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: **https://sideeffects.health.gov.il**

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- يجب تخزين الدواء في مكان جاف فيما دون 25°C.
- امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعّالة أيضًا على:

جابايينتين تيفغ 300 ملغ:

Talc, pregelatinized starch, FD&C red 3, FD&C yellow 6, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

جابايينتين تيفغ 400 ملغ:

Talc, pregelatinized starch, red iron oxide, yellow iron oxide, black iron oxide, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

جابايينتين تيفغ 300 ملغ: كبسولة جيلاتين صلبة، برتقالية اللون، مليئة بمسحوق لونه أبيض-كريمي يحتوي على كتل صغيرة. مطبوع على جسم الكبسولة وعلى غطائها: 93 و-39.

جابايينتين تيفغ 400 ملغ: كبسولة جيلاتين صلبة، بنية اللون، مليئة بمسحوق لونه أبيض-كريمي يحتوي على كتل صغيرة. مطبوع على جسم الكبسولة وعلى غطائها: 93 و-40.

يُعبأ الدواء في شرائط (بليستر) في عبوة تحتوي على 100 كبسولة.

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيفغ إسرائيل رض، شارع دفور هانيفينه 124، تل أبيب 6944020

تم تحرير النشرة في آب/أغسطس 2025.

رقما تسجيل الدواعين في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

جابايينتين تيفغ 300 ملغ: 119-46-29956

جابايينتين تيفغ 400 ملغ: 119-47-29937

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، نعت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.