

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986** התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

<b>גאבאפנטין טבע 300 מ"ג כמוסות</b>	
<b>הרכב</b>	<b>הרכב</b>
כל כמוסה מכילה: <p>גאבאפנטין 300 מ"ג Gabapentin 300 mg</p>	כל כמוסה מכילה: <p>גאבאפנטין 400 מ"ג Gabapentin 400 mg</p>
<b>מיועד לטיפול באפילפסיה במבוגרים ובמתבגרים מעל גיל 12 שנים. תרופה זו מיועדת לטיפול בכאב ניוורופתי במבוגרים מגיל 18 שנים ומעלה.</b>	

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**תרופה זו מיועדת לטיפול באפילפסיה במבוגרים ובמתבגרים מעל גיל 12 שנים. תרופה זו מיועדת לטיפול בכאב ניוורופתי במבוגרים מגיל 18 שנים ומעלה.**

#### 1. למה מיועדת התרופה?

**אפילפסיה:**

לטיפול בנפס בהתקפים חלקיים עם או ללא הכללה משנית אצל מבוגרים ובמתבגרים (מגיל 12 ומעלה) עם אפילפסיה.
הרופא ירשום לך גאבאפנטין טבע בכדי לסייע בטיפול באפילפסיה שלך כאשר הטיפול הנוכחי שהינך מקבל אינו מאפשר שליטה מלאה במצבך.

**כאבים ניוורפטיים:**

לטיפול בכאבים ניוורפטיים בניורופתיה סוכרתית או ניוורפתיה פוסט-הרפטית (neuralgia) אצל מבוגרים.

הרופא ירשום לך גאבאפנטין טבע לטיפול בכאב ניוורפתי (כאב כרוני הנובע מנזק עצבי) לאחר שבלקת חוגרת או בעקבות טוכרת במבוגרים. תחושות הכאב יכולות להיות מתוארות כתחושת חום, תחושת שריפה, כאב פתאומי, תחושת דקירה, כאב חד, התכווצויות, תחושת עקצוץ, חוסר תחושה, תחושת "טיכות ומחטים" וכדומה.

**קבוצה תרופוטית:** שייך לקבוצת תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה ובכאב ניוורופתי היקפי (כאב ממושך הנגרם מנזק לעצבים).

#### 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גאבאנטין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שחדר מילה התרופה. ראה סעיף 6.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול בגאבאפנטין טבע, ספר לרופא אם:**

- אתה סובל מבעיות בכליות, ייתכן שהרופא ישהה את תוכנית הטיפול.
- אתה מטופל בהמודיאליזה לסילוק חומרי פסולת עקב א ספיקת כליות. ספר לרופא אם אתה מפתח כאב ו/או חולשת שרירים.
- אתה מפתח סימנים כגון כאבי בטן מתמשכים, בחילות והקאות. פנה מיד לרופא. שכן אלו עלולים להיות תסמינים של דלקת בלבד חריפה.
- יש לך הפרעות במערכת העצבים, הפרעות בנשימה, או שהינך מעל גיל 65. ייתכן שהרופא ירשום לך משטר מינון שונה.
- אי פעם השתמשת לרעה או היית בהלי תלות באלכוהול, תרופות מרשם או סמים לא חוקיים. ייתכן שיש לך סיכון מוגבר לפתח תלות בגאבאפנטין טבע.

#### תלות בתרופה

אנשים מסוימים עלולים לפתח תלות בגאבאפנטין טבע (תחושת צורך להמשיך לקחת את התרופה). ייתכן שיפיעו תסמיני גמילה בעת הפסקת השימוש בתרופה (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה" תחת "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

אם יש לך חשש לגבי אפשרות לפתח תלות בגאבאפנטין טבע, חשוב שתיוועץ ברופא.

אם אתה שם לב לאחד מהסימנים הבאים בעת הטיפול, ייתכן שפיתחת תלות בתרופה:

- אתה מרגיש צורך לקחת את התרופה למשך זמן ארוך יותר ממה שהומלץ על ידי הרופא.
- אתה מרגיש צורך לקחת מינון גבוה יותר מהמומלץ.
- אתה משתמש בתרופה למטרות שונות מאלה שרשמו עבורך.
- ניסית ללא הצלחה להפסיק את השימוש בתרופה או לשלול במינון.
- אתה מרגיש חולה כשאתה מפסיק לקחת את התרופה, ומרגיש טוב יותר כשאתה מתחיל לקחת אותה שוב.
- אם אתה מבחין באחד מהסימנים האלו – פנה לרופא כדי לדון בדרכי טיפול מתאימות, כולל מתי ואיך ניתן להפסיק את הטיפול בצורה בטוחה.
- מספר קטן של חולים שטופלו בתרופה אנטי אפילפטיות כגון גאבאפנטין טבע חוו מחשבות אובדניות או מחשבות על פגיעה בעצמם. פנה מיד לרופא אם יש לך מחשבות כאלה.

#### מידע חשוב על תגובות חמורות אפשריות

קיימים דיווחים על פריחות עור חמורות הכוללות את תסמונת טיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעליני (toxic epidermal necrolysis) ותגובה תרופתית עם אוזינופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) בהקשר של גאבאפנטין. הפסק את השימוש בגאבאפנטין ופנה מיד לטיפול רפואי אם אתה מבחין באחד מהתסמינים הקשורים לתגובות העור החמורות המתוארות בסעיף 4.

**קרא את תיאור התסמינים החמורים בסעיף 4 תחת "שי להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה חווה אחד או יותר מהתסמינים הבאים" לאחר נטילת התרופה** כיוון שהם עלולים להיות חמורים.

פנה מיד לרופא במקרים של חולשה, רגישות או כאב בשרירים ובמיוחד אם מבקביל אתה מרגיש חולה או שיש לך חום גבוה. ייתכן שאלה סימנים של פירוק שריר לא תקין שעלול להיות מסכן חיים ולהוביל לבעיות בכליות. בנוסף, פירוק שיחול שיניו בצבע השתן ויהיו שינויים בתוצאות בדיקת דם (עליה ניכרת ברמות קראטין פוספוקינאז בדם).

#### תרופות אחרות וגאבאפנטין טבע

**אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

במיוחד אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה:

- תרופות פרוכוסים, הפרעות שינה, דיכאון, חרדה או בעיות ניוורולוגיות או פסיכיאטריות אחרות כלשהן.
- תרופות ממשפחת האופיואידים כגון מורפין – אלה עלולות להגביר את ההשפעה של גאבאפנטין טבע. בנוסף, שילוב של גאבאפנטין טבע ואופיואידים עלול לגרום לשיננות, עייפות (דציה), ירידה בקצב הנשימה או מוות.
- סותרי חומצה המכילים אלומיניום ומגנזיום – נטילה בו זמנית עם גאבאפנטין טבע עלולה לגרום לירידה בספיגת גאבאפנטין טבע מהקיבה. לכן מומלץ ליטול גאבאפנטין טבע לפחות שתיים לאחר נטילת סותרי חומצה.
- גאבאפנטין טבע לא צפויה להשפיע על פעילותן של תרופות אנטי אפילפטיות אחרות או של גלולות למניעת היריון.
- גאבאפנטין טבע עלולה להשפיע על תוצאות בדיקות מעבדה מסוימות. אם אתה נדרש לתת דגימת שתן, ספר לרופא או לצוות הרפואי על התרופות שאתה נוטל.

#### שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

#### היריון, הנקה ופוריות

- אם את בהיריון או חושבת שאת בהיריון, יש לפנות מיד לרופא ולדון בסיכונים האפשריים שהתרופה עלולה להוות לעובר.
- אין להפסיק את הטיפול ללא היוועצות ברופא.
- אם את מתכננת להיכנס להיריון, עלייך להיוועץ ברופא שלך מוקדם ככל האפשר לפני כניסתך להיריון.
- אם את מניקה או מתכננת להניק, היועצי ברופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

**היריון**

ניתן להשתמש בגאבאפנטין טבע במהלך השליש הראשון של ההיריון במידת הצורך.

אם את מתכננת להיכנס להיריון, אם את בהריון או חושבת שאת בהיריון, היועצי ברופא שלך מיד.

אם נכנסת להיריון ויש לך אפילפסיה, חשוב שלא תפסיקי לקחת את התרופה מבלי להיוועץ תחילה ברופא שלך, שכן הדבר עלול להחמיר את מחלתך ולהוביל להתפרצות מחודשת של פרוכוסם. החמרה של האפילפסיה עלולה לסכן אותך ואת העובר שלך.

במחקר שסקר נתונים של נשים במדינות מודריות שנטלו גאבאפנטין ב-3 החודשים הראשונים להריון, לא היה סיכון מוגבר למימים מולדים או בעיות בהתפתחות תפקוד המוח (הפרעות בהתפתחות ניוורולוגית). עם זאת, לתינוקות של נשים שנטלו גאבאפנטין במהלך ההריון היה סיכון מוגבר למשקל לידה נמוך וללידה מוקדמת.

בשימוש במהלך ההריון, גאבאפנטין טבע עלולה להוביל לתסמיני גמילה אצל תינוקות שזה עתה נולדו. סיכון זה עשוי לעול כאשר גאבאפנטין נלקח יחד עם משככי כאבים אופיואידים (תרופות לטיפול בכאב חמום).

**הנקה**

גאבאפנטין, החומר הפעיל בגאבאפנטין טבע, עובר לחלב אם. מאחר שהשפעתו על התינוק אינה ידועה, מומלץ שלא להניק בזמן נטילת התרופה.

**פוריות**

במחקרים בחיות לא נמצאה השפעה על פוריות.

#### הנקה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לסחרחורת, לבנמנם ולעייפות.

עליך להימנע מנהיגה, מהפעלת מכונות או מעיסוק בפעילויות אחרות שיכולות להיות מסוכנות עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך ועל יכולתך לבצע פעולות אלו.

באשר לילידים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה גאבאפנטין טבע במינון 300 מ"ג מכילה צבע צהוב מס' 6 FD&C Yellow 6 / Sunset Yellow 6

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל הוא:

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קבוציים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

המינון יקבע לך על ידי הרופא יינתן, בדרך כלל, באופן הדרגתי. המינון ההתחלתי הנו בין 300 מ"ג ל-900 מ"ג ליום. לאחר מכן ייתכן שהרופא יורה לך להעלות את המינון, עד למינון יומי מקסימלי של 3600 מ"ג, המחולק ל-3 מנות נפרדות, כלומר פעם אחת בוקר, פעם אחת בצהריים ופעם אחת בערב. תרופה זו מיועדת לטיפול באפילפסיה במבוגרים, במתבגרים ובילדים מעל גיל 12 שנים.

תרופה זו מיועדת לטיפול בכאב ניוורופתי במבוגרים מגיל 18 שנים ומעלה.

#### אם אתה סובל מבעיות בכליות או מטופל בהמודיאליזה

ייתכן שהרופא ירשום לך מינון ו/או משטר מינון שונה.

#### אם אתה סובל מגיל שנה 65

עליך ליטול את המינון המקובל של גאבאפנטין טבע אלא אם אתה סובל מבעיות בכליות. ייתכן שהרופא ירשום לך מינון ו/או משטר מינון שונה אם אתה סובל מבעיות בכליות.

אם אתה מתרשם שההשפעה של התרופה חזקה מדי או חלשה מדי, פנה מיד לרופא או לרוקח.

#### אין לעבור על המנה המומלצת.

#### צורת הנטילה

תמיד יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה עם הרבה מים.

אסור לפתוח ולפזר את תוכן הכמוסה! מכיוון שההשפעה של צורת מתן זו לא נבדקה.

מומלץ ליטול גאבאפנטין טבע לפחות שתיים לאחר נטילת סותרי חומצה.

יש להמשיך ליטול גאבאפנטין טבע עד שהרופא ינחה אותך להפסיק.

#### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

נטילת מינון יתר עלולה לגרום לעלייה בתופעות לוואי כולל איבוד הכרה, סחרחורת, ראייה כפולה, דיבור לא ברור, נמנום ושלושל.

#### אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אלא אם הגיע הזמן למנה הבאה. **בשום אופן אין ליטול מנה כפולה** כדי לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אל תפסיק ליטול את התרופה אלא על פי הוראה מהרופא. אם אתה נדרש להפסיק את הטיפול, יש לעשות זאת בהדרגה במשך שבוע לפחות. אם אתה מפסיק ליטול את התרופה באופן פתאומי או לפני קבלת הנחיה לך מהרופא, הסיכון לפרוכוסים עולה. לאחר הפסקת טיפול קצר או ארוך טווח בגאבאפנטין טבע, ייתכן שתחווה תופעות לוואי מסוימות, הנקראות תופעות גמילה. תופעות אלו יכולות לכלול פרוכוסים, חרדה, קשיי שינה, בחילה, כאב, הזעה, רעד, כאב ראש, דיכאון, תחושה משונה, סחרחורת ותחושת חולי כללית. תופעות אלו מופיעות בדרך כלל תוך 48 שעות לאחר הפסקת נטילת התרופה. אם אתה חווה תופעות גמילה, עליך לפנות לרופא שלך.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הינך זקוק להם.**
**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגאבאפנטין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה שרימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה חווה אחד או יותר מהתסמינים הבאים:**

- תסמים דמויי מטרה או עגולים בצבע אדמדם שאינם מוגבהים על הגוף, לרוב עם שלפוחיות במרכז, קליוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים. לפני פריחות עור חמורות אלו יכולים להופיע חום ותסמינים דמויי שפעת (תסמונת טיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעליני).**
- פריחה חמוסנית, חום גוף גבוה ובלטות לימפה מוגדלות (תסמונת DRESS – תסמונת רגישות יתר לתרופות).**

**יש לפנות מיד לרופא אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים לאחר נטילת התרופה, כיוון שהם עלולים להיות חמורים:**

- כאב בטן מתמשך, בחילה והקאה – כיוון שאלה עלולים להיות תסמינים של דלקת בלבב חריפה.
- בעיות נשימה, במקרים חמורים ייתכן שתדקק לטיפול חירום כדי להמשיך לנשום רגיל.
- גאבאפנטין טבע עלולה לגרום לתגובה אלרגית חמורה או מסכנת חיים שעלולה להשפיע על העור או על חלקי גוף אחרים, כגון הכבד או תאי הדם. פריחה יכולה להופיע, או לא להופיע, כחלק מתגובה זו. ייתכן שכתוצאה מתגובה זו תיאלץ להתאשפז או להפסיק ליטול גאבאפנטין טבע. פנה לרופא מיד אם אתה סובל מאחד מהתסמינים הבאים:
  - פריחה ואדמומיות בעור ו/או נשירת שיער
  - חרלת
  - חום
  - נפיחות בבלוטות שאינה נעלמת
  - התנפחות השפתיים, הפנים והלשון
  - הצהבת העור או לובן העיניים
  - הופעת חבורות או דימום יוצאי דופן
  - עייפות או חולשה חמורות
  - כאב שרירים בלתי צפוי
  - זיהומים תכופים
- תסמינים אלה עלולים להיות סימנים ראשונים של תגובה חמורה. רופא צריך לבדוק אותך ולהחליט אם אתה יכול להמשיך ליטול את התרופה.
- אם אתה מטופל בהמודיאליזה, ספר לרופא אם אתה מפתח כאב ו/או חולשת שרירים.

#### תופעות לוואי נוספות:

**תופעות לוואי שכוחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשמש 1 מתוך 10):**

- זיהום ויראלי

- הרגשת נמנם, סחרחורת, חוסר קואורדינציה

- הרגשת עייפות, חום

#### תופעות לוואי שכוחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- דלקת ריאות, זיהומים בדרכי הנשימה, זיהומים בדרכי השתן, דלקת אוזניים או זיהומים אחרים
- ספירת תאי דם לבנים נמוכה
- אנוורקסיה, תיאבון מוגבר
- קעס כלפי אחרים, בלבול, שינויים במצב הרוח, דיכאון, חרדה, עצבנות, קושי לחשוב
- פרוכוסים, תנועות לא רצוניות, קשיי דיבור, איבוד זיכרון, רעד, קשיי שינה, כאב ראש, עור רגיש, חוסר תחושה, קשיי קואורדינציה, תנועות עיניים לא רגילות, התגברות, היחלשות או היעדר רפלקסים
- ראייה מטושטשת, ראייה כפולה
- סחרחורת (ורטיגו)
- לחץ דם גבוה, הסמקה או התרחבות של כלי דם
- קשיי נשימה, ברונכיטיס, כאב גרון, שיעול, יובש באף
- הקאה, בחילה, בעיות שיניים, חניכיים מודלקות, שלשול, כאב בטן, קלקול קיבה, עצירות, יובש בפה או בגרון, גזים
- התנפחות הפנים, חבורות, פריחה, גרד, אקנה
- כאב מפרקים, כאב שרירים, כאב גב, עוויתות
- אין אונות בגברים
- התנפחות בגרליים ובזרועות, קשיי הליכה, חולשה, כאב, הרגשת חולי, תסמינים דמויי שפעת
- ירידה בכמות תאי דם לבנים, עלייה במשקל

- פגיעה מקרית, שבר, שפשוף
- במחקרים קליניים בילדים, דווח על התנהגות תוקפנית ותנועות קופצניות
- תופעות לוואי שאינן שכוחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):**
  - אי שקט (מצב של חוסר מנוחה כרוני ותנועות לא מכוונות וחסרות מטרה)
  - תגובה אלרגית כגון חרלת
  - ירידה בתנועה
  - דופק מהיר
  - קושי בבליעה
  - התנפחות העלולה לכלול את הפנים, הגוף והגפיים
  - נזואות חריגות בבדיקות דם המצביעות על בעיות בכבד
  - בעיות נפשיות
  - נפילות
  - עלייה ברמת גלוקוז בדם (נצפית לרוב במטופלים עם סוכרת)

**תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):**

- ירידה ברמות גלוקוז בדם (נצפית לרוב במטופלים עם סוכרת)
- איבוד הכרה
- קושי בנשימה, נשימות שטוחות (דיכוי נשימית)

#### תופעות לוואי שדווחו לאחר שיווק התרופה ושכוחות אינה ידועה:

- ירידה ברמת נטיות הדם
- מחשבות אובדניות, הזיות
- תנועות גוף חריגות כגון התפתלות, תנועות לא רצוניות ונוקשות
- צלצול באוזניים
- הצהבת העור ולובן העיניים (צהבת), דלקת כבד
- אי ספיקת כליות חריפה, בריחת שתן
- הגדלת רקמת שד, הגדלה של השדדים
- תופעות לוואי בעקבות הפסקה פתאומית של גאבאפנטין טבע (חרדה, קשיי שינה, בחילה, כאב, הזעה), כאב בחזה
- פירוק סיבי שריר (רבדומיוליזיס)
- שינוי בתוצאות בדיקת דם (עלייה ברמות קראטין פוספוקינאז)
- בעיות בתפקוד המיני כולל חוסר יכולת להגיע לסיפוק, עיכוב בשפיכה
- רמת נתרן נמוכה בדם
- אובדן תודעה (תגובה אלרגית חמורה ומסכנת חיים, כולל קשיי נשימה, נפיחות של השפתיים, הגרון והלשון, ולחץ דם נמוך המחייבים טיפול חירום) פיתוח תלות טיפול באפאפנטין טבע (אחת התרופות)
- לאחר הפסקת טיפול קצר או ארוך טווח בגאבאפנטין טבע, ייתכן שתחווה תופעות לוואי מסוימות, הנקראות תופעות גמילה (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה" תחת "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

**אם הפגיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על" כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- יש לאחסן את התרופה במקום יבש, מתחת ל- 25°C
- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

#### 6. מידע נוסף

**נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

גאבאפנטין טבע 300 מ"ג:
Talc, pregelatinized starch, FD&C red 3, FD&C yellow 6, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

גאבאפנטין טבע 400 מ"ג:

Talc, pregelatinized starch, red iron oxide, yellow iron oxide, black iron oxide, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

#### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**גאבאפנטין טבע 300 מ"ג:** כמוסת גלטיין קשיחה בצבע כתום המלאה באבקה בצבע לבן-קרם המכילה גושים קטנים. על גוף ומכסה הכמוסה מודפס: 93- 39. גאבאפנטין טבע 400 מ"ג: כמוסת גלטיין קשיחה בצבע חום המלאה באבקה בצבע לבן-קרם המכילה גושים קטנים. על גוף ומכסה הכמוסה מודפס: 93- 40. התרופה נארזת במגשיית (בליסטר) באריזה המכילה 100 כמוסות.

#### שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

#### נערך באוגוסט 2025.

**מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

גאבאפנטין טבע 300 מ"ג: 119-46-29956

גאבאפנטין טבע 400 מ"ג: 119-47-29937