

1. اسم الدواء البيطري، شكله وتركيبه:

Noromectin Paste for Horses Veterinary

نوروميكتين معجون للخيول للاستعمال البيطري

2. المادة الفعالة:

Ivermectin	1.87% w/w	تحتوي كل محقنة على 7.49 غرام معجون بتركيز
Titanium Dioxide	2.0% w/w	يحتوي أيضاً على:
		لقائمة المواد الكاملة غير الفعالة أنظر البند 13 "معلومات إضافية".

3. لم أعد الدواء:

للقاية وعلاج الطفيليات التالية لدى الخيول والحمير:

Large strongyles:	<i>Strongylus vulgaris</i>	adults and larval (arterial) stages
	<i>Strongylus edentatus</i>	adults and larval (tissue) stages
	<i>Strongylus equinus</i>	adults
	<i>Triodontophorus spp</i>	adults
Small strongyles	<i>Cyathostomum spp</i>	adult and immature
Including benzimidazole-	<i>Cylicocycclus spp</i>	adult and immature
Resistant strains	<i>Cylicodontophorus spp</i>	adult and immature
	<i>Gyalocephalus spp</i>	adult and immature
Hairworms	<i>Trichostrongylus axei</i>	adult
Pinworms	<i>Oxyuris equi</i>	adult and immature
Ascarids	<i>Parascaris equorum</i>	adult and immature
Intestinal threadworms	<i>Strongyloides westeri</i>	adult
Neck threadworms	<i>Onchocerca spp</i>	microfilariae
Lungworms	<i>Dictyocaulus arnfieldi</i>	adult and immature
Stomach bots	<i>Gasterophilus spp</i>	oral and gastric larval stages
	<i>Habronema muscae</i>	adult

الفصيلة العلاجية: مضاد الطفيليات واسع المجال.

4. موانع الاستعمال:

يُمنع استعمال الدواء إذا كان الحيوان حساساً (أرجي) للمادة الفعالة، أو لفصيلة المواد macrocyclic lactones التي تنتمي إليها المادة الفعالة، أو لأي من المواد غير الفعالة.

الدواء ملائم للاستعمال لدى الخيول والحمير فقط. يُمنع إعطاؤه للحيوانات الأخرى، فقد يُسبب أعراضاً جانبية خطيرة.

يُمنع إعطاؤه للكلاب والقطط، ويُمنع السماح لها بلعق المرهم والمحقنة المُستعملة.

5. الأعراض الجانبية:

الخيول التي تعاني من تلوّث جسيم من نوع *Onchocerca microfilariae* معرضة للإصابة بوذمة وحكة بعد إعطاء الدواء، ويبدو أن هذه الحالة تحدث بسبب موت عدد كبير من الميكروفيلايريا (microfilariae). تزول هذه العلامات خلال بضعة أيام، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى معالجة الأعراض.يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

6. الحيوانات المستهدفة:

الخيول والحمير.

7. طريقة إعطاء الدواء والجرعة:

للإعطاء الفموي بجرعة 0.2 ملغ Ivermectin لكل كغم وزن الجسم. تحتوي محقنة واحدة كاملة مقدارها 7.49 غرام على 140 ملغ من Ivermectin، ملائمة للخيول ذات وزن 700 كغم.

يجب تقييم وزن الحصان بدقة متناهية بهدف إعطاء الجرعة الدوائية الملائمة. كل سطر تدريج على المحقنة ملائم للإعطاء لـ 100 كغم وزن الجسم.

يمكن تكرار العلاج في نطاق 30 يوماً على الأقل بعد إعطاء العلاج السابق.

8. طريقة استعمال المستحضر:

يجب التأكد من عدم وجود بقايا طعام في فم الحصان لضمان ابتلاع الدواء.

عند إعطاء الدواء، يجب إدخال طرف المحقنة داخل تجويف الفم بين الأسنان الأمامية والخلفية. بعد الإعطاء فوراً، يجب إمساك رأس الحصان ورفع لبضع ثوانٍ.

للحصول على نتائج جيدة، يستحسن إعطاء علاج مضاد للطفيليات لكل الخيول في الإسطبل في ذات الوقت.

9. مدة الانتظار:

ليس ذا صلة

10. تحذيرات:

- تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء لعلاج الحيوانات المستهدفة:
يجب التشديد على تجنب الاستعمال وفق الشروط المفصلة أدناه، لأن هذه الشروط تزيد من خطر تطور مقاومة للمستحضر، وهكذا قد تؤدي إلى عدم نجاعة العلاج:
 - يجب تجنب استعمال نفس النوع من مضاد الطفيليات في أحيان قريبة، وتجنب الاستعمال المتواصل.
 - يجب توخي الحذر من إعطاء جرعة ناقصة بسبب تقدير خاطئ لوزن الحصان أو استعمال المحقنة بشكل غير صحيح.
- تحذيرات خاصة متعلقة بالأمان عند استعمال الدواء لدى الحيوانات:
لا يوجد.
- تحذيرات خاصة متعلقة بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر لتقديم علاج:
 - لا يجوز التدخين، الشرب أو تناول الطعام عند ملامسة المستحضر.
 - يجب الامتناع عن ملامسة المستحضر للجد أو العينين. في حال حدوث ملامسة يجب الشطف فوراً بكمية كبيرة من الماء.
 - يجب غسل الأيدي بعد استعمال المستحضر.
 - في حال ابتلاع أو تدهج العينين، يجب التوجه للحصول على مساعدة طبية، وعرض المحقنة أو نشرة المستحضر أمام الطبيب.
- تحذيرات إضافية:
هذا الدواء خطير للغاية على الأسماك والحيوانات المائية، لا يجوز التلويث بإلقاء الدواء وبقيائه في البحيرات، البرك والقنوات المائية.
- الحمل والإرضاع لدى الحيوان المُعالج:
يمكن إعطاء الدواء للحيوانات الحوامل والمرضعات. كما يمكن استعماله للخيل المستخدمة في التكاثر دون الإضرار بخصوصيتها.
- ردود فعل مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات:
عند إعطاء الدواء بالتزامن مع منتجات أخرى لعلاج الخيل، لم تتم ملاحظة أي ردود فعل مع المنتجات الأخرى.
- الجرعة المفرطة:
جرعات أعلى بـ 9 أضعاف من جرعة مقدارها 1.8 ملغ /كغم وزن الجسم شوهدت علامات عابرة من بطء رد الفعل تجاه الضوء واكتئاب معتدلين. جرعات أعلى بكثير، شوهدت توسع الحدقة، رنج، رجفان، تبولد الإحساس، سبات ووفاء. رغم أنه ليس هناك علاج خاص عند استعمال جرعة مفرطة، يمكن أن يكون علاج الأعراض الجانبية ناجحاً.
- تعارض (عدم تلاؤم – incompatibility):
في حالة عدم وجود معطيات، لا يجوز خلط هذا الدواء مع أدوية أخرى.

11. تعليمات التخزين:

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين - يجب الاحتفاظ بالمستحضر بدرجة حرارة تحت 25°C. يجب التخزين في العبوة الكرتونية الأصلية لحمايته من الضوء.
- يجب الاستعمال فوراً بعد الفتح وتخلص من أي بقايا دواء.

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقياء المستحضر عند الانتهاء من الاستعمال:

- هذا الدواء خطير للغاية على الأسماك والحيوانات المائية. لا يجوز التلويث بإلقاء الدواء وبقيائه في البحيرات، البرك والقنوات المائية.
- كل مستحضر طبيّ بيطري لم يتم استعماله أو كل مادة زائدة تمّ الحصول عليها من استعمال مُنتج بيطري، يجب التخلص منها كقمامة سامة، يُمنع رمي الدواء في نظام الصرف الصحيّ.

13. معلومات إضافية:

- إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Hydroxypropyl Cellulose, Hydrogenated Castor Oil, Titanium Dioxide (E171),
Propylene Glycol, Water for Injection

• كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة:

مجموع فموي متجانس لونه أبيض، معاً في محقنة أحادية الاستعمال.

• أحجام العبوات:

محاقن بلاستيكية تتضمن 7.49 غرام من المعجون في عبوات ذات 1، 2 و 10 وحدات.

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

• صاحب التسجيل: أريك منتجات بيطرية م.ض.،

شارع هانجف 2، إيربورت سيتي، 7019900

• اسم المُنتج:

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK

تم تحريرها في تموز 2025 وفق تعليمات وزارة الصحة.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 082-50-92296-00