

## עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד

לשימוש בבעלי חיים בלבד

### 1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה:

**Noromectin Paste for Horses Veterinary**

נורומקטין פסטה לסוסים וטרינרי

### 2. חומר פעיל:

כל מזרק מכיל 7.49 גרם פסטה בריכוז

Ivermectin 1.87% w/w

מכיל גם:

Titanium Dioxide 2.0% w/w

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13 "מידע נוסף".

### 3. למה מיועדת התרופה:

למניעה ולטיפול בטפילים הבאים בסוסים ובחמורים:

Large strongyles:	<i>Strongylus vulgaris</i> <i>Strongylus edentatus</i> <i>Strongylus equinus</i> <i>Triodontophorus spp</i>	adults and larval (arterial) stages adults and larval (tissue) stages adults adults
Small strongyles	<i>Cyathostomum spp</i>	adult and immature
Including benzimidazole-Resistant strains	<i>Cylicocyclus spp</i> <i>Cylicodontophorus spp</i> <i>Gyalocephalus spp</i>	adult and immature adult and immature adult and immature
Hairworms	<i>Trichostrongylus axei</i>	adult
Pinworms	<i>Oxyuris equi</i>	adult and immature
Ascarids	<i>Parascaris equorum</i>	adult and immature
Intestinal threadworms	<i>Strongyloides westeri</i>	adult
Neck threadworms	<i>Onchocerca spp</i>	microfilariae
Lungworms	<i>Dictyocaulus arnfieldi</i>	adult and immature
Stomach bots	<i>Gasterophilus spp</i> <i>Habronema muscae</i>	oral and gastric larval stages adult

קבוצה תרפויטית: נוגד טפילים רחב טווח.

### 4. התוויות נגד:

אין להשתמש בתרופה אם בעל החיים רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, לקבוצת החומרים macrocyclic lactones אליה שייך החומר הפעיל או לכל אחד מהחומרים הבלתי פעילים.

התרופה מתאימה לשימוש בסוסים וחמורים בלבד. אסור לתת אותה לבעלי חיים אחרים, שכן הדבר עשוי לגרום לתופעות לוואי חמורות. אסור לתת לכלבים וחתולים ואסור לאפשר להם ללקק את המשחה ואת המזרק המשומש.

## 5. תופעות לוואי:

סוסים עם זיהום חמור של *Onchocerca microfilariae* חשופים לבצקת וגירוד לאחר מתן התרופה, כנראה עקב תמותה של המיקרופילריה במספרים גדולים. סימנים אלה עוברים תוך מספר ימים, אך ייתכן שיהיה צורך בטיפול סימפטומטי.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 6. חיות מטרה:

סוסים וחמורים.

## 7. אופן המתן והמינון:

למתן דרך הפה במינון של 0.2 מ"ג Ivermectin לכל ק"ג משקל גוף. מזרק שלם אחד של 7.49 גרם מכיל 140 מ"ג Ivermectin המתאימים לסוס במשקל 700 ק"ג. יש להעריך בדיוק מרבי משקל הסוס למתן מינון מתאים של התרופה. כל שנחה במזרק מתאימה למתן ל-100 ק"ג משקל גוף. ניתן לחזור על הטיפול בטווח של 30 ימים לפחות לאחר מתן הטיפול הקודם.

## 8. אופן השימוש בתכשיר:

יש לוודא שאין שאריות של אוכל בפה הסוס כדי להבטיח את בליעת התרופה. במתן התרופה, יש להכניס את קצה המזרק לחלל הפה בין השיניים הקדמיות לאחוריות. מיד לאחר המתן יש להחזיק ולהרים את ראש הסוס למשך מספר שניות. בכדי להשיג תוצאות טובות רצוי לתת טיפול נגד פרזיטים לכל הסוסים באורווה באותו הזמן.

## 9. זמן המתנה:

לא רלוונטי

## 10. אזהרות:

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בחיות המטרה:  
יש להקפיד להימנע משימוש על פי התנאים המפורטים מטה, כיוון שהם מגבירים את הסיכון להתפתחות עמידות לתכשיר, וכך עלולים לגרום לטיפול לא יעיל:
  - יש להימנע משימוש תכוף באותו סוג של נוגד טפילים, ומשימוש לאורך זמן ממושך.
  - יש להיזהר ממינון חסר הנובע מהערכת משקל שגויה של הסוס או משימוש לא נכון במזרק.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים:  
אין.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:
  - אין לעשן, לשתות או לאכול בזמן שהנך במגע עם התכשיר.
  - יש להימנע ממגע של התכשיר עם העור או העיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית בכמות גדולה של מים.
  - יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתכשיר.

— במקרה של בליעה או גירוי בעיניים, יש לפנות לעזרה רפואית, ולהציג בפני הרופא את המזרק או עלון התכשיר.

- **אזהרות נוספות:**  
התרופה מסוכנת בצורה קיצונית לדגים ולבעלי חיים החיים במים, אין לזהם על ידי השלכת התרופה ושאריות שלה באגמים, בבריכות ובתעלות מים.
- **היריון והנקה של בעל החיים המטופל:**  
ניתן לתת את התרופה לחיות הרות ומניקות. כמו כן, ניתן להשתמש בסוסים המשמשים להרבעה מבלי לפגוע בפוריות שלהם.
- **תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות:**  
כאשר התרופה ניתנה במקביל למתן של מוצרים אחרים לטיפול בסוסים לא נצפו תגובות עם המוצרים האחרים.
- **מינון יתר:**  
במינונים גבוהים פי 9 של 1.8 מ"ג/ק"ג משקל גוף נצפו סימנים חולפים של איטיות בתגובה לאור ודכאון מתונים. במינונים עוד יותר גבוהים נצפו התרחבות של האישונים, אטקסיה, רעידות, קהות חושים, תרדמת ומוות.
- **למרות שאין טיפול ייעודי במינון יתר, טיפול סימפטומטי בתופעות לוואי יכול להועיל.**
- **חוסר תאימות (Incompatibility):**  
בהיעדר נתונים, אין לערבב את התרופה הזאת עם תרופות אחרות.

#### 11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון** – יש לשמור את התכשיר בטמפרטורה מתחת ל-25°C. יש לאחסן באריזת קרטון מקורית כדי להגן מאור.
- יש להשתמש מיד לאחר הפתיחה ולהשמיד את שאריות התרופה.

#### 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

- **התרופה מסוכנת בצורה קיצונית לדגים ולבעלי חיים החיים במים.** אין לזהם על ידי השלכת התרופה ושאריות שלה באגמים, בבריכות ובתעלות מים.
- כל שאריות של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב

#### 13. מידע נוסף:

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Hydroxypropyl Cellulose, Hydrogenated Castor Oil, Titanium Dioxide (E171), Propylene Glycol, Water for Injection

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
פסטה פומית הומוגנית בצבע לבן במזרק לשימוש חד פעמי.
- **גודלי האריזות:**

מזרקי פלסטיק עם 7.49 גרם של פסטה באריזות של 1, 2 ו-10 יחידות.  
ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

• **בעל הרישום:**

אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, 7019900

• **שם היצרן:**

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP,  
Northern Ireland, UK

נערך ביולי 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

• **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

082-50-92296-00