

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

Bovaclox DC Veterinary, Intramammary Suspension

בוואקלוקס DC וטרינרי, תרחיף לשימוש בעיניים

2. חומרים פעילים:

כל מזרק של 4.5 גרם תרחיף מכיל:

Cloxacillin (as Benzathine salt)	500 mg
Ampicillin (as Trihydrate)	250 mg

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

לשימוש שגרתי בפרות בתקופת הייבוש, לטיפול בדלקת עיניים קיימת ולסיוע במניעת זיהומים חדשים במהלך תקופת הייבוש.

התרופה גם מסייעת בהפחתת שכיחות דלקת עיניים קיצית בפרות יבשות ועגלות בסיכון.
בין האורגניזמים שנמצאו רגישים לאמפיצילין וקלוקסצילין נמנים:

Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Escherichia coli.

קבוצה תרפויטית: חומרים אנטי בקטריאליים ממשפחות הפניצילינים ובטא-לקטמים.

4. התוויות נגד:

לא לשימוש בפרות מיניקות (חולבות כשמניבות חלב).
לא לשימוש בפרות עם תקופת ייבוש קצרה מאוד.
לא לשימוש 45 יום לפני ההמלטה.

5. תופעות לוואי:

לא ידועות תופעות לוואי בטיפול בתכשיר.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה:

פרות בתקופת הייבוש

7. אופן המתן והמינון:

טיפול בתקופת הייבוש: יש להחדיר תכולת מזרק אחד לכל רבע עטין.

8. אופן השימוש בתכשיר:

אחרי החליבה הסופית שלפני ההמלטה, יש לנקות ולחטא את הפטמות ולהחדיר תכולת מזרק אחד לכל רבע עטין דרך תעלת הפטמה.

9. זמן המתנה:

חלב: 120 שעות אחרי ההמלטה.

אם הפרה ממליטה מוקדם יותר מ-45 יום אחרי הטיפול האחרון, יש להשתמש בחלב אחרי 45 יום + 120 שעות אחרי הטיפול האחרון. במקרה של שימוש בפרות מיניקות יש להשמיד את החלב במשך 30 יום, ואחרי תקופה זו יש לבדוק את החלב עד שלא ניתן לגלות יותר אנטיביוטיקה.

בפרות הסובלות מ-hypocalcaemia, יש לבדוק את החלב לניקיון מאנטיביוטיקה לפני שניתן יהיה להשתמש בו לצריכת אדם.

בשר: 28 יום מהטיפול האחרון.

10. אזהרות:

• אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיות המטרה:

אין אזהרות מיוחדות.

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים:**
בטיפול בעגלות חשוב שפיית המזרק לא תוכנס לתוך הפטמה. יש לרסן את החיה. יש להשעין את פיית המזרק כנגד פתח הפטמה אך לא להחדירה. כשלוחצים על המזרק התכשיר מוחדר לעטין.
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:**
יש ללבוש כפפות בעת הטיפול בעגלות כדי להימנע ממגע של התכשיר עם העור.
פניצילינים וצפלוספורינים עלולים לגרום לרגישות יתר (אלרגיה) בעקבות הזרקה, שאיפה, בליעה או מגע עם העור.
רגישות יתר לפניצילינים עלולה לגרום לתגובה דומה לצפלוספורינים ולהיפך (רגישות צולבת). תגובות אלרגיות לחומרים אלו עלולות לעיתים להיות חמורות.
- 1. אין לטפל בתכשיר אם ידוע על רגישות של האדם המטפל, או אם הומלץ לאדם המטפל לא לעבוד עם חומרים מסוג זה.
- 2. יש להשתמש בתכשיר בזהירות רבה כדי למנוע חשיפה, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המומלצים.
- 3. במידה והתפתחו תופעות בעקבות חשיפה כגון פריחה עורית, יש לפנות לייעוץ רפואי ולהראות לרופא את האזהרות. התנפחות של הפנים, השפתיים או העיניים, או קשיים בנשימה הם סימפטומים חמורים ודורשים פנייה דחופה לקבלת טיפול רפואי.
- יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.
- **היריון והנקה של בעל החיים המטופל:**
התכשיר בטוח לשימוש בחיות בהיריון.
- **תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות:**
אין.
- **מינון יתר:**
לא ישים.
- **חוסר תאימות (Incompatibility):**
לא ידוע.

11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון** – יש לשמור את התכשיר מתחת ל-25°C.
- המזרק מיועד לשימוש חד פעמי. יש להשליך מזרקים שנעשה בהם שימוש חלקי.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף:

- **נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:**
Aluminium Stearate, Liquid Paraffin
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
תרחיף בצבע אופ-וויט.
- **גודלי האריזות:**
מזרק LDPE לבן המכיל 4.5 גרם תרחיף, סגור במכסה LDPE וארוז בקופסת קרטון המכילה 24 מזרקים.
- **בעל הרישום:**
אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, 7019900
- **שם היצרן:**

Norbrook Laboratories Limited., Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down,
BT35 6JP, Northern Ireland, UK

נערך באוגוסט 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 083-60-92376-00