

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשפ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

### ספסטיין תרחץ

הרכב:  
כלורהקסידין דיגלוקונאט 4% w/v  
(Chlorhexidine Digluconate 4% w/v)  
מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון דע סופו בטרם שתשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בטיעון 3 "הצגת השתמש בתרופה?" בעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מתמרים או אינם משתפרים.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

- שטיפת ידיים אנטיספטית
- חיטוי ידיים לפי ניתוח
- חיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח

**קבוצה תרפויטית:** תכשירים אנטיספטיים.

#### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). במיוחד במטופלים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלורהקסידין.
- אקלים חשש שהתרופה תבוא במגע עם העיניים, האוזן התיכונה, המוח וקרום המוח (הרקמה המכסה את המוח וחוט השדרה).

**אהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**  
אין להשתמש בחללי הגוף (לדוגמה אף או אזניים).

- אין להשתמש בזהירות ביולודים, במיוחד אלו שנולדו לפני הזמן. ספסטיין תרחץ עלול לגרום לכוויות כימיות בעור.
- הסר כל בד סופג, אריג או בגד לפני שתמשך לניתוח. אין להשתמש בכמויות מוגזמות אין לאפשרות לתרחץ להצטבר בקפלי העור או מתחת למטופל או לטפס על הסדינים או על כל דבר אחר שנמצא במגע ישיר עם המטופל. כאשר ישנו צורך לשים תחבושות על אזורים בעור שנחשפו לספסטיין תרחץ, יש לנקות

בזהירות ולוודא שלא נשאר עודפי תרחץ בטרם הבישת האזור.

- אין לאפשר מגע עם העיניים בגלל חשש לפגיעה בראייה. אם נגרם מגע עם העיניים – שטוף באופן מיידי יסודי עם מים. במקרה של גירוי, אודם או כאב בעין או הפרעה לראייה, פנה ליעוץ רפואי באופן מיידי. מקרים חמורים של פגיעה מתמשכת בקרנית (פגיעה בפני שטח העין) שעלולה לרושש השתלה קרנית דווחו כאשר מוריק דומים באו בטעות במגע עם העין במהלך פרוצדורות כירורגיות, בחולים בהרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:**  
**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם איך בטוח בנוגע לימינו ולזמן הטיפול בתרופה. אין לעבור על המנה המומלצת.

#### צורת הנטילה:

אין לבלוע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

#### אופן השימוש:

אין למחול את התרחץ. לשיטפת ידיים אנטיספטית:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
  2. הוסף 5 מ"ל ספסטיין תרחץ לא מהול ורחץ את הידיים במשך דקה
  3. שטוף היטב במים
  4. יבש היטב את הידיים
- לחיטוי ידיים לפני ניתוח:**
1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
  2. הוסף 5 מ"ל ספסטיין תרחץ לא מהול ורחץ את הידיים במשך דקה
  3. נקה את הציפורניים באמצעות מברשת
  4. שטוף את הידיים במים
  5. חזור על הפעולה פעם נוספת במשך 2 דקות
  6. שטוף היטב במים
  7. יבש היטב את הידיים

**לחיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח:**

1. שטוף את כל הגוף עם 25 מ"ל של ספסטיין תרחץ, לפחות פעמיים, בדרך כלל פעם אחת ביום שלפני הניתוח ופעם שנייה ביום הניתוח
2. שטוף היטב במים
3. יבש היטב את הגוף

אם בלעת בטעות מהתרופה או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחושך בידוק התווית והמנה בכל פעם שהגך נוטל תרופה. הרכב משקפיים**

**אם הגך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספסטיין תרחץ עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

לעיתים נדירות כלורהקסידין עלול לגרום לרגישות יתר כולל שוק אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים ולחץ דם נמוך).

**תופעות לוואי נוספות ששייכות אינה ידועה:**

- תגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת של העור, גירוד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחיות).

- פגיעה בקרנית (פגיעה בפני שטח העין) וזקק קבוע עשויים לכולל לקויי ראייה קבוע (בעקבות חשיפה מקרנית של העיניים במהלך ניתוחי ראש, פנים וצוואר) בחולים תחת הרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

#### תופעות לוואי ביולודים:

יתכנו כוויות כימיות ביולודים ובתינוקות (שכיחות לא ידועה).

אם מתרחשת אחת מהתגובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המוקדן לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך מנעו הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

#### תנאי אחסון:

- במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- סגור היטב.

#### 6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם Purified Water, Poloxamer, Lauramine Oxide, Isopropyl Alcohol, Ponceau 4R (E-124), Fragrance.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

נזל צלול בצבע אדום.  
תכולה: 100 מ"ל, 500 מ"ל.

**יצרן ובעל הרישום:**

בן שמעון פלורוש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ב. משגב 2017400, ישראל.  
עליו זיהו נעדר ב-2025/12 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

00-29484-12

לשם תפישות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.