

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פרמיקסון™ 160 מ"ג כמוסות

הרכב:

החומר הפעיל וכמותו - כל כמוסה מכילה:

Lipidosterolic Extract of Serenoa Repens 160mg

תמצית ליפידוסטרולית של צמח הדקל הננסי (Serenoa Repens) 160 מ"ג.
חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר: ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול בבעיות מתונות בהטלת שתן הקשורות להגדלה שפירה של בלוטת הערמונית (פרוסטטה) בגברים מבוגרים.
קבוצה תרפויטית: תכשיר רפואי המשמש לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל Lipidosterolic Extract of Serenoa Repens
- או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- נטילת התרופה על קיבה ריקה עלולה לגרום לבחילה.
- במהלך הטיפול, כחלק ממעקב שגרתי של ההגדלה השפירה של בלוטת הערמונית, המטופל חייב להיות תחת השגחה רפואית מתמשכת.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

לא נצפו הפרעות עם תרופות אחרות המשמשות לעיתים קרובות לטיפול במחלה זו (אנטיביוטיקה לדרכי השתן, חומרים אנטיספטיים וחומרים נוגדי דלקת). כדי להימנע מתגובות אפשריות בין תרופות שונות, יש ליידע את הרופא שלך או הרוקח על כל הטיפולים האחרים שאתה מקבל.

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

הריון, הנקה ופוריות

תכשיר רפואי זה אינו מיועד לטיפול בנשים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא 2 כמוסות ביום, עם הארוחות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול את התרופה עם הארוחה. יש לבלוע את התרופה עם כוס מים. אין לפתוח ולפזר את תוכן הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, תיתכן הופעת הפרעות חולפות במערכת העיכול (כאבי בטן).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרמיקסון 160 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100)

• כאבי ראש (מיגרנות)

• כאבי בטן

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000)

• בחילה

• עלייה בגאמא-גלוטמילטרנספראז ועלייה מתונה בטרנסאמינאזות (אנזימי הכבד)

• סרפדת (פריחה בעור)

• התפתחות לא תקינה של רקמת שד בגברים (גינקומסטיה) - הפיכה לאחר הפסקת השימוש בתרופה

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

• בצקת (נפיחות של העור)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>
בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה:
Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והמגשית (בליסטר). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• יש לאחסן מתחת ל-25°C.

אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Polyethylene glycol 10,000

הרכב מעטפת הכמוסה:

Gelatin, Titanium dioxide E171, Yellow iron oxide E172, Indigotin E132

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
כמוסה בצבע ירוק בהיר.
אריזות של 30, 56, 60 ו-100 כמוסות, הארוזות בבליסטרים (מגשיות).
ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.
- **בעל הרישום היבואן וכתובתו:** פאדאג'יס ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.
- נערך בנובמבר 2025.
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 11318.28916

17.11.2025