

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אנוקספרין לדרקסן

תמיסה להזרקה

מזרק מוכן לשימוש עם מנגנון בטיחות

20 מ"ג (2,000 יחידות)/0.2 מ"ל

40 מ"ג (4,000 יחידות)/0.4 מ"ל

60 מ"ג (6,000 יחידות)/0.6 מ"ל

80 מ"ג (8,000 יחידות)/0.8 מ"ל

100 מ"ג (10,000 יחידות)/1 מ"ל

חומר פעיל וכמותו:

כל מזרק מכיל בהתאמה:

אנוקספרין סודיום 20 מ"ג, 40 מ"ג, 60 מ"ג, 80 מ"ג, 100 מ"ג, בהתאמה.

Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg, respectively.

חומרים בלתי פעילים, ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

שמור על עלון זה, ייתכן שתצטרך לקרוא בו שוב.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

אם תופעת לוואי מחמירה או אם הופיעה תופעת לוואי שלא מצוינת בעלון זה, אנא פנה לרופא או לרוקח.

אנוקספרין לדרקסן מזרק מוכן לשימוש עם מנגנון בטיחות הינו תכשיר ביו-סימילאר. למידע נוסף, יש לפנות לאתר משרד הבריאות:

<https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx>

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו משמשת במבוגרים ל:

- טיפול בקרישי דם שנוצרו בדמך
- עצירת היווצרות קרישי דם בדמך במצבים הבאים:
 - לפני ואחרי ניתוח
 - כאשר יש לך מחלה שמונעת ממך לזוז או שמגבילה את הניידות שלך לזמן מה
- עצירת היווצרות קרישי דם כאשר יש לך תעוקת חזה (אנגינה) לא יציבה (מצב שבו לא מגיע מספיק דם ללב שלך) או לאחר התקף לב.
- עצירת היווצרות קרישי דם בצינוריות של מכונת הדיאליזה (בשימוש לאנשים עם בעיות חמורות בכליה).

קבוצה תרפויטית:

התרופה מכילה חומר פעיל שנקרא אנוקספרין סודיום, אשר שייך לקבוצת תרופות שנקראות "הפרין בעל משקל מולקולרי נמוך" או LMWH.

התרופה פועלת בשתי דרכים:

1. מונעת מקרישי דם קיימים להפוך לגדולים יותר. זה עוזר לגוף לפרק אותם ומונע מהם להזיק לך.
2. מונעת היווצרות של קרישי דם חדשים בדמך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי ל:
 - אנוקספרין סודיום או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
 - הפרין או תכשירים אחרים של הפרין בעלי משקל מולקולרי נמוך, כגון נאדרופרין, טינזאפרין או דאלטפרין.
- סימנים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, קושי בבליעה או בנשימה, נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון, בחלל הפה, בגרון או בעיניים.
- הייתה לך תגובה להפרין שגרמה לירידה חדה במספר הטסיות שלך, במהלך 100 הימים האחרונים.
- יש לך נוגדנים לאנוקספרין בדמך.
- אתה סובל מדימום בכבד או נמצא במצב שכרוך בסיכון גבוה לדימום, כגון כיב קיבה, ניתוח שהיה לאחרונה במוח או בעיניים או שבץ על רקע דימומי שאירע לאחרונה.
- אתה משתמש באנוקספרין לטיפול בקרישי דם בגופך ואתה מתכנן לעבור במהלך 24 השעות:
 - ניקור בעמוד השדרה או ניקור מותני,
 - ניתוח הכולל הרדמה אפידורלית או ספינלית.

אין להשתמש באנוקספרין לדקסן אם אחד מהנזכרים מעלה חל עלייך. אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך לפני השימוש.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין להחליף אנוקספרין לדקסן עם תכשירים אחרים ששייכים לקבוצת ההפרין בעל משקל מולקולרי נמוך, כגון נאדרופרין, טינזאפרין או דאלטפרין. הסיבה לכך היא שהם אינם זהים ואין להם את אותה הפעילות ואותן הוראות שימוש.

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- הייתה לך אי פעם תגובה להפרין שגרמה לירידה חדה במספר טסיות הדם,
- הותקן לך מסתם לב,
- יש לך אנדוקרדיטיס (דלקת של הקרום הפנימי של הלב),
- יש לך היסטוריה של כיבים בקיבה,
- עברת שבץ לאחרונה,
- יש לך לחץ דם גבוה,
- יש לך סוכרת או בעיות עם כלי דם בעיניים שנגרמו על ידי סוכרת (מחלה המכונה רטינופתיה סוכרתית),
- עברת לאחרונה ניתוח בעיניים או במוח,
- אתה קשיש (מעל גיל 65 שנים) ובמיוחד אם אתה מעל גיל 75 שנים,
- יש לך בעיות בכליות,
- יש לך בעיות בכבד,
- אתה בתת משקל או בעודף משקל,
- יש לך רמות גבוהות של אשלגן בדם (ניתן לבדוק זאת בבדיקת דם).

- אתה משתמש כעת בתרופות שמשפיעות על דימום (ראה סעיף מטה על אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות).
 - יש לך בעיה בעמוד השדרה שלך או שעברת ניתוח בעמוד השדרה.
 - אם אחד מהנזכרים מעלה חל עלייך (או אם אינך בטוח), שוחח עם הרופא או הרוקח שלך לפני השימוש באנוקספרין.
- עבור מטופלים המקבלים מנות הגבוהות מ-210 מ"ג ליום, תרופה זו מכילה יותר מ-24 מ"ג נתרן (המרכיב העיקרי של מלח בישול/שולחן) בכל מנה. כמות זו שווה ערך ל-1.2% מהצריכה היומית המרבית המומלצת של נתרן למבוגר.

בדיקות ומעקב

ייתכן שתעבור בדיקת דם לפני התחלת השימוש בתרופה זו וכן במרווחי זמן מסוימים במהלך השימוש בה, על מנת לבדוק את רמת תאי הקרישה (טסיות) והאשלגן בדמך.

שימוש בילדים ומתבגרים

הבטיחות והיעילות של אנוקספרין לדרקסן לא נבדקו בילדים ובמתבגרים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- וארפרין - תרופה לדילול הדם.
- אספירין (ידוע גם בשם חומצה אצטילסליצילית או ASA), קלופידוגרל או תרופות אחרות המשמשות לעצירת היווצרות קרישי דם (ראה סעיף 3 - שינוי בתרופה נוגדת הקרישה),
- זריקת דקסטרן - משמשת כתחליף דם,
- איבופרופן, דיקלופנק, קטורולק או תרופות אחרות שמוכרות כתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות שמשמשות לטיפול בכאב ובנפיחות בדלקת פרקים ובמצבים אחרים,
- פרדניזולון, דקסמתזון או תרופות אחרות המשמשות לטיפול באסתמה, בדלקת פרקים ראומטית ובמצבים אחרים,
- תרופות המעלות את רמת האשלגן בדמך כגון מלחי אשלגן, משתנים ותרופות מסוימות לבעיות בלב.

ניתוחים והרדמות

אם אתה עומד לעבור ניקור עמוד שדרה או ניקור מותני או ניתוח המחייב הרדמה אפידורלית או ספינלית, ספר לרופא שלך שאתה משתמש באנוקספרין לדרקסן.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

אם את בהיריון ויש לך מסתם לב מכאני, את עשויה להיות בסיכון מוגבר לפתח קרישי דם. הרופא שלך ישוחח איתך על כך.

אם את מניקה או מתכננת להניק, עלייך להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוונות

אנוקספרין לדרקסן אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונות.

רצוי ששם התרופה ומספר האצווה של התכשיר שאתה משתמש בו יהיו מתועדים על ידי הצוות הרפואי שלך.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

- עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
- בזמן שאתה בבית חולים, רופא או אחות בדרך כלל יתנו לך את התרופה, כיוון שהיא ניתנת בהזרקה.
- כשתגיע הביתה ייתכן שתצטרך להמשיך להזריק אנוקספרין לדרקסן בעצמך (ראה הוראות הזרקה מטה).
- אנוקספרין לדרקסן ניתנת בדרך כלל בהזרקה תת-עורית.
- ניתן לתת אנוקספרין לדרקסן בהזרקה לווריד (תוך-וריד) לאחר סוגים מסוימים של התקף לב או ניתוחים.
- ניתן להוסיף תרופה זו לצינורית היוצאת מהגוף (קו עורקי) בתחילת טיפול דיאליזה.
- אין להזריק אנוקספרין לדרקסן לתוך שריר.

מינון

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. מינון התרופה יהיה תלוי בסיבה שעבורה אתה משתמש בה. אם יש לך בעיות בכליות, ייתכן ותקבל מינון נמוך יותר של התרופה. אין לעבור על המנה המומלצת.

מתן עצמי של אנוקספרין לדרקסן

אם אתה מסוגל להזריק את התרופה לעצמך, הרופא או האחות שלך יראו לך כיצד לעשות זאת. אל תנסה להזריק לעצמך אם לא הודרכת כיצד לעשות זאת. אם אינך בטוח מה לעשות, פנה לרופא או אחות שלך מיד. מתן ההזרקה באופן הנכון מתחת לעור תעזור להפחית כאב וחבורות באתר ההזרקה.


לפני ההזרקה

- הכן את הפריטים להם תזדקק: מזרק, פד אלכוהול או סבון ומים, ומכל לעצמים חדים.
- בדוק את תאריך התפוגה על גבי התרופה. אין להשתמש אם התאריך עבר.
- בדוק שהמזרק אינו פגום ושהתרופה בו הינה תמיסה צלולה. אם לא, השתמש במזרק אחר של התרופה.
- ודא שאתה יודע כמה עליך להזריק.
- בדוק את בטנך כדי לראות אם הזריקה האחרונה גרמה לאדמומיות כלשהי, שינוי בצבע העור, נפיחות, הפרשה מהעור, או אם עדיין כואב. אם כך, שוחח עם הרופא או האחות שלך.

הוראות להזרקה עצמית

הכנת אתר ההזרקה

1. בחר אזור בצד הימני או השמאלי של הבטן שלך. זה צריך להיות במרחק של לפחות 5 ס"מ מהטבור שלך ולכיוון צדדי הגוף.
- אל תזריק לעצמך בתוך הטווח של 5 ס"מ מהטבור שלך או מסביב לצלקות או חבורות קיימות.
- שנה את המקום בו אתה מזריק בין הצד הימני והשמאלי של הבטן, כתלות לאזור שבו הזרקת בפעם האחרונה.



2. שטוף את ידייך. נקה בעדינות (אל תשפשף) את האזור בו תזריק עם פד אלכוהול או עם סבון ומים.


3. שב או שכב בתנוחה נוחה כדי שתהיה רגוע. ודא שאתה יכול לראות את המקום אליו תזריק. כורסה או מיטה מרופדת עם כריות, תהיינה מתאימות.

הוראות למזרקים עם מנגנון בטיחות

- הכנת אתר ההזרקה:
לפני ביצוע ההזרקה, שטוף וייבש את ידייך. השתמש בכדור צמר גפן לנקות (אל תשפשף) את אזור הנבחר להזרקה.
בחר אזור אחר בבטן עבור כל הזרקה.
- ראשית, כופף את התופסן הצידה בזווית של כ-90 מעלות.
חשוב: אין להסיר את המכסה לפני כיפוף התופסן.



- הסר את מכסה המגן מהמחט.
עשויה להופיע טיפה בקצה המחט. במקרה זה, הסר את הטיפה לפני ההזרקה על ידי הקשה על גוף המזרק (כאשר המחט פונה כלפי מטה).



- ביצוע ההזרקה:
המזרק המוכן לשימוש הינו לשימוש מיידי. בחר אזור בצד ימין או בצד שמאל של הבטן. האזור צריך להיות במרחק של לפחות 5 ס"מ מהטבור שלך והחוצה לכיוון צדדי הגוף. החזק את המזרק כך שהמחט פונה כלפי מטה (בזווית אנכית של 90°), לעובי קפל עור צבוט בין האגודל והאצבע המורה של המשתמש. אחוז את קפל העור לאורך כל ההזרקה.



- אבטחת תופסן המחט:
הנח את התופסן נגד משטח קשה ויציב, בעזרת יד אחת. חשוב: אל תשתמש באצבעות שלך כדי לאבטח את המחט בתופסן. לאחר מכן, לחץ על התופסן מטה.
כופף את התופסן עד שנשמע צליל של "קליק" כאשר המחט נכנסת לחלק של הפלסטיק.



- בסיום ההזרקה
- 1) על מנת למנוע חבורות, אין לשפשף את אתר ההזרקה לאחר שהזרקת לעצמך.
- 2) השלך את המזרק המשומש למכל לעצמים חדים. סגור את מכסה המיכל היטב והנח אותו הרחק מהישג ידם של ילדים. כאשר המכל מלא, השלך אותו לפי הוראות הרופא או הרוקח. השלך כל מוצר רפואי או פסולת אשר אינך עושה בה שימוש בהתאם לדרישות המקומיות.

שינוי בתרופה נוגדת הקרישה

- **שינוי מאנוקספרין לדרקסן למדללי דם שנקראים אנטגוניסטים של ויטמין K (כגון וארפרין)**
הרופא שלך יבקש ממך לבצע בדיקות דם שנקראות INR ובהתאם לכך, יאמר לך מתי להפסיק את זריקות האנוקספרין לדרקסן.
- **שינוי ממדללי דם שנקראים אנטגוניסטים של ויטמין K (כגון וארפרין) לאנוקספרין לדרקסן**
הפסק ליטול את האנטגוניסט של ויטמין K. הרופא שלך יבקש ממך לבצע בדיקות דם שנקראות INR ובהתאם לכך, יאמר לך מתי להתחיל את זריקות האנוקספרין לדרקסן.
- **שינוי מאנוקספרין לדרקסן לטיפול בנוגד קרישה פומי ישיר**
הפסק ליטול אנוקספרין לדרקסן. התחל לקחת את נוגד הקרישה הפומי הישיר 0 עד 2 שעות לפני המועד בו היית אמור לקבל את הזריקה הבאה, לאחר מכן המשך כרגיל.
- **שינוי מטיפול בנוגד קרישה פומי ישיר לאנוקספרין לדרקסן**
הפסק ליטול את נוגד הקרישה הפומי הישיר. אין להתחיל טיפול באנוקספרין לדרקסן לפני שחולפות 12 שעות מהמנה האחרונה של נוגד הקרישה הפומי הישיר.

אם הזרקת בטעות מינון גבוה יותר

אם אתה חושב שהשתמשת ביותר מדי או מעט מדי אנוקספרין לדרקסן, התייעץ מיד עם הרופא, הרוקח או האחיות שלך, גם אם אינך חווה תגובות חריגות. אם בטעות ילד מזריק או בולע את התרופה, קח אותו מיד למיון של בית חולים.

אם אתה שוכח להזריק את התרופה

אם שכחת להזריק אנוקספרין לדרקסן בזמן המיועד, הזרק את המנה ברגע שנזכרת. **אל תזריק מנה כפולה** באותו היום על מנת לפצות על מנה שנשכחה. ניהול יומן יעזור לך לוודא שאתה לא שוכח מנה.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

חשוב להמשיך את הזריקות עד שהרופא שלך יחליט להפסיק אותן. אם תפסיק את הטיפול, אתה עלול לפתח קריש דם שעלול להיות מאוד מסוכן.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא, ברוקח או באחות.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באנוקספרין לדרקסן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

הפסק להשתמש בתרופה ופנה לרופא או לאחות אם יש לך סימנים של תגובה אלרגית חמורה (כגון, פריחה, בעיות בנשימה או בבליעה, נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון, בחלל הפה, בגרון או בעיניים).

הפסק את השימוש בתרופה ופנה מיד לטיפול רפואי אם אתה מבחין באחד או יותר מהתסמינים הבאים:

- פריחה אדומה, קשקשית ומופשטת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלווה בחום. התסמינים בדרך כלל מופיעים בתחילת הטיפול (פוסטולוזיס תיפרחתית ממושטת חדה - acute generalized exanthematous pustulosis).
- כמו בתרופות דומות אחרות שמשמשות להפחתת קרישת דם, אנוקספרין לדקסן עשוי לגרום לדימום. זה עשוי להיות מסכן חיים. במקרים מסוימים, הדימום עלול להיות סמוי.

שוחח עם הרופא מיד אם:

- יש לך דימום שאינו נפסק מעצמו.
- יש לך סימנים של דימום יתר, כגון חולשה רבה, עייפות, חיוורון או סחרחורת, עם כאבי ראש או נפיחות בלתי מוסברת.
- הרופא שלך עשוי להחליט להשאיר אותך תחת השגחה צמודה או לשנות את התרופה שלך.

עליך ליידע את הרופא מיד אם:

- יש לך סימנים של חסימה של כלי דם על ידי קריש דם כגון:
 - כאב של התכווצויות, אדמומיות, חמימות, או נפיחות באחת הרגליים - אלה הם סימנים של פקקת ורידים עמוקים.
 - קוצר נשימה, כאב בחזה, עילפון או שיעול דמי - אלה הם סימנים של תסחיף ריאתי.
- יש לך פריחה כואבת של כתמים אדומים כהים מתחת לעור, שאינם נעלמים כאשר אתה לוחץ עליהם.
- הרופא שלך עשוי לבקש ממך לבצע בדיקת דם כדי לבדוק את ספירת הטסיות שלך.

תופעות לוואי אחרות:

שכיחות מאוד (עשויות להשפיע על יותר מ-1 מתוך 10 אנשים)

- דימום
- עלייה באנזימי הכבד

שכיחות (עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים)

- אתה נחבל בקלות רבה יותר מהרגיל. זה יכול להיות בגלל בעיה בדם עקב ספירת טסיות נמוכה
- כתמים ורודים על עורך. אלו נוטים יותר להופיע באזורים בהם הזרקת אנוקספרין לדקסן
- פריחה בעור (סרפדת, חרלת)
- עור אדום ומגרד
- חבורה או כאב באתר ההזרקה
- ירידה בספירת תאי דם אדומים
- רמת טסיות גבוהה בדם
- כאב ראש

אינן שכיחות (עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים)

- כאב ראש חמור פתאומי. זה יכול להיות סימן של דימום מוחי
- תחושה של רגישות ונפיחות בבטן. ייתכן שיש לך דימום בקיבה
- נגעים גדולים, אדומים, בעלי צורה לא רגילה בעור, עם או ללא שלפוחיות
- גירוי בעור (גירוי מקומי)
- הצהבה של העור או העיניים שלך והשתן שלך הופך להיות כהה יותר. זו יכולה להיות בעיה בכבד

נדירות (עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 אנשים)

- תגובה אלרגית חמורה. הסימנים עשויים לכלול: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
- עלייה באשלגן בדמך. סביר יותר שתקרה אצל אנשים עם בעיות בכליות או עם סוכרת.
- הרופא שלך יוכל לבדוק זאת על ידי ביצוע בדיקת דם.
- עלייה במספר האוזינופילים בדמך. הרופא שלך יוכל לבדוק זאת על ידי ביצוע בדיקת דם.
- איבוד שיער.
- אוסטאופורוזיס (מצב בו קיימת סבירות גבוהה יותר שהעצמות שלך ישברו) לאחר שימוש ארוך טווח.
- עקצוץ, חוסר תחושה וחולשת שרירים (בעיקר בחלק התחתון של הגוף) לאחר שעברת ניקור עמוד שדרה או הרדמה ספינלית.
- אובדן שליטה על הסוגרים (אתה לא יכול לשלוט על הצורך ללכת לשירותים).
- גוש קשה באתר ההזרקה.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או נמשכת יותר ממספר ימים או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. אין לאחסן בטמפרטורה שעולה על 25°C. אין לאחסן במקרר או במקפוא.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם water for injection.

כיצד נראית התרופה ומהו תוכן האריזה:

אנוקספרין לדרקסן היא תמיסה צלולה, מגיעה במזרקים מוכנים לשימוש עם מחט ומגן. כל אריזה מכילה 10 מזרקים. עלון זה אינו מכיל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

בעל הרישום (צרפת) וכתובתו

Venipharm 4, Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud FRANCE

היבואן ובעל הרישום (ישראל) וכתובתו

פארמלוג'יק בע"מ, רח' אימבר 14 פתח תקווה, 49511 מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 170-98-36877-00 לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

עלון זה נערך בינואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

SH108141 PL v1