

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إينوكساپارين ليدراكسين

محلول للحقن

محقنة جاهزة للإستعمال ذات نظام أمان

20 ملغ (2,000 وحدة)/0.2 ملل

40 ملغ (4,000 وحدة)/0.4 ملل

60 ملغ (6,000 وحدة)/0.6 ملل

80 ملغ (8,000 وحدة)/0.8 ملل

100 ملغ (10,000 وحدة)/1 ملل

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل محقنة حسب الترتيب على:

إينوكساپارين صوديوم 20 ملغ، 40 ملغ، 60 ملغ، 80 ملغ، 100 ملغ، حسب الترتيب.

Enoxaparin Sodium 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg, respectively.

المواد غير الفعالة، أنظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

إحتفظ بهذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطه للآخرين. هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

إذا تفاقم عرض جانبي أو إذا ظهر عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

إينوكساپارين ليدراكسين محقنة جاهزة للإستعمال ذات نظام أمان هو عبارة عن مستحضر مشابه حيويًا.

لمعلومات إضافية، يجب التوجه لموقع وزارة الصحة:

[https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx)

[Biosimilars.aspx](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx)

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل هذا الدواء لدى الكبار لـ:

- علاج الخثرات الدموية التي تشكلت في دمك
- إيقاف تشكل خثرات دموية في دمك في الحالات التالية:
 - قبل وبعد عملية جراحية
 - عندما يكون لديك مرض يمنعك من الحركة أو يقيد حركتك لفترة معينة
- إيقاف تشكل خثرات دموية عندما تكون لديك ذبحة صدرية (angina) غير مستقرة (حالة لا يصل فيها ما يكفي من الدم إلى قلبك) أو بعد نوبة قلبية.
- إيقاف تشكل خثرات دموية في أنابيب جهاز الديليزة (يستعمل لدى أشخاص لديهم مشاكل شديدة في الكلية).

الفصيلة العلاجية:

يحتوي الدواء على مادة فعالة تسمى إينوكساپارين صوديوم، التي تنتمي لفصيلة الأدوية المسماة "الهيپارين ذو وزن جزيئي منخفض" أو LMWH.

يعمل الدواء بطريقتين:

1. يمنع خثرات دموية حالية أن تصبح أكبر. ذلك يساعد الجسم على تفكيكها ومنعها من إلحاق الضرر بك.
2. يمنع تشكل خثرات دموية جديدة في دمك.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ :
 - إينوكساپارين صوديوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
 - الهيپارين أو مستحضرات أخرى للهيپارين ذات وزن جزيئي منخفض، مثل نادروپارين، تينزاپارين أو دالتينارين.
- علامات لرد فعل تحسسي تشمل: طفح، صعوبة في البلع أو في التنفس، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان، في تجويف الفم، في الحنجرة أو في العينين.
- كان لديك رد فعل للهيپارين الذي أدى لإنخفاض حاد في عدد الصفيحات الدموية لديك، خلال الـ 100 يوم الأخيرة.
- وجدت لديك أضداد لـ إينوكساپارين في دمك.
- كنت تعاني من نزف في الكبد أو كنت في حالة تنطوي على خطورة زائدة لنزف، مثل قرحة معدية، عملية جراحية في الدماغ أو في العينين في الآونة الأخيرة أو سكتة على خلفية نزف حدثت مؤخراً.
- كنت تستعمل إينوكساپارين لعلاج الخثرات الدموية في جسمك وكنت تخطط في غضون 24 ساعة على إجتياز:
 - بزل (وخز) شوكي أو بزل (وخز) قطني،
 - عملية جراحية تتضمن تخدير فوق الجافية (epidural) أو تخدير شوكي.

لا يجوز استعمال إينوكساپارين ليديراكسين إذا إنطبق عليك أحد ما ذكر أعلاه. تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل الإستعمال، إذا لم تكن واثقاً.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

لا يجوز التبديل بين إينوكساپارين ليديراكسين وبين مستحضرات أخرى تنتمي لفصيلة الهيپارين ذو وزن جزيئي منخفض، مثل نادروپارين، تينزاپارين أو دالتينارين.

سبب ذلك كونها غير متشابهة وليس لديها نفس الفعل ونفس تعليمات الإستعمال.

قبل العلاج بالدواء، أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك ذات مرة رد فعل للهيپارين الذي أدى إلى إنخفاض حاد في عدد الصفيحات الدموية،
- تم تركيب صمام قلب لك،
- وُجد لديك إلتهاب الشغاف (إلتهاب غشاء القلب الداخلي)،
- وُجدت لديك سابقة لقرحة معدية،
- أصبت مؤخراً بسكتة،
- وُجد لديك ضغط دم مرتفع،

- وُجد لديك سكري أو مشاكل في الأوعية الدموية في العينين ناجمة عن السكري (مرض يسمى إعتلال الشبكية السكري)،
 - إجترت مؤخراً عملية جراحية في العينين أو في الدماغ،
 - كنت مسناً (فوق عمر 65 سنة) وخاصة إذا تجاوزت عمر 75 سنة،
 - وُجدت لديك مشاكل في الكلى،
 - وُجدت لديك مشاكل في الكبد،
 - كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة في الوزن،
 - وُجدت لديك نسب مرتفعة للپوتاسيوم في الدم (بالإمكان فحص ذلك في فحص الدم)،
 - كنت تستعمل حالياً أدوية التي تؤثر على النزف (أنظر البند أدناه التداخلات/التفاعلات بين الأدوية)،
 - وُجدت لديك مشكلة في عمودك الفقري أو إجترت عملية جراحية في العمود الفقري.
- إذا إنطبق عليك أحد ما ذكر أعلاه (أو إذا لم تكن واثقاً)، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال إينوكساپارين.
- بالنسبة للمتعالجين الذين يتلقون مقادير دوائية أعلى من 210 ملغ في اليوم، يحتوي هذا الدواء على أكثر من 24 ملغ من الصوديوم (المُرْكَب الأساسي في ملح الطبخ/الطعام) في كل مقدار دوائي. هذه الكمية تعادل 1.2% من الإستهلاك اليومي الأقصى الموصى به من الصوديوم للبالغ.

الفحوص والمتابعة

من الجائز أن تجتاز فحص دم قبل بدء إستعمال هذا الدواء وكذلك بفواصل زمنية معينة خلال فترة إستعماله، وذلك لفحص نسبة خلايا التخثر (الصفائح الدموية) والپوتاسيوم في دمك.

الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين

لم تفحص سلامة ونجاعة إينوكساپارين ليدراكسين لدى الأطفال والمراهقين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:
- وارفارين - دواء لتميع الدم.
 - أسپيرين (يُعرف أيضاً بإسم حمض الأسيتيل ساليسيليك أو ASA)، كلوبيدوجريل أو أدوية أخرى المستعملة لإيقاف تشكل خثرات دموية (أنظر الفقرة 3 - تغيير في دواء مضاد للتخثر)،
 - حقنة ديكستران - تستعمل كبديل للدم،
 - إيبوبروفين، ديكلوفيناك، كيتورولاك أو أدوية أخرى تُعرف كأدوية مضادة للإلتهاب ليست ستيرونيدية التي تستعمل لعلاج الألم والإنتفاخ في إلتهاب المفاصل وحالات أخرى،
 - پريدنيزولون، ديكساميتازون أو أدوية أخرى تستعمل لعلاج الربو، إلتهاب المفاصل الروماتيزمي وحالات أخرى،
 - أدوية ترفع نسب الپوتاسيوم في دمك مثل أملاح الپوتاسيوم، مدرات بولية وأدوية معينة لمشاكل القلب.

العمليات الجراحية والتخدير

أخبر طبيبك أنك تستعمل إينوكساپارين ليدراكسين، وذلك إذا كنت مقدماً على إجراء بزل شوكي أو بزل قطني أو عملية جراحية تستلزم التخدير فوق الجافية (epidural) أو تخدير شوكي.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء. إذا كنت حاملاً ووجد لديك صمام قلبي إصطناعي، فقد تكوني معرضة لخطورة زائدة لتطويع خثرات دموية. سيتحدث طبيبك معك بهذا الشأن. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، فعليك إستشارة الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يؤثر إينوكساپارين ليدراكسين على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات. من المهم تدوين إسم الدواء ورقم دفعة المستحضر الذي تستعمله من قبل الطاقم الطبي الخاص بك.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
- عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
- أثناء تواجدك في المستشفى، عادة يعطى لك الدواء من قبل الطبيب أو الممرضة، نظراً لأنه يُعطى عن طريق الحقن.
- عند وصولك إلى البيت من الجائر أن تحتاج مواصلة حقن إينوكساپارين ليدراكسين بنفسك (أنظر تعليمات الحقن أدناه).
- يُعطى إينوكساپارين ليدراكسين عادة بالحقن تحت الجلد.
- بالإمكان إعطاء إينوكساپارين ليدراكسين بالحقن في الوريد (عن طريق الوريد) بعد أنواع معينة من النوبات القلبية أو العمليات الجراحية.
- بالإمكان إضافة هذا الدواء للأنبوبة الخارجة من الجسم (خط شرياني) في بداية علاج الديلزة.
- لا يجوز حقن إينوكساپارين ليدراكسين لداخل العضل.

المقدار الدوائي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يتعلق المقدار الدوائي للدواء بالسبب الذي من أجله يتم إستعماله. إذا وُجدت لديك مشاكل في الكلى، فمن الجائر أن تحتاج مقداراً دوائياً أخفض من الدواء. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

الحقن الذاتي لـ إينوكساپارين ليدراكسين

إذا كنت قادراً على حقن الدواء بشكل ذاتي، سيريك كل من الطبيب أو الممرضة الخاصة بك كيفية فعل ذلك. لا تحاول الحقن لنفسك إذا لم تتلقى إرشاداً حول كيفية فعل ذلك. توجه فوراً إلى الطبيب أو الممرضة الخاصة بك، إذا لم تكن واثقاً ما عليك فعله. إن إعطاء الحقنة بالشكل الصحيح تحت الجلد يساعد على تقليل الألم والكدمات في موقع الحقن.

قبل الحقن

- حضر الأغراض التي أنت بحاجة إليها: محقنة، ضماد كحولي أو صابون وماء، ووعاء للأشياء الحادة.
- إفحص تاريخ إنقضاء الصلاحية على ظهر الدواء. لا يجوز الإستعمال إذا إنقضى التاريخ.
- إفحص عدم تضرر المحقنة وأن الدواء بداخلها هو محلول رائق. إذا لم يكن كذلك، إستعمل محقنة أخرى من الدواء.
- تأكد من كونك تعرف كم يتوجب عليك حقنه.
- إفحص بطنك لرؤية فيما إذا سببت الحقنة الأخيرة أي إحمرار، تغير في لون الجلد، إنتفاخ، إفراز من الجلد، أو إذا ما زال هنالك شعور بالألم. إذا حصل ذلك، تحدث مع الطبيب أو الممرضة الخاصة بك.

تعليمات للحقن الذاتي

تحضير موقع الحقن


1. اختر منطقة في الجانب الأيمن أو الأيسر لبطنك. يجب أن تكون على بعد 5 سم على الأقل من سرتك وبتجاه جانبي الجسم.
- لا تحقن لنفسك داخل نطاق 5 سم من سرتك أو من حول ندبات أو كدمات حالية.
- قم بتغيير مكان الحقن بين الجانب الأيمن والأيسر للبطن، كأمر يتعلق بالمنطقة التي حققت فيها في المرة السابقة.




2. اغسل يديك. نظف بلطف (لا تفرك) منطقة الحقن بواسطة ضماد كحولي أو بالصابون والماء.
3. اجلس أو استلق بوضعية مريحة بحيث تكون هادئاً. تأكد من إمكانية رؤيتك للمكان الذي يجب أن تحقن به. سيكون من المناسب استعمال كرسي أو سرير منجد بوسائد.

تعليمات بخصوص المحاقن ذات نظام أمان

- تحضير موقع الحقن:
- قبل إجراء الحقن، اغسل وجفف يديك. إستعمل كرة قطنية لتنظيف (لا تفرك) المنطقة المختارة للحقن. اختر منطقة أخرى في البطن لكل عملية حقن.
- أولاً، قم بثني القابض جانباً بزاوية قدرها حوالي 90 درجة.
- مهم: لا يجوز نزع الغطاء قبل ثني القابض.



- إنزع الغطاء الواقي من الإبرة.
- قد تظهر قطرة في طرف الإبرة. في هذه الحالة، أزل القطرة قبل الحقن عن طريق الطرق على جسم المحقنة (بينما تكون الإبرة متجهة للأسفل).



- إجراء الحقن:
- المحقنة الجاهزة للإستعمال مخصصة للإستعمال الفوري. اختر منطقة في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر من البطن. يجب أن تكون المنطقة على بعد 5 سم على الأقل من سرتك وخارجاً بتجاه جانبي الجسم. أمسك المحقنة بحيث تتجه الإبرة نحو الأسفل (بزاوية عمودية 90°)، إلى سُمك طية جلد مقروص بين إبهام وسبابة المُستعمل. أمسك طية الجلد طوال مدة الحقن.



- تأمين قابض الإبرة:
ضع القابض مقابل سطح صلب ومستقر، بإستعمال يد واحدة. مهم: لا تستعمل أصابعك لتأمين الإبرة في القابض. بعد ذلك، اضغط على القابض للأسفل.
قم بثني القابض حتى تسمع صوت "نقرة" عندما تدخل الإبرة في الجزء البلاستيكي.



- في نهاية الحقن
1) لمنع حدوث كدمات، لا يجوز فرك موقع الحقن بعد أن تحقن لنفسك.
2) ألق المحقنة المستعملة لوعاء الأشياء الحادة. أغلق غطاء الوعاء جيداً وضعه بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
عندما يمتلئ الوعاء، ألقه وفق تعليمات الطبيب أو الصيدلي. ألق أي منتج طبي أو نفايات ليست قيد إستعمالك بموجب المتطلبات المحلية.

تغيير في دواء مضاد للتخثر

- **التغيير من إينوكساپارين ليدراكسين لمميعات دم تسمى مضادات فيتامين K (مثل وارفارين)**
سوف يطلب منك طبيبك إجراء فحوص دم تسمى INR ووفقاً لذلك، سيُخبرك متى عليك التوقف عن حقن إينوكساپارين ليدراكسين.
- **التغيير من مميعة دم تسمى مضادات فيتامين K (مثل وارفارين) لـ إينوكساپارين ليدراكسين**
توقف عن تناول مضادات فيتامين K. سيطلب منك طبيبك إجراء فحوص دم تسمى INR ووفقاً لذلك، سيُخبرك متى عليك البدء في حقن إينوكساپارين ليدراكسين.
- **التغيير من إينوكساپارين ليدراكسين للعلاج بمضاد تخثر فموي مباشر**
توقف عن إستعمال إينوكساپارين ليدراكسين. إبدأ تناول مضاد التخثر الفموي المباشر 0 حتى 2 ساعة قبل الموعد الذي من المفترض أن تتلقى فيه الحقنة القادمة، وبعد ذلك إستمر كالمعتاد.
- **التغيير من علاج بمضاد تخثر فموي مباشر لـ إينوكساپارين ليدراكسين**
توقف عن تناول مضاد التخثر الفموي المباشر. لا تبدأ العلاج بـ إينوكساپارين ليدراكسين قبل مرور 12 ساعة من المقدار الدوائي الأخير من مضاد التخثر الفموي المباشر.

إذا حقنت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا كنت تظن بأنك إستعملت أكثر أو أقل مما ينبغي من إينوكساپارين ليدراكسين، إستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة الخاصة بك فوراً، حتى وإن كنت لا تقاسي من أعراض شاذة. إذا حقن طفل أو بلع بالخطأ من الدواء، خذه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.

إذا نسيت حقن الدواء

إذا نسيت حقن إينوكساپارين ليدراكسين في الوقت المحدد، إحقن المقدار الدوائي حال تذكرك.

لا تحقق مقداراً دوائياً مضاعفاً في نفس اليوم لتعويض المقدار الدوائي المنسي. إن التسجيل في المذكرة اليومية سوف يساعدك في التأكد من عدم نسيانك لمقدار دوائي.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

من المهم مواصلة الحقن إلى أن يقرر طبيبك بوقفها. إذا توقفت عن العلاج، فقد تطوّر خثرة دموية والتي قد تكون خطيرة جداً.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال إينوكساپارين ليديراكسين قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة

توقف عن استعمال الدواء وتوجه إلى الطبيب أو إلى الممرضة إذا وجدت لديك علامات لرد فعل تحسسي خطير (مثل، طفح، مشاكل في التنفس أو في البلع، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان، في تجويف الفم، في الحنجرة أو في العينين).

توقف عن استعمال الدواء وتوجه فوراً لتلقي علاج طبي إذا لاحظت واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- طفح أحمر، حشفي ومنتشر مع نتوءات تحت الجلد وحوصلات مصحوبة بسخونة. تظهر الأعراض عادة في بداية العلاج (بثار طفحي حاد معم - acute generalized exanthematous pustulosis).
- كما هو الحال مع أدوية أخرى شبيهة المستعملة لتقليل تخثر الدم، فإن إينوكساپارين ليديراكسين من شأنه أن يسبب نزف. قد يشكل هذا خطراً على الحياة. في حالات معينة، قد يكون النزف كامناً.

تحدث فوراً مع الطبيب إذا:

- وُجد لديك نزف لا يتوقف من تلقاء نفسه.
 - وُجدت لديك علامات لنزف مفرط، مثل ضعف شديد، إرهاق، شحوب أو دوام، تترافق بصداع أو إنتفاخ مجهول السبب.
- من شأن طبيبك أن يقرر إبقائك تحت المراقبة الحثيثة أو تغيير دوائك.

عليك إبلاغ الطبيب فوراً إذا:

- وُجدت لديك علامات لإنسداد الأوعية الدموية من قِبل خثرة دموية مثل:
 - ألم تشنجي، إحمرار، الشعور بدفء، أو إنتفاخ بإحدى رجليك - هذه علامات لختار الأوردة العميقة.
 - ضيق التنفس، ألم في الصدر، إغماء أو سعال دموي - هذه علامات لإنصمام رئوي.
- وُجد لديك طفح مؤلم ليقع حمراء داكنة تحت الجلد، التي لا تزول عندما تضغط عليها.
- من شأن طبيبك أن يطلب منك إجراء فحص دم لفحص تعداد الصفيحات الدموية لديك.

أعراض جانبية أخرى:

شائعة جداً (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص)

- نزف
- ارتفاع في إنزيمات الكبد

شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص)

- تصاب برض بسهولة أكثر من المعتاد. يمكن أن يكون هذا نتيجة مشكلة في الدم جراء إنخفاض تعداد الصفيحات الدموية
- بقع وردية على جلدك. من المرجح أن تظهر هذه في المناطق التي حقنت فيها إينوكساپارين ليديراكسين
- طفح جلدي (شرى، urticaria)
- جلد أحمر وحاك
- كدمة أو ألم في موقع الحقن
- إنخفاض في تعداد خلايا الدم الحمراء
- ارتفاع نسبة الصفيحات الدموية في الدم
- صداع

غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص)

- صداع شديد مفاجئ. قد يكون هذا علامة لنزف في الدماغ
- شعور بحساسية و إنتفاخ في بطنك. من الجائز أن لديك نزف في المعدة
- آفات كبيرة، حمراء، ذات شكل غير عادي في الجلد، مع أو بدون حويصلات
- تهيج في الجلد (تهيج موضعي)
- إصفرار جلدك أو عينيك ويصبح بولك داكناً أكثر. يمكن أن يكون هذا مشكلة في الكبد

نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص)

- رد فعل تحسسي خطير. العلامات قد تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ في الشفتين، في الوجه، في الحنجرة أو في اللسان.
- ارتفاع البوتاسيوم في دمك. من المرجح أكثر أن تحدث لدى أشخاص يعانون من مشاكل في الكلى أو من السكري. يستطيع طبيبك فحص ذلك عن طريق إجراء فحص دم.
- ارتفاع عدد الحمضات في دمك. يستطيع طبيبك فحص ذلك عن طريق إجراء فحص دم.
- فقدان الشعر.
- هشاشة العظام (حالة تزداد فيها احتمالية تعرض عظامك للكسر بشكل أكبر) بعد إستعمال طويل المدى.
- وخز، خدر وضعف عضلي (خاصة في الجزء السفلي من الجسم) بعد اجتيازك لبزل شوكي أو تخدير شوكي.
- فقدان السيطرة على المصبرات (لا يمكنك التحكم في الحاجة للذهاب إلى الحمام).
- كتلة صلبة في موقع الحقن.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو إستمرت لأكثر من بضعة أيام أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. لا يجوز التخزين في البراد أو في المُجمدة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمُركَّب الفعال أيضاً على water for injection.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

إينوكساپارين ليدراكسين هو محلول رائق، يتوفر ضمن محاقن جاهزة للإستعمال مع إبرة وواقى.

تحتوي كل علبة على 10 محاقن.

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفرت لديك أية أسئلة أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ماء، الرجاء راجع الطبيب.

صاحب الإمتياز (فرنسا) وعنوانه

Venipharm 4, Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud FRANCE

المستورد وصاحب الإمتياز (إسرائيل) وعنوانه

فارمالوجيك م.ض.، شارع إيمير 14 بيتاح تيكفا، 49511

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 170-98-36877-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعداد هذه النشرة في كانون الثاني 2024 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

SH108141 PL v1