

АГИСТЕН™ ПАСТА

Клотримазол (Clotrimazole) 1% W/W

Неактивные и аллергенные вещества в препарате - См. пункт 2 "Важная информация о некоторых компонентах препарата" и пункт 6 "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Правильно примените препарат. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки болезни (симптомы) ухудшаются или не улажаются через 7 дней.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Для лечения нательстных и кожных инфекций, вызванных штаммами грибов, чувствительными к клотримазолу.

Терапевтическая группа: Противогрибковые средства из группы имидазолов.

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА:

Не применяйте препарат:

- Если у Вас или у Вашего ребенка повышенная чувствительность (аллергия) к активному веществу или к любому другому ингредиенту, содержащемуся в препарате.
- Для лечения инфекций кожи головы или ногтей.

Особые предостережения относительно применения препарата:

- Как и другие препараты, Агистен Паста может снизить эффективность контрацептивных средств, изготовленных из резины, таких как презерватив или диафрагма. Поэтому, если препарат предназначен для применения на половых органах, используйте альтернативные средства контрацепции в течение хотя бы пяти дней после применения данного лекарства.
- Не применяйте данный препарат часто или продолжительный период времени без консультации врача..
- Не применяйте на открытых ранах.
- Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. В случае контакта с глазами или ртом следует тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

Перед применением Агистен Паста сообщите врачу, если:

- Вы не уверены, что Вы или Ваш ребенок страдаете грибковой инфекцией.
- У пациента повышенная чувствительность к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам.

Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Беременность и кормление грудью:

Если Вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед применением препарата и следуйте их инструкциям. Этот препарат можно использовать во время беременности, но только под наблюдением врача.

Этот препарат можно использовать во время грудного вскармливания, но перед кормлением грудью необходимо промыть область сосков, если этот препарат используется в области сосков.

Фертильность:

Нет данных, указывающих на проблемы с фертильностью в связи с использованием препарата.

Воздействие транспортных средств и управление механизмами:

Агистен Паста не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами, либо его действие незначительно.

Важная информация о некоторых компонентах препарата:

Агистен Паста содержит бутилгидрокситолуен (butylhydroxytoluene), шерстяной жир (wool fat), которые могут вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

Также продукт содержит пропилпарабен, который может вызывать аллергические реакции (возможны реакции замедленного типа).

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы не уверены относительно дозировки и режима лечения препаратом.

Если препарат был выписан для Вас врачом, следуйте его указаниям. Если Вы приобрели препарат без рецепта, тщательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Обычно **принятая дозировка:** смазывание пораженного участка 2-3 раза в день.

Способ применения:

Нанесите равномерно тонкий слой пасты на чистую, сухую и проветриваемую кожу и вотрите его в кожу легкими массирующими движениями. Обычно достаточно небольшого количества дистирума в ½ см пасты для покрытия участка размером с ладонь.

Продолжительность лечения зависит от вида инфекции. Обычно необходимо применять хотя бы 2 недели, но возможно, что для лечения потребуются 4 недели.

В случае инфекции стопы желателен также использование противогрибковый порошок. Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом для получения рекомендации определенного средства.

Симптомы кожной инфекции, такие как зуд или болезненность, должны улучшиться через несколько дней лечения. Однако такие признаки, как покраснение и шелушение кожи, могут исчезнуть через более

продолжительное время. Если симптомы продолжатся, посоветуйтесь с врачом.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Только для наружного применения.

Не заносите лекарство в рот и не глотайте его.

Если ребенок или кто-то другой случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли применить препарат в требуемое время, примените его как можно скорее и продолжите лечение как обычно.

Как Вы можете способствовать успешному лечению?

- Несмотря на то, что пораженный участок чешется, не следует его расчесывать. Расчесывание нанесет вред поверхности кожи и таким образом приведет к распространению инфекции.
- Содержите пораженный участок в чистоте.
- Тщательно высушивайте пораженный участок, но избегайте чрезмерного трения.
- Влажность способствует размножению грибов, поэтому необходимо содержать пораженный участок сухим, но избегайте излишнего натирания.
- Мойте пораженный участок и высушивайте его перед каждым нанесением препарата. В промежутках между процедурами можно пользоваться противогрибковым порошком для подсушивания.
- Не делитесь с другими людьми полотенцами, ковриками для ванной и т. д., поскольку инфекция может им передаваться.
- Обязательно мойте руки после лечения инфекции, чтобы предотвратить ее распространение.
- При лечении ног -
 - Обязательно тщательно высушивайте кожу, особенно между пальцами.
 - Тщательно стирайте носки, нейлоновые носки и колготки в горячей воде, чтобы удалить всю отшелушившуюся кожу или споры грибов.
 - По возможности меняйте обувь каждый день.

Не принимайте препараты в ванне! Проверьте этикетку и дозу каждый раз перед применением препарата. При необходимости пользоваться очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

Как и при лечении любым другим лекарством, применение Агистен Пасты может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Как и любое другое лекарство, препарат может вызывать аллергию у некоторых людей. Если у Вас или у Вашего ребенка есть аллергия, реакция появится вскоре после начала приема препарата. Если у Вас или у Вашего ребенка возникнет аллергическая реакция, прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение ближайшей больницы. Признаки аллергической реакции могут включать:

- сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, лица, горла или языка, слабость, головокружение или обморок, тошноту.
- После применения препарата Вы можете почувствовать:
- зуд, сыпь, волдыри, ощущение жжения, дискомфорт, отек, раздражение, онемение, покраснение или шелушение кожи.

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или зайдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, Вы можете сообщить в компанию по следующему адресу: www.Padagis.co.il

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке/тюбике.
Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Храните при температуре ниже 25°C.
- После первого открывания можно пользоваться в течение 6 месяцев.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит: Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, titanium dioxide, heavy liquid paraffin, dimethicone, squalane, propyl parahydroxybenzoate, butyl hydroxy toluene.

• Как выглядит лекарство и что находится в упаковке:
Алюминиевый тюбик, содержит 30 граммов пасты белого цвета.

Производитель и владелец лицензии: Падагис Израиль Фармацевтика ЛТД, ул. Ракефет 1, Шохам.

Открыто зарегистрировано в июле 2024, в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения: 147-39-33586

07.2024

30203172

SH109332PL v1