



## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג תמיסה להזרקה במזרק אוטומטי**

#### **חומר פעיל**

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג** מכיל מנה אחת של אפינפרין (Epinephrine) 0.3 מ"ג/ג 0.3 מ"ל (1 מ"ג/ג"מ"ל) בתמיסה סטרילית.

**אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג** מכיל מנה אחת של אפינפרין (Epinephrine) 0.15 מ"ג/ג 0.3 מ"ל (0.5 מ"ג/ג"מ"ל) בתמיסה סטרילית.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. כל מי שעשוי לתת לך את התרופה, צריך לדעת כיצד להשתמש בה לפני שתהיה לך תגובה אלרגית חריפה (אנפילקסיס).

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג** מיועדים לטיפול חירום בתגובות אלרגיות חמורות (סוג 1), לרבות אנפילקסיס לחרקים עוקצים (לדוגמה, סדרת הדבוראים, הכוללת דבורים, צרעות, צרעה מזרחית, yellow jackets ונמלי אש) ולחרקים נושכים (לדוגמה, פשפש מוצץ דם, יתושים), לטיפול אימונותרפי באלרגנים, למזון, לתרופות, לחומרים בבדיקות אבחון (לדוגמה, חומרי ניגוד בבדיקות רדיוגרפיה) ולאחרגנים אחרים, וכן לטיפול באנפילקסיס מסיבה לא ידועה (אידיופתית) או באנפילקסיס מפעילות גופנית.

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג** למתן מיידית במטופלים שנקבע כי הם מצויים בסיכון מוגבר לאנפילקסיס, לרבות אנשים עם היסטוריה של תגובות אנפילקטיות.

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג** למתן מיידית כטיפול תומך בחירום בלבד ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי מיידית.

**קבוצה תרפויטית:** אפינפרין שייך לחומרים הפועלים באמצעות קולטנים אדרנרגיים ודופמינרגיים.

אנפילקסיס עלול להתרחש תוך דקות ולהוות סכנת חיים. אם אינו מטופל, אנפילקסיס יכול להוביל למוות. תסמינים של אנפילקסיס יכולים לכלול:

- קשיי נשימה ● צפצופים ● צרידות (הקול נשמע שונה) ● סרפדת (פריחה אדומה מורמת שעלולה לגרד)
- גרד חמור ● נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה או בגרון ● פריחה בעור, אדמומיות או נפיחות ● דופק מהיר
- דופק חלש ● תחושת חרדה חריפה ● בלבול ● כאב בטן ● איבוד שליטה על מתן שתן או על פעולות מעיים
- שלשול או התכווציות בטן ● סחרחורת, התעלפות או איבוד הכרה.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**יש לשאת איתך תמיד 2 מזרקי אפינפרין**, מאחר שלפעמים מנה אחת של אפינפרין אינה מספיקה לטיפול בתגובה אלרגית חמורה, לפני פנייה לעזרה רפואית. אתה צריך לשאת איתך תמיד 2 מזרקי אפינפרין, גם למקרה שהמזרק האוטומטי הראשון הופעל לפני מתן המנה. לא ניתן להשתמש במזרק שהופעל בטעות במצב חירום אלרגי (אנפילקסיס).

ייתכן שלא תדע מתי אירוע אנפילקטי עלול לקרות. שוחח עם הרופא אם אתה זקוק לאריזות נוספות כדי לשמור בעבודה, בבית ספר או במקומות אחרים. אם השתמשת במזרק אחד לטיפול בתגובה אלרגית חמורה, יש להחליפו כך שתמיד תישא איתך 2 מזרקי אפינפרין.

ספר למשפחה, למי שמטפל בך ולאחרים היכן המזרקים מאוחסנים. ודא שהם יודעים כיצד להשתמש במזרק לפני שתצטרך אותו. במקרה של אירוע אנפילקטי, אתה עלול להיות במצב שבו לא תהיה מסוגל לדבר.

כדי למנוע החמרת המצב, אם נחשפת לאחד הגורמים שתוארו בהתוויה או שהופיעו אצלך סימנים ו/או תסמינים:

- יש להשתמש באפינפרין זריקה מיילן מייד כשמתפתחת תגובה אלרגית חמורה (אנפילקסיס).
  - יש לפנות מייד לקבלת טיפול חירום רפואי, גם אם השתמשת במזרק אפינפרין.
- אתה יכול להשתמש באפינפרין זריקה מיילן שני אם התסמינים נמשכים או חוזרים, או אם המזרק האוטומטי הראשון הופעל לפני מתן המנה. מסיבה זו, עליך לשאת איתך 2 מזרקים בכל עת. אם אתה זקוק ליותר מ-2 מנות עבור אותו אירוע אלרגיה, רק רופא יכול לתת מנות נוספות של אפינפרין.
- במידת הצורך הזרק דרך הבגדים.

במצבים של סכנת חיים אין התוויות נגד לשימוש באפינפרין זריקה מיילן.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

ספר לרופא לפני השימוש באפינפרין זריקה מיילן על מצבך הבריאותי. ייתכן שהרופא ייתן לך הנחיות נוספות לגבי מתי וכיצד להשתמש בתרופה אם יש לך:

- בעיות לב או לחץ דם גבוה
- סוכרת
- בעיות בבלוטת התריס
- אסתמה
- היסטוריה של דיכאון
- מחלת פרקינסון
- אם אתה קשיש

ילדים ומתבגרים

לא ידוע אם אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג"י.אר 0.15 מ"ג בטוחים ויעילים עבור ילדים השוקלים פחות מ-15 ק"ג.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- טיפול לאסתמה
- תרופות טריציקליות ומעכבי מונואמין אוקסידאז נגד דיכאון, לבותירוקסין. ההשפעה של אפינפרין עלולה להתגבר בנטילה בו-זמנית.
- אנטיהיסטמינים (נגד אלרגיה) מסוימים, בעיקר כלורפניראמין, טריפלנאמין, דיפנהידראמין. ההשפעה של אפינפרין עלולה להתגבר בנטילה בו-זמנית.
- חוסמי בטא אדרנרגיים, כגון פרופרנולול, ההשפעות של אפינפרין על עירור הלב והרחבת הסמפונות מדוכאות בנטילה בו-זמנית.
- חוסמי אלפא אדרנרגיים, כגון פנטולאמין, ההשפעות של אפינפרין על כיווץ כלי דם ויתר לחץ דם מדוכאות בנטילה בו-זמנית.
- נגזרות של ארגוט לטיפול במיגרנה, נטילה בו זמנית עלולה לפגוע בהשפעת אפינפרין.
- גליקוזידים של הלב כמו דיגיטליס, משתנים או תרופות להסדרת קצב לב, נטילה בו-זמנית עלולה לגרום להפרעות בקצב הלב. יש לעקוב אחר חולים אלו בקפידה.

בעת אירוע אנפילקטי השתמש באפינפרין זריקה מיילן לטיפול כפי שרשם לך הרופא מבלי להתחשב במצבך הבריאותי או בתרופות שבהן אתה משתמש.

היריון והנקה

יש להשתמש באפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג בהיריון ובהנקה על פי אותם שיקולים – טיפול הבחירה במקרה של הלבם אנפילקטי.  
אם את בהיריון או שאת מתכננת היריון, התייעצי עם הרופא כיצד לנהוג במקרה הצורך. לא ידוע אם אפינפרין מזיק לעובר.  
אם את מניקה או מתכננת להניק, התייעצי עם הרופא לפני השימוש באפינפרין. לא ידוע אם אפינפרין עובר לחלב אם.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה sodium metabisulfite, אשר לעיתים נדירות עלול לגרום לתגובות רגישות יתר חמורות ועווית סמפונות. תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג הם מזרקים אוטומטיים, חד פעמיים, מוכנים להזרקה עצמית מיידית לתוך השריר. אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג מיועדים לשימוש מיידית עזמי או באמצעות משפחה/מטפל.**

עליך להבין את הסיבה שבגללה נרשמה לך התרופה, ולהיות בטוח שאתה מבין איך ומתי להשתמש בה. מומלץ שגם בן משפחה/מטפל/מורה יודרכו באופן השימוש בתרופה. אם נעקצת על ידי חרק, נסה להוציא את העוקץ באצבעותיך. שים לב לא ללחוץ, לצבוט או לדחוף את העוקץ פנימה לעור. אם אפשרי, הנח קרח על אזור העקיצה. שמור על חום הגוף והימנע מפעילות גופנית. בתגובה אלרגית שנגרמה על ידי מזון, דאג להוציא מהפה מייד את כל שאריות המזון.

**המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד, מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:** זריקה אחת של אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג מספקת מנה של 0.3 מ"ג אפינפרין (0.3 מ"ל) המתאימה לחולים השוקלים 30 ק"ג ויותר.

זריקה אחת של אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג מספקת מנה של 0.15 מ"ג אפינפרין (0.3 מ"ל) המתאימה לילדים השוקלים 15-30 ק"ג.

**אין לעבור על המנה המומלצת אלא אם התסמינים של ההלם האנפילקטי ממשיכים או חוזרים. במקרה כזה ייתכן שתזדקק להשתמש במזרק נוסף. לעיתים, זריקה אחת איננה מספיקה כדי לשחרר אותך מהתסמינים של האירוע האנפילקטי. מסיבה זו הרופא עשוי לתת לך מרשם ליותר ממזרק אחד. אם התסמינים לא השתפרו או שישנה החמרה תוך 5-15 דקות אחרי הזריקה הראשונה, עליך, או מי שנמצא איתך, להזריק לך זריקה שנייה. מסיבה זו עליך לשאת איתך בכל זמן יותר ממזרק אחד. אם אתה זקוק ליותר משני מזרקים באירוע אנפילקטי אחד, רק הרופא יחליט על חיוניות מנות נוספות של אפינפרין.**

#### שים לב:

- אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג מיועדים להזרקה למרכז הצד החיצוני של הירך **בלבד**.
- אין להזריק לווריד או לעכוז, לאצבעות הידיים והרגליים, כפות ידיים או רגליים.
- אם הזרקה בטעות במקום אחר בגוף, גש מייד לחדר המיון הקרוב. הראה לרופא היכן בגוף הזרקה בטעות את הזריקה.
- לא ידוע אם אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג בטוחים ויעילים בילדים השוקלים פחות מ-15 ק"ג.
- כל מזרק מכיל מנה אחת של אפינפרין.
- אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג מיועדים להזרקה עצמית מיידית (לבד או באמצעות מטפל/בן משפחה).

#### במקרה של אירוע אנפילקטי

- השתמש במזרק מייד. ניתן להשתמש בזריקה גם דרך הבגדים.
- פנה מייד לקבלת טיפול חירום רפואי. ייתכן שתזדקק להמשך השגחה רפואית.

#### הוראות לשמירת המזרק

- הכר את חלקי המזרק (ראה איור מצורף).
- שמור על המזרק מוכן לשימוש ונגיש בכל עת.
- אסור לפרק את חלקי המזרק.
- מנע חשיפה לאור וחום גבוה (ראה בסעיף 5 "תנאי אחסון").
- אין להסיר את מכסה הביטחון הכחול אלא לפני השימוש.
- עליך לבחון תקופתית את צבע התמיסה בחלון. אין להשתמש במזרק שהתמיסה בו שינתה את צבעה או שנוצר בה משקע.



### הוראות הזרקה

הזרקת התכשיר דורשת שלושה שלבים: הכנת המזרק, הזרקה, קבלת עזרה רפואית.

#### שלב 1: הוצאת המזרק מתוך נרתיק הפלסטיק

1. פתח את המכסה הצהוב של נרתיק הפלסטיק של אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג או את המכסה הירוק של נרתיק הפלסטיק של אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג. (איור מס' 1)
2. הוצא את המזרק על ידי הטיה והחלקת המזרק מתוך נרתיק הפלסטיק. (איור מס' 2)
3. אחוז במזרק בכף היד (כף היד כרוכה מסביב למזרק כמו אגרוף) כאשר הקצה הכתום מופנה כלפי מטה. ביד השנייה משוך ישר וכלפי מעלה ושחרר את מכסה הביטחון הכחול מבלי לכופפו או לעקמו. (איור מס' 3)



#### שים לב:


- אין להסיר את מכסה הביטחון הכחול באמצעות האגודל או על ידי משיכתו לצדדים. אין לכופף או לעקם את מכסה הביטחון הכחול. אם לא מוציאים את מכסה הביטחון הכחול בצורה נכונה (ישר וכלפי מעלה), עלולה להיגרם הפעלה בשוגג. לא ניתן להשתמש במזרק שהופעל בשוגג במצב חירום. אם זה קורה, יש להחליף במזרק חדש.
- המחט יוצאת מהקצה הכתום.
- אין להניח את האצבעות או היד מעל הקצה הכתום, כדי למנוע הזרקה בשוגג. אם הזרקת לעצמך בשוגג, יש לפנות מייד לבית חולים לקבלת עזרה.

#### שלב 2: הזרקה

אם אתה מזריק לילד צעיר, אחוז בחוזקה ברגלו כך שהרגל לא תזוז בעת ההזרקה כדי למנוע פציעות בעת ההזרקה.

1. מקם את הקצה הכתום של המזרק כנגד אמצע הירך, בצידה החיצוני של הירך בזווית ישרה (אנכית לירך)
2. תוך כדי תנופה הצמד את המזרק ודחוף אותו בחוזקה לירך החיצונית עד השמעת "קליק", "הקליק" הוא סימן לכך שההזרקה החלה. (איור מס' 4)

3. החזק את המזרק יציב וצמוד לירך **במשך 3 שניות** (ספור לאט 1,2,3) ההזרקה הסתיימה. (איור מס' 5) **שים לב:** אם לא תחזיק את המזרק במקום מספיק זמן, ייתכן שהמזרק לא יספק את המינון הנכון של התרופה.
4. הורד את המזרק מהירך. מכסה המזרק הכתום יתארך וכסה את המחט, אם המחט עדיין גלויה, אל תנסה להשתמש במזרק שנית. (איור מס' 6)
5. עסה את מקום ההזרקה במשך 10 שניות. (איור מס' 7)



### שלב 3: גש מייד לבית החולים הקרוב ביותר

- אתה עלול להזדקק לטיפול רפואי נוסף. ייתכן שתצטרך להשתמש במזרק השני אם התסמינים ממשיכים או חוזרים.
- קח את המזרק/מזרקים שהשתמשת בהם לבית החולים ועדכן את הרופא כי קיבלת זריקת אפינפריין לירך. הראה לו את מקום ההזרקה.
- מסור את המזרק המשומש לרופא לביקורת, ולהשמדתו הנאותה של המזרק.

### שים לב:

- המזרק המשמש עם המחט המכוסה ארוך יותר לאחר השימוש ואינו מתאים יותר לאריזת הפלסטיק.
- המזרק האוטומטי משחרר מנה מדודה של אפינפריין ולא ניתן להשתמש בו שוב. אל תנסה להשתמש במזרק שנעשה בו שימוש.
- מרבית נוזל הזריקה נשאר בתוך המזרק ולא ניתן להשתמש בו שנית. אולם, ההזרקה מספקת לך את המנה הנדרשת אם המכסה הכתום התארך ומסתיר את המחט, והחלון מוסתר.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באפינפריין זריקה מיילן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

#### תופעות לוואי קרדיוסקולריות (לב וכלי דם)

- הפרעות קצב (דופק לב מהיר, לא סדיר, הלמות לב), כולל פרפור חדרים הגורם למוות, במיוחד במטופלים עם מחלת לב קיימת או אלה המקבלים תרופות מסוימות.
- עליות מהירות בלחץ הדם גרמו לדימום מוחי, במיוחד במטופלים קשישים עם מחלות לב וכלי דם.
- תעוקת חזה עלולה להתרחש במטופלים עם מחלת עורקים כליליים.
- מחלת שריר הלב עקב נפשית חמורה ("תסמונת הלב השבור") במטופלים שטופלו באפינפריין (נדיר).

#### תופעות לוואי הנגרמות מהזרקה בשוגג או מטכניקת הזרקה לא נכונה

- הזרקה בשוגג לאצבעות, לכפות הידיים או הרגליים עלולה לגרום לאיבוד זרימת הדם לאזור המושפע.
- תגובות שליליות המופיעות כתוצאה מהזרקות בשוגג יכולות לכלול עלייה בקצב הלב, תגובות מקומיות הכוללות חיורון, תחושת קור ורגישות מופחתת במקום ההזרקה, או פגיעה במקום ההזרקה הגורמת לחבורות, דימום, שינוי צבע העור, אריתמה (אדמומיות בעור) או פגיעה בשלד.

- הזרקה לעכוז גרמה למקרים של נמק גזי.
- חתכים על העור, מחטים מכופפות ומחטים שנשארו בעור אחרי ההזרקה יכולים לקרות כשילדים בועטים או זזים בעת ההזרקה.

#### זיהומים בעור וברקמות רכות

לעיתים נדירות מטופלים שהשתמשו באפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר.0.15 מ"ג פיתחו זיהום במקום ההזרקה תוך מספר ימים לאחר ההזרקה. חלק מהזיהומים הללו עלולים להיות חמורים.

**פנה מייד לרופא אם אחת מהתופעות הבאות התפתחה אצלך במקום ההזרקה:**

- אדמומיות שלא נעלמת
- נפיחות
- רגישות
- המקום מרגיש חם למגע

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- הזעה • כאב ראש • חולשה • רעד • חיוורון • התרגשות יתר, עצבנות, חרדה, אי שקט • סחרחורת • בחילה או הקאה • בעיות בנשימה
- תופעות הלוואי עשויות להיעלם במנוחה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסן מתחת ל-25°C. אין לאחסן במקרר. יש להגן מפני אור. יש לשמור תמיד את המזרק בנרתיק הפלסטיק, כדי להגן על המזרק. שים לב, הנרתיק איננו אטום למים.
- בדוק תקופתית את צבע התמיסה בחלון השקוף של המזרק. התמיסה צריכה להיות צלולה. אם התמיסה שינתה את צבעה (ורוד או חום) או מכילה משקע, אין להשתמש במזרק. יש להחליפו.
- מכסה הביטחון של המזרק מונע הזרקה בשוגג, אין להסירו אלא לפני שימוש.

#### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Sodium chloride, sodium metabisulfite, hydrochloric acid, water for injection.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג / אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר.0.15 מ"ג** הם מזרקים אוטומטיים, להזרקה עצמית. כל מזרק נמצא בנרתיק פלסטיק.

**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג:** מזרק בעל תווית צהובה מאוחסן בנרתיק פלסטיק ובאריזה בודדת. בנוסף קיימת גם אריזה כפולה המכילה שני מזרקים כל אחד בנרתיק פלסטיק, עם תפס המחבר את שני הנרתיקים, ובנוסף מכילה מזרק תרגול אפור.

**אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר.0.15 מ"ג:** מזרק בעל תווית ירוקה מאוחסן בנרתיק פלסטיק ובאריזה בודדת. בנוסף קיימת גם אריזה כפולה המכילה שני מזרקים כל אחד בנרתיק פלסטיק, עם תפס המחבר את שני הנרתיקים, ובנוסף מכילה מזרק תרגול אפור. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

נערך ביוני 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**  
**אפינפרין זריקה מיילן 0.3 מ"ג: 161-59-35821-00**  
**אפינפרין זריקה מיילן ג'יי.אר 0.15 מ"ג: 161-58-35820-00**

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**יצרן ובעל רישום:** דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל