

إنشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ

إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ محلول للحقن بمحقنة آليّة

المادة الفعّالة

يحتوي **إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ** على جرعة واحدة من إبينفرين (Epinephrine) 0.3 ملغ/0.3 ملل (1 ملغ/ملل) في محلول معقم.

يحتوي **إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ** على جرعة واحدة من إبينفرين (Epinephrine) 0.15 ملغ/0.3 ملل (0.5 ملغ/ملل) في محلول معقم.

المواد غير الفعّالة ومسيبات الأرجية في الدواء: انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء".

إنّ **الإنشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**، تحتوي هذه الإنشرة على معلومات ملصخة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. يجب على كل من يُحمَل أن يعطيك الدواء أن يعرف كيف ينبغي استعماله قبل أن تصاب برد فعل تحسسي حاد (تأق).

لقد وُصف هذا الدواء من أجليك. لا تعلقه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطيبة مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ مخصصان للعلاج الطارئ في حالات ردود الفعل التحسسية الخطيرة (النوع 1)، بما في ذلك التآق للحشرات الالسعَة (مثلاً، سلسلة غشائيات الأجنحة، التي تشمل النحل، الدبابير، الديور الشرقي، **yellow jackets** والنمل الناري) والحشرات العاضنة (مثلاً، البق الماص للدم، الببوض)، للعلاج المتناعي لمسببات الحساسية، للطعام، للأدوية، للمواد في الفحوص الشخصية (مثلاً، مواد التباين في فحوص التصوير الإشعاعي) ولمسببات أخرى للحساسية، وكذلك لعلاج التآق الناجم عن سبب غير معلوم (مجهول السبب) أو التآق الناجم عن النشاط البدني.

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ للإعطاء الفوري لدى المتعالجين الذين حُدّد أنهم معرضون لخطر متزايد لحدوث تأق، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم سوابق لردود فعل تأقية.

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ للإعطاء الفوري كعلاج داعم في حالة الطوارئ فقط ولا يشكّل بديلاً عن علاج طبي فوري.

الفصيلة العلاجية، ينتمي إبينفرين للمواد التي تعمل من خلال مستقبلات أدرينايية المفعولة وديناميية المفعول.

قد يحدث التآق خلال دقائق ويشكّل خطراً على الحياة. إذا لم يتم علاج التآق فيماكانه أن يؤدي إلى الموت. يمكن أن تشمل أعراض التآق على:

- صعوبات في التنفس ● أزيز تنفسي ● بحّة (يسمع الصوت مختلفاً) ● شرى (طفح جلدي أحمر مرفوع قد يثير الحكة) ● حكة شديدة ● انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم أو في الحلق ● طفح جلدي، احمرار أو انتفاخ ● نبض سريع ● نبض ضعيف ● إحساس بالقلق الحاد ● ارتباك ● ألم في البطن ● فقدان السيطرة على التبول أو على عمل الأمعاء ● إسهال أو تقلصات في البطن ● دوام، إغماء أو فقدان الوعي.

2. قبل استعمال الدواء

يجب أن تحمّل معك دوماً محقنتي (2) إبينفرين، وذلك لأنه في بعض الأحيان لا تكفي جرعة واحدة من إبينفرين لعلاج رد الفعل التحسسي الخطير، قبل التوجه لتلقي المساعدة الطبية. يجب أن تحمّل معك دوماً محقنتي (2) إبينفرين، أيضاً للحالة التي يتم فيها تشغيل المحقنة الآلية الأولى قبل إعطاء الجرعة. لا يمكن استعمال المحقنة التي تم تشغيلها بالخطأ في حالة طوارئ تحسسية (تأق).

يُحمَل ألا تعلم متى قد يقع حدث تأقي. تحدّث إلى الطبيب إذا احتجت إلى عيوات إضافية من أجل الاحتفاظ بها في العمل، في المدرسة أو في أماكن أخرى. إذا استعملت محقنة واحدة لعلاج رد فعل تحسسي خطير، فيجب استبدالها بحيث تحمل معك دوماً محقنتي (2) إبينفرين.

أخبر أفراد العائلة ومن يعتني بك والأخرين عن مكان تخزين المحاقن. تأكد من معرفتهم لكيفية استعمال المحقنة قبل أن تحتاجها. في حالة وقوع حدث تأقي، قد تكون في وضع لا تقدر فيه على الكلام.

من أجل منع تفاقم الوضع، إذا تعرّضت لأحد العوامل الموصوفة في داعي الاستعمال أو ظهرت لديك علامات وأو أعراض:

- يجب استعمال إبينفرين حقنة مايلان فور تطوّر رد فعل تحسسي خطير (تأق).
- يجب التوجه دوماً لتلقي العلاج الطبي الطارئ، حتى لو استعملت محقنة إبينفرين. بإمكانك استعمال إبينفرين حقنة مايلان ثان إذا استمرت الأعراض أو تكررت، أو إذا تم تشغيل المحقنة الآلية الأولى قبل إعطاء الجرعة. لهذا السبب، عليك أن تحمّل معك محقنتين (2) دائماً. إذا احتجت إلى أكثر من جرعتين لنفس الحدث التحسسي، فإن الطبيب فقط هو من يستطيع إعطاء جرعات إضافية من إبينفرين.
- عند الحاجة، احقن عبر الملابس.

في حالات وجود خطر على الحياة ليست هناك موانع لاستعمال إبينفرين حقنة مايلان.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

أخبر الطبيب قبل استعمال إبينفرين حقنة مايلان عن وضعك الصحي. قد يزودك الطبيب بإرشادات إضافية بخصوص وقت وكيفية استعمال الدواء إذا وُجد لديك:

- مشاكل في القلب أو ضغط دم مرتفع
- سكري
- مشاكل في الغدة الدرقية
- ربو
- سوابق من الاكتئاب
- مرض الباركينسون
- إذا كنت مسنّاً

الأولاد والمراهقون

ليس معلوماً ما إذا كان إبينفرين حقنة مايلان **0.3 ملغ** / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر **0.15 ملغ** آمنين وفعالين لدى الأولاد الذين يزنون أقل من 15 كغم.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- علاجاً للربو
- أدوية ثلاثية الحلقات ومثبطات الأوكسிடاز أحادي الأمين ضد الاكتئاب، ليفوثيروكسين. قد يتزايد تأثير إبينفرين عند الاستعمال المتزامن.
- مضادات هيستامين (ضد الأرجية) معينة، لا سيما كلورفينيرامين، تريبييلينامين، ديفينهيدرامين. قد يتزايد تأثير إبينفرين عند الاستعمال المتزامن.
- حاصرات بيتا الأدرينالية، مثل پروبرانولول، يتم كبت تأثيرات إبينفرين على إثارة القلب وتوسيع العضلات عند الاستعمال المتزامن.
- حاصرات ألفا الأدرينالية، مثل فينتولامين، يتم كبت تأثيرات إبينفرين على تقليص الأوعية الدموية وقرط ضغط الدم عند الاستعمال المتزامن.
- مشثقات الإبروجوت لعلاج الصداع النصفي، الاستعمال المتزامن قد يُضعف تأثير إبينفرين.
- الجليكوزيدات القلبية مثل ديجيتاليس، مدرّات البول أو أدوية لتنظيم نظم القلب، الاستعمال المتزامن قد يؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب. يجب متابعة هؤلاء المرضى بشكل دقيق.

عند وقوع حدث تأقي، استعمل إبينفرين حقنة مايلان للعلاج مثلما وصف لك الطبيب دون مراعاة وضعك الصحي أو الأدوية التي تستعملها.

الحمل والإرضاع

يجب استعمال إبينفرين **حقنة مايلان 0.3 ملغ** في فترة الحمل والإرضاع بموجب نفس الاعتبارات – العلاج المختار (المفضل) في حالة الصدمة التأقية.

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، فاستشيري الطبيب بخصوص كيفية التصرف عند الحاجة. ليس معلوماً ما إذا كان إبينفرين يُلحق الضرر بالجنين.

إذا كنت مرضعاً أو تخططين للإرضاع، فاستشيري الطبيب قبل استعمال إبينفرين. ليس معلوماً ما إذا كان إبينفرين ينتقل إلى حليب الأم.

معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على sodium metabisulfite، الذي قد يسبب في أحيان نادرة ردود فعل تحسسية مفرطة خطيرة وتشنّجاً قسبيّاً.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (23 ملغ) في كل جرعة، يعني أنه عملياً "خالٍ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دوماً بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ عبارة عن محاقن آليّة، أحادية الاستعمال، جاهزة للحقن الذاتي الفوري إلى داخل العضلة. **لاستعمال الفوري الذاتي أو بمساعدة العائلة/مقدم الرعاية.**

عليك أن تفهم السبب الذي لأجله وُصف لك الدواء، وأن تتأكد من أنك تفهم كيف ومتى عليك استعماله. يوصى أيضاً بإرشاد فرد من العائلة/مقدم الرعاية/المعلم حول كيفية استعمال الدواء.

إذا لسعتك حشرة، فحاول إخراج الزباني بأصابعك. انتبه ألا تضغط أو تقرص أو تدفع الزباني إلى داخل الجلد. ضع الثلج على منطقة السعة، إذا كان ذلك ممكناً. حافظ على حرارة الجسم وامتنع عن النشاط البدني.

في حالة رد الفعل التحسسي الناجم عن طعام، اهتم أن تُخرج على الفور كل بقايا الطعام من الفم.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط، الجرعة الدوائية المثبّعة عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب:

حقنة واحدة من **إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ** تقدم جرعة بمقدار 0.3 ملغ إبينفرين (0.3 ملل) وهي تناسب المرضى الذين يزنون 30 كغم فما فوق.

حقنة واحدة من **إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ** تقدم جرعة بمقدار 0.15 ملغ إبينفرين (0.3 ملل) وهي تناسب الأولاد الذين يزنون 15-30 كغم.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها إلا إذا استمرت أعراض الصدمة التأقية أو تكررت. في حالة كِهذه قد تحتاج إلى استعمال محقنة إضافية. أحياناً، لا تكفي حقنة واحدة

لتحريك من أعراض الحدث التأقي. لهذا السبب قد يعطيك الطبيب وصفة طبية لأكثر من محقنة واحدة. إذا لم تتحسن الأعراض أو طرأ تفاقم خلال **15-5** دقيقة بعد أول حقنة، فعليك أو على من يتواجد معك أن يحقنك بالمحقنة الثانية. لهذا السبب، عليك أن تحمل معك في كل حين أكثر من محقنة واحدة.

إذا احتجت إلى أكثر من محقنتين في حدث تأقي واحد، فإن الطبيب فقط هو من سيقرر بشأن ضرورة جرعات إضافية من إبينفرين.

انتبه:

- إبينفرين حقنة مايلان **0.3 ملغ** / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر **0.15 ملغ** مخصصان للحقن في مركز الجانب الخارجي من الفخذ فقط.
- لا يجوز الحقن** في الوريد أو الأرداف، في أصابع اليدين والقدمين، في كفّي اليدين أو القدمين.
- إذا حقنت بالخطأ في موضع آخر من الجسم، فتوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ القريبة. أر الطبيب أين حقنت الحقنة بالخطأ في الجسم.
- ليس معلوماً ما إذا كان إبينفرين حقنة مايلان **0.3 ملغ** / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر **0.15 ملغ** آمنين وفعالين لدى الأولاد الذين يزنون أقل من 15 كغم.
- تحتوي كل محقنة على جرعة واحدة من إينفرين.
- إبينفرين حقنة مايلان **0.3 ملغ** / إبينفرين حقنة مايلان جي. آر **0.15 ملغ** مخصصان للحقن الذاتي الفوري (بنفسك أو بمساعدة مقدم الرعاية/فرد من العائلة).

في حالة وقوع حدث تأقي

استعمل المحقنة فوراً. يمكن استعمال الحقنة أيضاً عبر الملابس.

توجه فوراً لتلقي العلاج الطبي الطارئ. قد تحتاج إلى استمرار المراقبة الطبية.

تعليمات الاحتفاظ بالمحقنة

تعرّف على أجزاء المحقنة (انظر الرسم التوضيحي المرفوق).

حافظ على أن تكون المحقنة جاهزة للاستعمال والوصول إليها متاح في كل حين.

لمنّع تفكيك أجزاء المحقنة.

- امنع التعرض للضوء وحرارة المرتفعة (انظر "ظروف التخزين" في البند 4.5).
- لا يجوز نزع غطاء الأمان الأزرق إلا قبل الاستعمال.
- عليك أن تختبر لون المحلول في النافذة بشكل دوري. لا يجوز استعمال محقنة تتغيّر لون المحلول فيها أو تشكّلت فيه رواسب.

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ



إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ



تعليمات الحقن

حقن المستحضر يستلزم ثلاث مراحل: تحضير المحقنة، الحقن، الحصول على مساعدة طبية.

المرحلة 1: إخراج المحقنة من المحقنة البلاستيكية

- افتح الغطاء الأصفر لمحقنة إبينفرين **حقنة مايلان 0.3 ملغ** البلاستيكية أو الغطاء الأخضر لمحقنة **إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ** البلاستيكية. (الرسم التوضيحي رقم 1)
- أخرج المحقنة بواسطة الإمالة وزحلقة المحقنة من داخل المحقنة البلاستيكية. (الرسم التوضيحي رقم 2)
- أمسك بالمحقنة بكف اليد (كف اليد ملفوفة حول المحقنة مثل القبيضة) بحيث يتجه الطرف البرتقالي نحو الأسفل. باليد الأخرى، اسحب غطاء الأمان الأزرق بشكل مستقيم وإلى الأعلى وحزره دون لّيه أو ثنيه. (الرسم التوضيحي رقم 3)



انتبه:

- لا يجوز نزع غطاء الأمان الأزرق بواسطة الإبهام أو من خلال سحبه إلى الجوانب. لا يجوز لّي أو ثني غطاء الأمان الأزرق. إذا لم يتم إخراج غطاء الأمان الأزرق بشكل صحيح (بشكل مستقيم وإلى الأعلى)، فقد يتم التشغيل بغير قصد. لا يمكن


استعمال المحقنة التي تم تشغيلها بغير قصد في حالة الطوارئ. إذا حدث ذلك، فيجب استبدالها بمحقنة جديدة.

- تخرج الإبرة من الطرف البرتقالي.
- لا يجوز وضع الأصابع أو اليد فوق الطرف البرتقالي، من أجل منع الحقن بغير قصد. إذا حقنت نفسك بغير قصد، فيجب التوجه فوراً إلى المستشفى لتلقي المساعدة.

المرحلة 2: الحقن

إذا كنت تحقن لولد صغير، فامسك رجله بقوة، بحيث لا يتحرك الرجل عند الحقن، من أجل منع الإصابات عند الحقن.

- ضع طرف المحقنة البرتقالي ضد وسط الفخذ، في الجانب الخارجي للفخذ بزواوية مستقيمة (معامدة للفخذ)
- من خلال حركة دافعة، أصق المحقنة بالجانب الخارجي من الفخذ وادفع المحقنة إليه بقوة إلى أن تسمع "نقرة"، "النقرة" هي علامة على أن الحقن قد بدأ. (الرسم التوضيحي رقم 4)
- أمسك بالمحقنة بحيث تكون ثابتة ومتصلة بالفخذ لمدة **3 ثوانٍ** (عند بيبط 1،2،3) انتهى الحقن. (الرسم التوضيحي رقم 5)
- انتبه: إذا لم تُبقي المحقنة في الموضع لوقتٍ كافٍ، فقد لا تعطي المحقنة الجرعة الصحيحة من الدواء.
- أبعد المحقنة عن الفخذ. سيستطيل غطاء المحقنة البرتقالي وسيغطي الإبرة، إذا ظلت الإبرة مكشوفة، فلا تحاول استعمال المحقنة مرة أخرى. (الرسم التوضيحي رقم 6)
- دكّك موضع الحقن لمدة 10 ثوانٍ. (الرسم التوضيحي رقم 7)



المرحلة 3: توجه فوراً إلى أقرب مستشفى

قد تحتاج إلى علاج طبي إضافي. قد تضطرر إلى استعمال المحقنة الثانية إذا استمرت الأعراض أو تكررت.

خذ المحقنة/المحاقن التي استعملتها إلى المستشفى وأخبر الطبيب أنك تلقيت حقنة إبينفرين في الفخذ. أره موضع الحقن.

سلم المحقنة المستعملة للطبيب لغرض الرقابة، ولإتلاف المحقنة على نحو لائق.

انتبه:

- المحقنة المستعملة مع الإبرة المغطاة تكون أطول بعد الاستعمال ولن تتناسب مع العبوة البلاستيكية.
- تقوم المحقنة الآلية بتحرير جرعة معايرة من إبينفرين ولا يمكن استعمالها مرة أخرى. لا تحاول أن تستعمل محقنة قد تم استعمالها.
- معظم سائل الحقنة يبقى داخل المحقنة ولا يمكن استعماله ثانيةً. مع ذلك، يزودك الحقن بالجرعة المطلوبة إذا استطال الغطاء البرتقالي وحجب الإبرة، وكانت النافذة مخفية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **إبينفرين حقنة مايلان** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية قلبية وعائية (القلب والأوعية الدموية)

- اضطرابات النظم (نبض قلبي سريع، غير منتظم، خفقان القلب)، بما في ذلك الرجفان البطيني الذي يؤدي إلى الموت، خاصة لدى متلقي العلاج المصابين بمرض قانن في القلب أو أولئك الذين يستعملون أدوية معينة.
- ارتفاعات سريعة في ضغط الدم تسببت في نزيف دموي دماغي، خاصة لدى المتعالجين المسنين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- قد تحدث ذبحة صدرية لدى المتعالجين المصابين بمرض الشرايين التاجية.
- مرض في عضلة القلب بسبب إجهاد نفسي شديد ("متلازمة القلب المكسور") لدى المتعالجين الذين عولجوا بإبينفرين (نادر).

أعراض جانبية ناجمة عن الحقن بالخطأ أو عن تقنيّة حقن غير صحيحة

- الحقن بالخطأ في الأصابع، في كفّي اليدين أو في القدمين قد يؤدي إلى فقدان جريان الدم إلى المنطقة المتأثرة.
- يمكن أن تشملل ردود الفعل السلبية التي تظهر نتيجةً للحقن بالخطأ على الارتفاع في وتيرة القلب، ردود فعل موضعية تشملل على شحوب، إحساس بالبرودة وتدنّي الحساسية في موضع الحقن، أو إصابة في موضع الحقن مما يسبب الكدمات، النزيف الدموي، تغيّر لون الجلد، الحمى (احمرار في الجلد) أو تضرر الهيكل العظمي.
- الحقن في الأرداف أدى إلى حالات من النخر الغازي.
- يمكن أن تحدث جروح على الجلد، انحناء إبر أو بقاء إبر في الجلد بعد الحقن عندما يقوم الأولاد بالركل أو بالتحرك أثناء الحقن.

تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة

في أحيان نادرة نشأ تلوث في موضع الحقن خلال بضعة أيام بعد الحقن لدى المتعالجين

الذين استعملوا **إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ** / **إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ**. بعض هذه التلوثات قد تكون خطيرة.

توجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك أحد الأعراض التالية في موضع الحقن:

- احمرار لا يزول
- انتفاخ
- حساسية
- شعور بسخونة الموضع عند لمسه

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر من بين 10-1 مستعملين من بين 100):

● تعرّق ● صداع ● ضعف ● ارتجاف ● شحوب ● فرط الانفعال، عصبية، قلق، هياج (عدم الهدوء) ● دوام ● دوام ● غثيان أو تقيؤ ● مشاكل في التنفس

قد تخفني الأعراض الجانبية عند الراحة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في الإنشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط **"اليوم عل تظوفوت لوزاوي عقب سيفون تاروفتني"** الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (**www.health.gov.il**) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: **https://sideeffects.health.gov.il**

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين فيما دون 25°C. لا يجوز التخزين في الثلاجة. يجب الحماية من الضوء. يجب الاحتفاظ بالمحقنة في المحقنة البلاستيكية دوماً، من أجل حماية المحقنة. انتبه، المحقنة ليست عازلة للماء.

افحص لون المحلول في نافذة المحقنة الشفافة بشكل دوري. يجب أن يكون المحلول صافياً. إذا غير المحلول لونه (وردي أو بني) أو احتوى على رواسب، فلا يجوز استعمال المحقنة. يجب استبدالها.

● غطاء الأمان في المحقنة يمنع الحقن بغير قصد، لا يجوز نزعه إلا قبل الاستعمال.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Sodium chloride, sodium metabisulfite, hydrochloric acid, water for injection.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ / **إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ** عبارة عن محاقن آليّة، الحقن الذاتي. كل محقنة موجودة في محفظة بلاستيكية.

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ: محقنة ذات ملصق أصفر مخزنة في محفظة بلاستيكية وفي عبوة أحادية. إضافة لذلك توجد أيضاً عبوة مزودة تحتوي على محقنتين كل واحدة منهما في محفظة بلاستيكية، مع مشبك يربط بين المحفظتين، وكذلك تحتوي على محقنة تمرّن رمادية.

إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ: محقنة ذات ملصق أخضر مخزنة في محفظة بلاستيكية وفي عبوة أحادية. إضافة لذلك توجد أيضاً عبوة مزودة تحتوي على محقنتين كل واحدة منهما في محفظة بلاستيكية، مع مشبك يربط بين المحفظتين، وكذلك تحتوي على محقنة تمرّن رمادية. قد لا تتسوّق جميع أحجام العبوات.

خُرت الإنشرة في حزيران/يونيو 2025 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

إبينفرين حقنة مايلان 0.3 ملغ: 161-59-35821-00

إبينفرين حقنة مايلان جي. آر 0.15 ملغ: 161-58-35820-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه الإنشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المصنّع وصاحب التسجيل: دكسل م.ض.

شارع ديكسل 1، أور عاكيثا 3060000، إسرائيل