

600

The effect of certain medicines can be altered when you stop smoking and/or use Nicotinel Gum.

- If you are taking additional medicines regularly, you should inform the doctor or pharmacist.
- Diabetics need to monitor their blood sugar levels more often than usual when using the gum, because the insulin/medicines requirements may change.

Use of the medicine and food
 Coffee, juices, acidic and fizzy drinks may reduce the absorption of nicotine. Avoid drinking these drinks 15 minutes before chewing the gum.

Pregnancy and breastfeeding
Pregnancy: Smoking during pregnancy is associated with risks such as growth disturbances of the fetus before birth, premature birth or stillbirth. Smoking cessation is the single most effective way to improve both your health and that of your baby. The earlier your smoking is stopped, the better. If you are pregnant, it is recommended to stop smoking without nicotine replacement therapy. However, if you have tried and this is not possible, nicotine replacement therapy is recommended because the benefit to the developing fetus is less than that expected from continuing to smoke.

The decision to use nicotine replacements should be made as early on in the pregnancy as possible with the aim of discontinuing use after approximately 2-3 months.

Breastfeeding: It is better to use nicotine replacement products that can be taken intermittently (not transdermal patches).

Try to breastfeed immediately before you take the preparation to ensure that the baby gets the smallest amount of nicotine possible. If you need to use nicotine replacements to help you quit smoking, the amount of nicotine that the baby may receive is considerably smaller and less harmful than breathing in the smoke from smoking.

If you are pregnant or breastfeeding, consult the doctor before using medicines.

Driving and operating machinery
 It is unlikely that Nicotinel Gum will affect your ability to drive or operate machinery.

Important information about some of the ingredients of the medicine
 Nicotinel gums contain certain ingredients of which you need to be aware:

- Sorbitol:** If you have been told by your doctor that you have an intolerance to certain sugars, contact your doctor before taking this medicine. Each unit of Nicotinel Gum contains approximately 0.2 g sorbitol. Sorbitol is a source of fructose (0.2 g sorbitol is equivalent to approximately 0.04 g fructose).
- Sodium:** Each unit of Nicotinel Gum 2 mg contains 11.50 mg sodium. Each unit of Nicotinel Gum 4 mg contains 11.52 mg sodium. This should be taken into account when the medicine is taken by patients who are on a sodium-controlled diet.
- Butylated hydroxytoluene (an ingredient in Gum Base):** an ingredient of the gum which may cause local irritation to the oral mucosa.

For additional information, see section 6.

3. How should you use the medicine?
 Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain. The generally accepted dosage is:
 Take one unit of Nicotinel Gum when you feel the need to smoke. Usually, 8-12 gums per day up to a maximum of 25 of the 2 mg gums or 15 of the 4 mg gums per day.

For heavy smokers (more than 20 cigarettes a day), it is recommended to start with Nicotinel Gum 4 mg.

See details in the 'Method of use' subsection. This medicine is not intended for young people under the age of 18.

Method of use
 Use of Nicotinel is unlike chewing regular gum. When the urge to smoke increases, chew one unit of Nicotinel for 30 minutes. It is important that the nicotine will be released slowly. Do not chew quickly and intensely and take breaks intermittently and rest in the subsequent 30 minutes.

How can you contribute to the success of the treatment?
 Carefully follow the following instructions for a day or two, and get yourself used to chewing at the right pace. This will supply the right amount of nicotine and will prevent effects arising from chewing too quickly.

- Place one unit of Nicotinel in your mouth and chew slowly until you feel the taste of the nicotine (chew about 10 times).
- Place the Nicotinel between the cheek and gums for about a minute or two, until the taste has almost disappeared.
- Continue to chew again and to rest intermittently, in this manner for about 30 minutes.

It is recommended to begin with an initial dosage for 3 months and then to gradually start reducing the number of units per day until complete cessation. Do not stop using until you have reached a dosage of one or two units per day. Always carry Nicotinel with you, in case you again feel the urge to smoke.

Remember! One cigarette is sufficient to make you start smoking again. Do not exceed the recommended dose.

For the relief of breakthrough cravings
 If you are attempting to quit smoking through a smoking cessation program using patches, you can use these gums to relieve any breakthrough cravings you may experience. Chew one unit of gum if you feel the need to smoke. Professional counselling may improve your chances of quitting smoking.

If you accidentally took a higher dosage
 If you accidentally took an overdose, or if a child has accidentally swallowed this medicine, refer immediately to a doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the packaging of the medicine with you. Digestion of nicotine by a child may lead to severe poisoning.

General symptoms of nicotine overdose include: weakness, sweating, excess secretion of mucus, burning sensation in the throat, headache, nausea, diarrhea, abdominal pain, hearing and vision disturbance, heart beat disturbance, shortness of breath, blood flow disturbances.

If you forget to take Nicotinel Gum, only chew the gum when you need it. Do not chew more than one unit at a time or more than 25 units of 2 mg per day or more than 15 units of 4 mg per day.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose every time you take the medicine. Wear glasses if you need them.

If you have additional questions regarding the use of the medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. Side effects
 As with any medicine, using Nicotinel Gum may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not experience any of them.

Discontinue use and refer to a doctor immediately if you suffer from any of the following effects, which may be signs of an allergic reaction:

- Difficulty breathing or swallowing, swelling of the mouth, face, lips, tongue or throat.
- Severe itching of the skin, accompanied by a red rash or raised bumps.

Some effects, which you may notice during the first few days are dizziness, headache and sleep disturbances. These may be withdrawal symptoms related to smoking cessation and may arise due to inadequate consumption of nicotine.

Common side effects (occur in 1 to 10 in every 100 users):

- Dizziness and headache.
- Nausea, digestive system disturbances such as nausea, flatulence, vomiting, heartburn, increased saliva production, irritation of the mouth and throat, jaw muscle pain which may occur especially following intense chewing. If you experience these effects, make sure that you follow the correct chewing technique.

Uncommon side effects (occur in 1 to 10 in every 1,000 users):

- Pallipitations.
- Red skin rash (erythema) and itching of raised skin bumps (urticaria).

Rare side effects (occur in 1 to 10 in every 10,000 users):

- Heart rate disturbances and allergic reactions.

Mouth ulcers may be related to smoking cessation and to the treatment administered to you.

The gum may stick to and very rarely damage dentures or other dental work.

If a side effect occurs, if one of the side effects worsens, or if you suffer from a side effect not mentioned in this leaflet, consult the doctor. Side effects may be reported to the Ministry of Health by clicking on the link "Report side effects due to medicinal treatment" found on the Ministry of Health website homepage (www.health.gov.il), which will direct you to the online form for reporting side effects, or by clicking on the following link: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. How to store the medicine?

- Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be kept in a closed place out of the reach of children and infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting without an explicit instruction from the doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) appearing on the package. The expiry date refers to the last day of that month.
- Storage conditions: store at a temperature below 25°C.

6. Additional information

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:
Nicotinel Gum 2 mg, 4 mg, Mint flavored chewing gum: Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Carbonate Anhydrous, Sodium Hydrogen Carbonate, Amberlite, Glycerol, Purified Water, L-Menthol, Peppermint Oil, Eucalyptus Oil, Saccharin, Sodium Saccharin, Acesulfame K, Xylitol, Mannitol, Gelatine, Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc.
Nicotinel Gum 2 mg, 4 mg, Fruit flavored chewing gum: Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Carbonate Anhydrous, Sodium Hydrogen Carbonate, Amberlite, Glycerol, Purified Water, L-Menthol, Tutti, Saccharin, Sodium Saccharin, Acesulfame K, Xylitol, Mannitol, Gelatine, Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc.

What does the medicine look like and what are the contents of the package
 Each unit of gum is cream-colored and rectangular in shape. Nicotinel gums are packed in blisters in boxes containing 12, 24, 48, 96 and 204 units of gum. Not all packages sizes may be marketed.

Marketing authorization holder and address:
 Haleon CH Israel Ltd., P.O.B. 3256, Petach Tikva.

Name and address of the manufacturer:
 Haleon CH SARL, Rue De l'Éclair 1260, Nyon, Switzerland.

The leaflet was revised in November 2021 in accordance with the Ministry of Health guidelines.

Registration numbers of the medicine in the national drug registry of the Ministry of Health:
 Nicotinel Gum 2 mg (Fruit): 115-78-29638-22; 115-78-29638-21
 Nicotinel Gum 2 mg (Mint): 115-78-29638-24; 115-78-29638-23
 Nicotinel Gum 4 mg (Fruit): 115-79-29639-22; 115-79-29639-21
 Nicotinel Gum 4 mg (Mint): 115-79-29639-24; 115-79-29639-23

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) -1986
 Препарат отпускается без рецепта врача
Никотинель жевательная резинка 2 мг (фруктовая)
Никотинель жевательная резинка 2 мг (мятная)
Никотинель жевательная резинка 4 мг (фруктовая)
Никотинель жевательная резинка 4 мг (мятная)

Активный компонент и его количество на единицу дозировки:
 Каждая жевательная резинка с дозировкой 2 мг содержит:
 Никотин 2 мг Никотин 2 мг
 Каждая жевательная резинка с дозировкой 4 мг содержит:
 Никотин 4 мг Никотин 4 мг

Список неактивных ингредиентов и алергенов, содержащихся в препарате – см. раздел 6.

Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат предназначен для взрослых старше 18 лет. Лицам младше данного возраста следует обратиться к врачу. Примените препарат надлежащим образом. Посоветуйтесь с фармацевтом, если нуждаетесь в дополнительной информации.

1. Для чего предназначен препарат?
 Препарат является вспомогательным средством при лечении от табачной зависимости — для облегчения симптомов, связанных с отказом от никотина. Жевательная резинка предназначена для курящих, неспособных или не готовых бросить курить одновременно; может использоваться также в рамках программы по снижению интенсивности курения, предшествующей полному отказу от него.

Никотинель жевательная резинка содержит никотин - один из компонентов табака. При жевании никотин медленно высвобождается и всасывается через слизистую оболочку ротовой полости. Никотинель жевательная резинка не содержит другие вредные компоненты, содержащиеся в табачном дыме, такие как смоль или монооксид углерода.

Фармакологическая группа: сильнораздвующий парасимпатомиметик/реверсологалор

2. Перед началом применения препарата
Не применяйте препарат, если:

- у вас имеется повышенная чувствительность (аллергия) к активному компоненту или к любому дополнительному ингредиенту, содержащемуся в препарате (см. раздел 6)
- вы не курите или курите время от времени
- вы не достигли 18-летнего возраста

Особые предостережения относительно применения препарата
Перед началом применения препарата Никотинель жевательная резинка сообщите врачу, если:

- вы страдаете от сердечного заболевания (инфаркта, усугубления боли в груди, нарушения сердечного ритма)
- вы страдаете от неконтролируемого высокого артериального давления крови
- вы недавно перенесли инсульт
- вы страдаете от серьезного заболевания печени или почек
- вы страдаете или страдали в прошлом от язвы желудка
- вы страдаете от продолжительного расстройства пищеварения
- вы страдаете от сильной боли в горле или от воспаления ротовой полости
- вы страдаете от сахарного диабета (см. подраздел "Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты...")
- вы страдаете от гиперфункции щитовидной железы
- вы страдаете от опухоли надпочечника (феохромоцитомы)
- вы страдаете от непереносимости фруктозы
- вы соблюдаете диету с низким содержанием натрия
- вы принимаете другие препараты (см. подраздел "Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты...")

- Вы беременны или кормите грудью (см. подраздел "Беременность и грудное вскармливание")

Люди, страдающие от челюстных проблем, а также пользующиеся зубными протезами, могут испытывать трудности с жевательной резинкой. Если вы испытываете подобные затруднения, рекомендуется использовать другие методы никотин-заместительной терапии, такие как трансдермальные пластыри или леденцы. Посоветуйтесь на эту тему с врачом или фармацевтом.

Если вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Действие некоторых препаратов может измениться с прекращением курения и/или с применением Никотинель жевательной резинки.

- Если вы постоянно принимаете дополнительные препараты, сообщите об этом врачу или фармацевту.
- Больные сахарным диабетом должны в период применения жевательной резинки контролировать уровень сахара в крови чаще обычного, поскольку потребность в инсулине/препаратах может измениться.

Применение препарата и пища
 Кофе, соки, кислые и газированные напитки могут снизить всасывание никотина.

Избегайте употребления этих напитков за 15 минут до жевания жевательной резинки.

Беременность и грудное вскармливание
Беременность: Курение во время беременности сопряжено с рисками, такими как нарушение внутриутробного роста плода, преждевременные роды или мертворождение. Прекращение курения - это единственный эффективный способ улучшить ваше здоровье и позаботиться о здоровье вашего младенца. Чем раньше прекратится курение, тем лучше.

Если вы беременны, рекомендуется прекратить курение без применения никотин-заместительной терапии. Однако, если вы попробовали и это оказалось невозможным, можно применять заменители никотина, так как сопряженный с ними риск для развивающегося плода менее значителен, нежели риск от курения.

Решение применять заменители никотина должно быть принято по возможности на самом раннем сроке беременности и с тем чтобы прекратить применение по прошествии 2-3 месяцев.

Грудное вскармливание: Предпочтительнее использовать такие заменители никотина, которые можно применять эпизодически (не трансдермальные пластыри).

Попробуйте покормить грудью непосредственно перед приемом препарата, чтобы гарантировать, что младенец получит самое минимальное количество никотина, какое только возможно. Если вам необходимо применять заменители никотина как вспомогательное средство для прекращения курения, то количество никотина, которое при этом может получить младенец, как и наносимый этим никотином вред, будут существенно ниже, чем при вдыхании дыма при курении.

Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом перед применением каких бы то ни было препаратов.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
 Магистерно, чтобы препарат Никотинель жевательная резинка повлиял на способность управления транспортным средством или механизмами.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата
 Жевательные резинки Никотинель содержат некоторые ингредиенты, о наличии которых вы должны быть осведомлены:

- Сorbitol:** Если Ваш врач сообщил Вам о непереносимости Вами некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать данный препарат. Каждая жевательная резинка Никотинель содержит приблизительно 0,2 грамма сорбитола. Сорбитол является источником фруктозы (0,2 грамма сорбитола эквивалентны приблизительно 0,04 граммам фруктозы).

Натрий
 Каждая жевательная резинка Никотинель 2 мг содержит 11,50 мг натрия. Каждая жевательная резинка Никотинель 4 мг содержит 11,52 мг натрия. Следует принять это во внимание, если данный препарат принимает пациент, соблюдающий диету с низким содержанием натрия.

Бутилированный гидрокситолуол (ингредиент Gum Base): ингредиент жевательной резинки, который может вызвать местное раздражение слизистой оболочки рта.

Дополнительные ингредиенты - см. раздел 6.

3. Как следует применять препарат?
 При возникновении сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Обычная принятая дозировка:
 Одна Никотинель жевательная резинка по мере необходимости, а когда возникает потребность закурить. Как правило, суточная доза составляет 8-12 жевательных резинок. Максимально допустимая суточная доза составляет 25 жевательных резинок при дозировке в 2 мг или 15 жевательных резинок при дозировке в 4 мг.

Для тех, кто пытается бросить курить (более 20 сигарет в день) рекомендуется начать с Никотинель жевательной резинки 4 мг. Подробнее см. в подразделе "Способ применения".

Данный препарат не предназначен для людей младше 18 лет.

Способ применения
 Применение Никотинель не похоже на жевание обычной жевательной резинки. Когда желание закурить усиливается, следует жевать одну жевательную резинку Никотинель в течение 30 минут. Важно, чтобы никотин высвобождался медленно. Не жуйте быстро и интенсивно, периодически делайте перерывы, как это описано в подразделе ниже. Если этот способ не способствует успеху лечения курения, проконсультируйтесь с врачом. Тщательно следуйте инструкциям, описанным ниже, в течение дня или двух, и вы приучите себя жевать в правильном темпе. Это обеспечит нужное количество никотина и предотвратит эффекты, возникающие при слишком быстром жевании.

- Возьмите одну жевательную резинку Никотинель в рот и медленно жуйте, пока не почувствуете вкус никотина (примерно 10 минутных движений).
- Подержите Никотинель между щекой и деснами приблизительно минуту или две, пока вкус почти не исчезнет.
- Продолжайте жевание резинки, периодически делая перерывы, в течение приблизительно 30 минут.

Рекомендуется начать с начальной дозировки в течение 3 месяцев, а затем постепенно сокращать количество жевательных резинок в день, вплоть до полного прекращения их употребления. Не прекращайте употребление, пока не достигнете дозировки в одну или две жевательные резинки в день. Всегда носите с собой Никотинель на случай, если у вас снова возникнет острое желание закурить. Помните! Одной сигареты достаточно, чтобы вы снова вернулись к курению.

Не пытайтесь превышать рекомендуемую дозу.
 Не глотать.

Для облегчения внезапного непреодолимого желания закурить
 Если вы пытаетесь бросить курить, и ваша программа отвыкания от курения не работает, попробуйте применить жевательные резинки, чтобы избежать использования для облегчения внезапного острого желания закурить, которое вы можете испытать. Используйте одну жевательную резинку, пока не почувствуете потребность закурить. Профессиональная консультация может улучшить ваши шансы на прекращение курения.

Если вы по ошибке превысили дозировку
 Если вы по ошибке превысили дозировку, либо если ребенок проглотил данный препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы, взяв с собой упаковку препарата. Переизбыток никотина детьми может привести к тяжелому отравлению.

Общие симптомы передозировки никотина включают: слабость, потливость, усиленное слюноотделение, ощущение жжения в горле, головная боль, тошнота, диарея, боль в животе, нарушение слуха и зрения, нарушения сердечного ритма, одышку, нарушения кровообращения.

Если вы забыли принять Никотинель жевательную резинку, жуйте жевательную резинку, как обычно. Не жуйте одновременно более одной жевательной резинки или более 25 жевательных резинок в день при дозировке в 2 мг, либо более 15 жевательных резинок в день при дозировке в 4 мг.

Не принимайте препараты в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у вас имеются дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты
 Как и при лечении любым препаратом, применение препарата Никотинель жевательная резинка может вызывать побочные эффекты у некоторых пациентов. Не тревожьтесь, при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вы не будете страдать ни от одного из них.

Следует немедленно прекратить использование препарата и обратиться к врачу при появлении нижеперечисленных симптомов, могущих свидетельствовать об аллергической реакции:

- затрудненное дыхание или затрудненное глотание, отек рта, лица, губ, языка или горла
- высыпания, зудящая сыпь, зуд с красной кожей или волдырями.

Определенные эффекты, которые вы можете ощутить в первые дни: головноекружение, головная боль и нарушения сна. Они могут быть проявлением так называемого синдрома отмены в связи с прекращением курения, возникающими на фоне недостаточного потребления никотина.

Частые встречающиеся побочные эффекты (проявляющиеся у 1-10 пользователей из 100):

- головноекружение и головная боль,
- никотин раздражает лицевартериальную систему, такие как тошнота, метеоризм, рвота, изжога, усиленное слюноотделение, раздражение рта и горла, боль в челюстных мышцах, которая может возникнуть с наибольшей вероятностью после интенсивного жевания. Если вы ощущаете данные эффекты, убедитесь, что соблюдаете правильную технику жевания.

Нечасто встречающиеся побочные эффекты (проявляющиеся у 1-10 пользователей из 1 000):

- сердцебиение,
- красная кожная сыпь (эритема) и зудящие волдыри на коже (крапивница).

Редкие побочные эффекты (проявляющиеся у 1-10 пользователей из 10 000):

- нарушения сердечного ритма и аллергические реакции.

Алты во рту могут быть связаны с прекращением курения, а не с лечением.

Жевательная резинка может прилипать и - в очень редких случаях - повредить зубные протезы или другие стоматологические конструкции.

В случае появления или усугубления какого-либо из побочных эффектов, либо проявления побочного эффекта, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных эффектах вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), направляющую на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных эффектах, или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?
 Не допускайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом доступном для детей или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту, не получая на то прямого указания от врача.

- Не допускайте использования препарата после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Храните в прохладном месте. Хранить при температуре ниже 25°C.

6. Дополнительная информация
В дополнение к активному веществу препарат также содержит:
Никотинель жевательная резинка 2 мг, 4 мг, жевательная резинка с мятным вкусом:
 Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Carbonate Anhydrous, Sodium Hydrogen Carbonate, Amberlite, Glycerol, Purified Water, L-Menthol, Peppermint Oil, Eucalyptus Oil, Saccharin, Sodium Saccharin, Acesulfame K, Xylitol, Mannitol, Gelatine, Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc.
Никотинель жевательная резинка 2 мг, 4 мг, жевательная резинка с фруктовым вкусом:
 Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Carbonate Anhydrous, Sodium Hydrogen Carbonate, Amberlite, Glycerol, Purified Water, L-Menthol, Tutti, Saccharin, Sodium Saccharin, Acesulfame K, Xylitol, Mannitol, Gelatine, Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc.

Виды препарата и содержимое упаковок:
 Каждая жевательная резинка имеет вид прямоугольника кремового цвета.

Жевательные резинки упакованы в блистеры, расположенные в коробки по 12, 24, 48, 96 и 204 штук.

В продаже могут быть представлены не все размеры упаковок.

Владение лицензией и его адрес:
 Haleon CH SARL, Rue De l'Éclair 1260, Nyon, Швейцария.
 Данная инструкция была отредактирована в ноябре 2021 г. в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарства в государственном реестре Министерства здравоохранения:
 Никотинель жевательная резинка 2 мг (фруктовая):
 115-78-29638-22; 115-78-29638-21
 Никотинель жевательная резинка 2 мг (мятная):
 115-78-29638-24; 115-78-29638-23
 Никотинель жевательная резинка 4 мг (фруктовая):
 115-79-29639-22; 115-79-29639-21
 Никотинель жевательная резинка 4 мг (мятная):
 115-79-29639-24; 115-79-29639-23

Данная инструкция изложена в мужском роде из соображений простоты и удобства чтения. Тем не менее, данный препарат предназначен для представителей обоих полов.

NicGum PT v2.1

1012731



40

5

12

V2 Artwork Information Panel **HALÉON**
 19 - Jun - 2024

Non Production Artwork Production Artwork

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

Black			
1.			
Total Special Finishes:	0		

Component No: AWP No: TR3174328/8
 Manufacturing Site: Fertin
 Approving Market: Israel
 Technical Drawing No: N/A
 Body Text Size: 6.Spt
 Smallest Text Size: 6.Spt
 Electronic Verification Code: 1012731
 Printer and User Notes: N/A

Studio Location: Europe

BARCODE INFO

Barcode Type: Data Matrix
 Barcode Number: 1012731
 Magnification: 100
 B/W: 6 Micrometre