

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

فوريكونازول يُتِفق جديد

أقرص مطلية

التركيبية

يحتوي كل قرص مطلي على:

فوريكونازول 200 ملغ

Voriconazole 200 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملصقة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه لأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مُخصص هذا الدواء؟

فوريكونازول يُتِفق عبارة عن دواء مضاد للفطريات، واسع الطيف ومخصص لعلاج:

- داء الرشاشيات الفغوي (تلوث تسببه فطريات من نوع الرشاشيات).

- تلوثات المبيضات (كانثيدا) في الجهاز الدموي (وجود المبيضات في الدم) لدى المرضى غير المصابين بقعة العدلات.

- تلوثات المبيضات الفغوية المقاومة لفلوكونازول (دواء آخر مضاد للفطريات) بما في ذلك *C. Krusei*.

- التلوثات الفطرية الخطيرة التي تسببها فطريات من النوعين *Fusarium*- و *Scedosporium*.

فوريكونازول يُتِفق مخصص للمرضى المصابين بتلوثات فطرية خطيرة، بل ربما تشكل خطرًا على الحياة.

فوريكونازول يُتِفق مخصص لمنع التلوثات الفطرية الفغوية لدى الأشخاص الذين خضعوا لزراعة النخاع العظمي والمعرضين لخطورة عالية.

الفصيلة العلاجية:

مضاد للفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو إيقاف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب التلوثات.

2. قِيل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجِدَ لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء، انظر البند 6.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء مع تيريفينادين (لأرجية)، أستيميزول (لأرجية)، سيبرابيد (للمشاكل في المعدة)، بيموزيد (للمشاكل النفسية)، كينيدين (للمشاكل في نظم القلب)، إيفيرادين (لعلاج قصور القلب المزمن)، ريفابوتين (لعلاج السل)، ريفاميسين (لعلاج السل)، كاربامازيبين (لعلاج الاختلاجات)، فينوبريبيل (لعلاج الاختلاجات والتشنج)، ليفيتيرازول (لعلاج الاختلاجات والإرجوت (إبرجوتامين، ديهيدرو إبرجوتامين؛ لعلاج الصداع النصفي)، سيروليموس (لدى المرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء، إيففيرينز بجرعة دوامية مقدارها 400 ملغ فما فوق تعطي مرة واحدة في اليوم (لعلاج HIV)، ريتونايفير بجرعة دوامية مقدارها 400 ملغ فما فوق في كل مرة تعطي مرتين في اليوم (لعلاج HIV)، نيتة العرن (St. John’s wort)، نالوكسجول (لعلاج الإدمان كالتزام تحديدا عن استعمال مسكنات الألم) من نوع الأفيونات (مثلًا مورفين، أوكسيكودون، فينتانيل، ترامادول، كودينين))، لوفانيلان (المستعمل لعلاج نقص الصوديوم في الدم (المستويات المنخفضة للصوديوم في الدم) أو يستعمل لإبطاء التدني في وظيفة الكليتين لدى متلقي العلاج المصابين بداء الكلية المتعددة الكيسات)، لوراسيدون (لعلاج الاكتئاب)، فينبرينون (لعلاج مرض الكلى المزمن)، فينيوتلاكاس (لعلاج أمراض العلاج المصابين ببايضاض الدم الليمفاوي المزمن-CLL).

قبل العلاج بفوريكونازول يُتِفق، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي على مستحضرات من فصيلة الأزولات.
- كنت تعاني من مرض في عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب)، نظم قلبي غير منتظم أو بطيء، أو من شذوذ في مخطط كهربية القلب (أي كي جي) يسمى "متلازمة QTc الطويلة".
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من مرض في الكبد.
- سبب الربط الطبيب وظائف الكبد عن طريق إجراء فحوص للدم.
- تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**
- يجب الامتناع عن أي ضوء شمس وعن التعرّض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واقٍ ذي معامل وقاية (SPF) مرتين، لأنه قد تزداد حساسية الجلد لإشعاع الشمس (UV). قد تتزايد هذه الحساسية بشكل أكبر عن طريق أدوية أخرى تزيد من الحساسية للشمس، مثل ميثوتريكسات. ينطبق هذا التحذير أيضًا على الأوالاد.
- أثناء استعمال الدواء، فضع الطبيب بشكل دوري إذا تطور لديك: حرق شمسي، طفح جلدي شديد أو حويصلات في الجلد، الألم في العظام.
- إذا أظهر أحد هذه الأعراض الجلدية، فقد يحلك الطبيب إلى طبيب الجلد. هناك احتمال ضئيل لتطور سرطان الجلد عند الاستعمال الطويل للأدوية لفوريكونازول يُتِفق.
- إذا تطورت لديك علامات على "فشل الغدة الكظرية"، وهي حالة طبية لا تقوم الغدتان الكظريتان فيها بإنتاج كميات كافية من هرمونات ستيرويدية معينة مثل كورتيزول، مما قد يسبب أعراضًا مثل التعب المزمن أو المتواصل، ضعف العضلات، فقدان الشهية، نقصان الوزن، الأم البطن، فيرجى إخبار الطبيب.
- إذا تطورت لديك أعراض "متلازمة كوشينج" التي يُنتج الجسم فيها فائضًا من هرمون الكورتيزول الذي قد يؤدي إلى أعراض مثل: ارتفاع ارتجاع، نسج دهني بين الكتلين، وجه مستدير، إضعاف الجلد في البطن، في الفخذين، في الثديين وفي الذراعين، جلد رقيق، ميل إلى التكدم بسهولة، سكر مرتفع في الدم، فرط الشعر، فرط التعرق، فيرجى إخبار الطبيب.
- سبب الربط الطبيب وظائف الكبد والكليتين عن طريق إجراء فحوص الدم خلال فترة العلاج بفوريكونازول يُتِفق.
- قبل البدء بالعلاج وخلالها يجب إجراء مراقبة للأضطرابات من مستويات الكهارل مثل المستويات المنخفضة للبيوتاسيوم، المغنيزيوم والكالسيوم.

الأولاد والمرامقون

هذا الدواء غير مخصص للأولاد والأطفال الرضع الذين عمرهم أقل من عامين.

الفحوص والمتابعة

بما أن فوريكونازول يُتِفق يؤثر على الكبد والكليتين، فسيراقب الطبيب وظيفة الكبد والكليتين عن طريق إجراء فحوص الدم. يرجى إخبار الطبيب إذا أحسست بالألم البطن أو إذا كان هناك تغير في قوام البراز.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فاطبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- فيتينيتول (لعلاج الصرع). إذا كنت تستعمل هذا الدواء فيجب مراقبة مستوى فيتامينين في الدم.
- ريتونايفير (لعلاج HIV) بجرعة دوامية منخفضة مقدارها 100 ملغ مرتين في اليوم. لا يمكن تناول جرعات دوامية معينة من ريتونايفير مع فوريكونازول يُتِفق. انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.
- جلاسيديب (لعلاج السرطان) - إذا تعين عليك استعمال الدواءين، فسيراقب الطبيب نظم القلب في أحيان أكثر تَقَارِبًا.
- دمج فوريكونازول يُتِفق مع الأدوية التالية قد يتطلب ملازمة الجرعة الدوائية والمتابعة للتأكد من أن الأدوية و/أو فوريكونازول يُتِفق لا تزال ذات التأثير المرغوب به.
- وارفارين ومضادات التخثر الأخرى (مثل فينبروكومون، أسينوكومارول)
- سيكلوسبورين، تاكروليموس (للمرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- أدوية من نوع سولفونيل يوريا (مثل تولبوتاميد، جليبيزيد وجليبيريد) (لعلاج السكري)
- ستياتينات (مثل أتورفاستاتين، سيسمفاستاتين، لوفاستاتين) (لخفض مستويات الكوليسترول)

- بينزوديازيبينات (مثل ميدازولام، الأيزولام وتريازولام) (لعلاج الأرق الشديد والتهدئة)
- أوميفرازول (لعلاج قرحة المعدة)
- حبوب منع الحمل (قد تتشأ أعراض جانبية مثل الغثيان والاضطرابات في الدورة الشهرية)
- مشقات فينكا (مثل فينكريستين، فينبلاستين) (لعلاج السرطان)
- مثبطات تيرورين كيناز (مثل: أكسيتينيب، بوسوتينيب، كابوزانتينيب، سيورينتينيب، كويمبينيديب، دابرافينيب، دازاتينيب، نيلوتينيب، سونيتينيب، إيبروتينيب، ريبوسكيليب) (لعلاج السرطان)
- تريبتينول (لعلاج بايضاض الدم)
- إيندينايفير والمثبطات الأخرى للإنزيم HIV بروتياز (لعلاج HIV)
- أدوية من فصيلة NNRTI لعلاج HIV (مثل ديلاقيردين، نيفيرابين، إيفافيرينز) (لا يمكن تناول جرعات دوامية معينة من إيفافيرينز مع فوريكونازول يُتِفق، انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند)
- ميتادون (لعلاج الإدمان)
- الأفيونات القوية الأمد (مثل أفيثانيل، فينتانيل، سوفينتانيل) (مسكنات للألام في الإجراءات الجراحية)
- أوكسيكودون وهيدروكودون (لتسكين الآلام المتوسطة إلى الشديدة)
- أدوية مضادة للتهاب لاستيرويدية (مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك) (لعلاج الآلام والتورم)
- فلوكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية)
- إيفيروليموس (لعلاج السرطان المتقدم في الكلية ومتلقي العلاج الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- لنتيرموفير (لمنع مرض يسببه الفيروس المضخم للخلايا (CMV) بعد زراعة النخاع العظمي)
- إيفاكافور (لعلاج التليف الكيسي (CF))
- فلوكوكساسيلين (مضاد حيوي يُستعمل لعلاج التلوثات الجرثومية)

للحصول على قائمة الأدوية التي لا يجوز استعمالها بالتزامن مع فوريكونازول يُتِفق، انظر رجاء "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، إلا إذا تقيت تعليمات صريحة من الطبيب. يجب على النساء في سن الخصوبة أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل أثناء استعمال الدواء. إذا حملت أثناء استعمال فوريكونازول يُتِفق فراجع الطبيب فورًا.

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فظنني أنك حامل أو تحظطين للحمل، فاستشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

السيفلة واستعمال الماكنتات

قد يسبب فوريكونازول يُتِفق توشُّشًا في الرؤية أو حساسية للشمس. إذا تأثرت من ذلك فلا يجوز السياقة أو تشغيل الماكنتات الخطرة بالنسبة للأولاد فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع مع أشباه ذلك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي القرص على اللاكوز، والكافيين، إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل استعمال الدواء.

يحتوي القرص على أقل من 1 ميليومول (23 ملغ) من الصوديوم، أي أنه يُعتبر "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط. سيتم تحديد الجرعة الدوائية استنادًا إلى وزنك وإلى نوع التلوث.

اعتمادًا على استجابتك للعلاج، قد يرفع الطبيب أو يخفض الجرعة الدوائية اليومية.

إذا كان لديك مرض في الكبد، فقد يقلل لك الطبيب الجرعة الدوائية.

يُمنَع تجاوز الجرعة الموصى بها!

إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل فوريكونازول يُتِفق لمنع التلوثات الفطرية، فقد يوجب الطبيب العلاج إذا نشأت لديك أو لدى

ولئك أعراض جانبية مترافقة للشمس نتيجة لتناول العلاج.

- يجب إعطاء الأقراص فقط إذا كان الولد قادرًا على بلع الأقراص.

يجب تناول القرص قبل وجبة الطعام بساعة أو بعدها بساعة على الأقل. يجب بلع القرص بأكمله مع القليل من الماء.

عند عدم وجود خط للشرط - يُمنَع شطر القرص. لا تتوفر معلومات بالنسبة للهرس/المضغ.

إذا تناولت خطأ جرعة دوامية أكبر من اللازم

إذا تناولت خطأ جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

قد تُشعر بحساسية مترافقة للشمس نتيجة لتناول المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء

من المهم تناول الدواء كل يوم في نفس الساعة.

إذا نسيت تناول دوي هذا الدواء في الوقت المحدد، تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

يجب الاستمرار في استعمال الدواء إلى أن يرشدك الطبيب إلى التوقف عن ذلك. إذا توقفت عن استعمال الدواء في وقت مبكر، فقد يستمر التلوث أو قد يعود. قد يتطلب الأمر علاجاتٍ طويلة الأمد لمنع معاودة التلوث لدى متلقي العلاج ذوي الجهاز المناعي المضعف أو المصابين بتلوثات صعبة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضِع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر

الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال فوريكونازول يُتِفق إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتفت عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية خطيرة - يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا إلى الطبيب في الحالات التالية:

- طفح جلدي
- يرقان؛ تغير في نتائج فحص وظائف الكبد في فحص الدم
- التهاب في البنكرياس (بانكرياتيتيس)
- أعراض جانبية أخرى**
- أعراض جانبية شائعة جدًا (قد تظهر لدى أكثر من شخص 1 من بين 10 أشخاص):
- خلل في الرؤية (تغيرات في الرؤية، بما في ذلك: رؤية مشوشة، تغيرات في الألوان، حساسية متزايدة للشمس، عمو الألوان، خلل في العين، رؤية هالة ضوئية، عمو ألبني، اهتزازية في الرؤية، رؤية شرشات، رؤية أورة، انخفاض في حدة الرؤية، إبهار ضوئي، تقلص مجال الرؤية، بقع/نقاط في مجال الرؤية)
- حُمى مرتفعة
- طفح جلدي
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- انتفاخ في الأطراف
- الأم البطن
- صعوبات في التنفس
- ارتفاع في أنزيمات الكبد
- أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 10 أشخاص):
- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب في اللثة، تشعيرية، ضعف مستوى منخض، يشمل المستوى المنخفض بشكل خطير، جزء من خلايا الدم الحمراء و/أو البيضاء (أحيانًا مصحوب بالحمى)، مستوى منخفض للصفائح الدموية التي تساعد على تخثر الدم
- مستوى منخفض للسكر في الدم، مستوى منخفض للبيوتاسيوم في الدم، مستوى ارتفاع للصوديوم في الدم
- قلق، تملل، اكتئاب، ارتباك، صعوبات في النوم، هلوسات اختلاجات، ارتجاف أو حركات لا إرادية في العضلات، إحساس بالخو أو إحاسيس جلدية غير عادية، ارتفاع في التوتر العضلي، ميل إلى الألام، نواز
- نزيف دموي في العين
- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك النبض السريع/البطيء جدًا، إغماء
- ضغط دم منخفض، التهاب الأوردة (التهاب الوريدي)
- صعوبات شديدة في التنفس، ألم في الصدر، انتفاخ في الوجه (الغم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين

- إمساك، صعوبات في الهضم، التهاب في الشفتين
- يرقان، التهاب في الكبد (هيباتيتيس) وتضرر الكبد
- سقوط جلدية قد تسبب تقشرًا خطيرًا في الجلد وحويصلات جلدية تتميز بمنطقة حمراء مسطحة في الجلد ومغطاة بتنوّات صغيرة متصلة بيضاء، احمرار الجلد
- تساقط الشعر
- ألم في الظهر
- فشل كلويّ، دم في البول، تغيرات في فحوص وظيفة الكليتين
- حروق شمسية أو رد فعل جلدي خطير نتيجة لتعرض للشمس أو الشمس
- سرطان الجلد

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص):

أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تيجح والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب في الجهاز الهضمي بسبب الإسهال، التهاب الأوعية الليمفاوية

التهاب في النسيج اللينق الموجود في الجدار الداخلي للبطن والذي يعطي التحريف البطني

عند ليفاوية متضخمة (أحيانًا مؤلمة)، فشل النخاع العظمي، ارتفاع في مستوى اليورينيات في الدم

انخفاض في وظيفة الغدة الكظرية، قصور الغدة الدرقية

وظيفة غير سوية للدماع، أعراض شبيهة بالباركينسون، تضرر عصبي بسبب الخدر، الألم، الوخز أو الإحساس

بالاحتراق في الأطراف

مشكلة في التوازن أو في التنسيق الحركي

انتفاخ في الماع

رؤية مزدوجة، حالات خطيرة في العين تشمل: ألمًا والتهابًا في العينين والأفجان، حركية غير عادية للعين، ضررًا للعصب البصري

الفرص البصري

انخفاض في الحساسية للمس

تغير في حسنة الذوق

اضطرابات في السمع، طنين في الأذنين، فيرتيجو (شعور بالدوار)

التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، انتفاخ والتهاب في اللسان

تضخم الكبد، فشل كبدي، حصى أو مرض في حويصلة المرارة

التهاب المفصل، التهاب الأوردة المصحوب بتكثُر خثرة دموية (خثار)

التهاب في الكلية، بروتين في البول، ضرر للكلية

نظم قلبي سريع جدًا أو إنقاص دقات - مصحوب أحيانًا بتدفعات كهربية غير ثابتة

تغيرات في مخطط كهربية القلب

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ارتفاع في مستوى اليوريا في الدم

رودود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحيانًا) بما في ذلك الحالات الجلدية التي تشكل خطرًا على الحياة وتسبب ظهور حويصلات مؤلمة، جروح/ثآليل في الجلد والأغشية المخاطية، خاصة في الفم، التهاب الجلد، شرى، جلد محمّر ومتيج، بقع حمراء أو بنفسجية في الجلد في أعقاب انخفاض تعداد الصفائح الدموية، إيكزما

رد فعل تحسسي أو رد فعل شاذ للجهاز المناعي

التهاب التسنج المحيط بالعظم

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 1,000 شخص):

فرط نشاط الغدة الدرقية

تدهور الوظيفة الدماغية (من المضاعفات الخطيرة لمرض في الكبد)

ضرر شديد للعصب البصري، تكسر في الرتنية، حركات لا إرادية للعينين

ظهور حويصلات نتيجة للحساسية/التعرض للشمس

اضطراب بهاجم فيه الجهاز المناعي في الجسم جزءًا من الجهاز العصبي المحيطي

مشاكل في نظم أو توصيلة القلب (أحيانًا تشكل خطرًا على الحياة)

رد فعل تحسسي يشكل خطرًا على الحياة

اضطراب في نظام التخثر في الدم

رودود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحيانًا) بما في ذلك الانتفاخ السريع (وذمة) في الجلد، بقع متيرة للحكة أو مؤلمة

من الجلد، حساسية المصمر مع القشرة، كحة في الجلد والأغشية المخاطية - حالة جلدية تشكل خطرًا على الحياة وتسبب انفصال أجزاء واسعة من الأدمة (طبقة الجلد الخارجية) عن طبقات الجلد الجلدية

بقع جلدية صغيرة، جافة وحرشفية، أحيانًا متغلطلة مع "قرون"

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد):

تمش وبقع تصمغ

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد)، لكنها مهمة ويجب التبليغ عنها للطبيب المعالج بشكل فوري:

مناطق حمراء ومتشعبة في الجلد أو كدمات في الجلد شكلها شبيهة بالقلقة وقد تكون عرضًا لمرض مناعي ذاتي يسمى الذئبة الحمامية الجلدية

تتواجد تبليغات عن تطور سرطان الجلد لدى متلقي العلاج الذين استعملوا فوريكونازول لفترة طويلة.

شوهد تغير شمسي أو رد فعل جلدي خطير، نتيجةً للتعرض للشمس أو الشمس، بشوع أكبر لدى الأولاد. إذا نشأت لديك/لدى ولدك اضطرابات في الجلد، فقد تتم متابعتها/إحالتها من قبل الطبيب

المعالج إلى طبيب الجلد، والذي سيقرر بعد المشورة ما إذا كان من المهم أن تخضرن/يخضرن ذلك للمتابعة بشكل منتظم. شوهد أيضًا ارتفاع في أنزيمات الكبد بشوع أكبر لدى الأولاد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

أمنه التسمم هذا الدواء، وآى دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع

وعن مجال ريتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Lactose monohydrate, pregelatinised maize starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol

كيف يتناول الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي، أبيض، مطوّل، على أحد جانبيه مطبوع "V" وعلى الجانب الآخر "200"

يسوق الدواء في عبوة بلبيسر (شرائط صلبات) تحتوي على 14، 28 أو 30 قرصًا مطليًا.

قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه:

تتِفق إسرائيل م.ض.

شارع بقرة هانيقيته 124، تل أبيب 6944020

خزرت النشرة في أب/أغسطس 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 168-68-36179-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المبذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

VORICONAZOLE TABS PİL MW0825