

## نورونتين™ 300، 400 ملغ، كبسولات

تحتوي كل كبسولة على 300 أو 400 ملغ جابابنتين (Gabapentin)، حسب النوع.

المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء - يرجى مراجعة البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

عليك قراءة النشرة بعناية حتى النهاية قبل استخدام الدواء. تتضمن هذه النشرة معلومات مختصرة حول الدواء. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، عليك التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.  
لقد وُصف هذا الدواء لك. لا يجوز إعطاء هذا الدواء إلى أشخاص آخرين. قد يلحق هذا الدواء الضرر بالآخرين حتى وإن بدا لك أن حالتهم الصحية مشابهة.

هذا الدواء مخصص لعلاج الصرع لدى البالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة. هذا الدواء مخصص لعلاج الألم العصبي لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

### 1. ما الغرض من استخدام الدواء؟

الصرع: كعلاج إضافي للنوبات الجزئية مع أو بدون تعميم ثانوي لدى البالغين والمراهقين (من عمر 12 سنة فما فوق) المصابين بالصرع.

الآلام العصبية: لعلاج الآلام العصبية في الاعتلال العصبي السكري أو الألم العصبي التالي للهربس (neuralgia) لدى البالغين.  
الفئة العلاجية: ينتمي الدواء إلى مجموعة الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع والألم العصبي المحيطي (ألم متواصل ناتج عن تضرر الأعصاب).

سيصف لك الطبيب نورونتين للمساعدة في علاج الصرع عندما لا يوفر العلاج الحالي الذي تحصل عليه تحكماً كاملاً في حالتك.

سيصف لك الطبيب نورونتين لعلاج الألم العصبي (ألم مزمن ناتج عن تضرر الأعصاب) بعد الإصابة بالهربس النطاقي أو بأعقاب مرض السكري لدى البالغين.

يمكن وصف الإحساس بالألم على أنه إحساس بالحرارة، إحساس بالحرق، ألم نابض، ألم مفاجئ، إحساس بالطنين، ألم حاد، تشنجات، إحساس باللسع، فقدان الإحساس، إحساس "دبابيس وإبر" وما شابه.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء في الحالات التالية:

إذا كانت لديك حساسية للمادة الفعالة (جابابنتين) أو لأي واحد من المكونات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (الرجاء مراجعة البند 6).

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل تلقي العلاج بنورونتين، أخبر طبيبك إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في الكلى، قد يقوم الطبيب بتغيير برنامج العلاج.
- كنت تتلقى علاجًا بالغسيل الكلوي (للتخلص من الفضلات بأعقاب القصور الكلوي). أخبر الطبيب إذا شعرت بألم و/أو ضعف في العضلات.
- ظهرت لديك أعراض مثل آلام البطن المستمرة، الغثيان التقيؤ. راجع الطبيب فوراً، فقد تكون هذه أعراض التهاب حاد في البنكرياس.
- كنت تعاني من اضطرابات في الجهاز العصبي، اضطرابات في التنفس، أو إذا كنت فوق سن 65 عاماً. قد يصف لك الطبيب نظام جرعات مختلف.
- سبق لك أن أسأت استخدام الكحول، الأدوية الموصوفة طبيًا أو المواد المخدرة غير القانونية أو كنت معتمداً عليها؛ فقد تكون معرضاً بشكل متزايد لخطر الإدمان على نورونتين.

### الاعتماد على الدواء

قد يتطور لدى بعض الأشخاص اعتماد على نورونتين (أي الشعور بالحاجة إلى مواصلة تناول الدواء). قد تظهر أعراض الانسحاب عند التوقف عن استخدام الدواء (راجع البند 3 - "كيفية استخدام الدواء" ضمن البند "إذا توقفت عن تناول الدواء"). إذا كانت لديك مخاوف بشأن احتمال تطوّر اعتماد على نورونتين، من المهم أن تستشير الطبيب.  
إذا لاحظت واحداً أو أكثر من العلامات التالية أثناء العلاج، فقد تكون قد طورت اعتماداً على الدواء:

- تشعر بالحاجة إلى تناول الدواء لمدة أطول مما أوصى به الطبيب.
  - تشعر بالحاجة إلى تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها.
  - تستخدم الدواء لأغراض غير تلك التي وُصف من أجلها.
  - حاولت دون نجاح التوقف عن استخدام الدواء أو السيطرة على الجرعة.
  - تشعر بتوسعك عند التوقف عن تناول الدواء، وتشعر بتحسّن عندما تبدأ بتناوله مرة أخرى.
- إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات – راجع الطبيب لمناقشة طرق العلاج المناسبة، بما في ذلك متى وكيف يمكن وقف العلاج بطريقة آمنة.

عانى عدد صغير من المرضى الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل **نورونتين** من أفكار انتحارية أو أفكار حول إيذاء النفس. إذا راودتك مثل هذه الأفكار، تواصل مع الطبيب على الفور.

#### معلومات هامة حول ردود فعل خطيرة محتملة

هناك تقارير حول حالات طفح جلدي خطير مرتبطة باستخدام جابابنتين تشمل متلازمة ستيفنز-جونسون، تقشر الأنسجة المتموتة البشروية التسمي (Toxic Epidermal Necrolysis) والتفاعل الدوائي المصحوب بكثرة اليوزينيّات وأعراض جهازية (DRESS). ينبغي وقف استخدام جابابنتين والتوجه فورًا لتلقي رعاية طبية إذا لاحظت أيًا من الأعراض المرتبطة بردود الفعل الجلدية الخطيرة المفصلة في البند 4.

**يجب قراءة وصف الأعراض الخطيرة في البند 4** تحت البند الفرعي "يجب التوجه إلى الطبيب فورًا إذا ظهر لديك أحد الأعراض التالية بعد تناول الدواء، لأنها قد تكون خطيرة".

اتصل بالطبيب فورًا في حالات الضعف، الحساسية أو الألم في العضلات، خاصة إذا كنت تشعر في نفس الوقت بالمرض أو لديك حرارة مرتفعة. قد تكون هذه علامات تحلل عضلي غير سليم قد يشكل خطرًا على الحياة ويؤدي إلى مشاكل في الكلى. بالإضافة إلى ذلك، قد يتغير لون البول وقد تظهر تغييرات في نتائج فحص الدم (ارتفاع ملحوظ في مستويات فوسفوكيناز الكرياتين في الدم).

#### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية لا تتطلب وصفة طبية ومكملات غذائية، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك. وخاصة إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا ما يلي:

- أدوية لعلاج الاختلاجات، اضطرابات النوم، الاكتئاب، القلق أو أي المشاكل العصبية أو النفسية الأخرى.
- أدوية من فئة الأفيونات مثل المورفين – قد تُعزز من تأثير **نورونتين**. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الدمج بين **نورونتين** والأفيونات إلى النعاس، التعب (التهديئة)، انخفاض وتيرة التنفس أو الوفاة.
- مضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم والمغنيسيوم – قد يؤدي تناولها في نفس الوقت مع **نورونتين** إلى انخفاض في امتصاص **نورونتين** من المعدة. لذلك، يوصى بتناول **نورونتين** بعد ساعتين على الأقل من تناول مضادات الحموضة.

من غير المتوقع أن يؤثر **نورونتين** على فعالية الأدوية الأخرى المضادة للاختلاجات أو حبوب منع الحمل. قد يؤثر **نورونتين** على نتائج فحوصات مخبرية معينة. إذا طلب منك تقديم عينة بول، أخبر الطبيب أو الطاقم الطبي عن جميع الأدوية التي تتناولها.

#### استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

#### الحمل، الرضاعة والخصوبة

- إذا كنتِ حاملًا أو تظنين أنك حامل، يجب مراجعة الطبيب فورًا ومناقشة المخاطر المحتملة التي قد يشكلها الدواء على الجنين.
- لا يجوز وقف العلاج دون استشارة الطبيب.
- إذا كنتِ تخططين للحمل، عليك استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن قبل حدوث الحمل.
- إذا كنتِ ترضعين أو تخططين للرضاعة، استشيري طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

#### الحمل

يمكن استخدام **نورونتين** خلال الثلث الأول من الحمل بموجب الحاجة. إذا كنتِ تخططين للحمل، إذا كنتِ حاملًا أو تظنين أنك حامل، تحدثي مع طبيبك على الفور. إذا حملتِ وكنتِ تعانين من الصرع، من المهم ألا تتوقفي عن تناول الدواء دون استشارة طبيبك أولاً، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مرضك وظهور الاختلاجات من جديد. قد يشكل تفاقم الصرع خطرًا عليك وعلى جنينك.

في دراسة استعرضت بيانات نساء في دول شمال أوروبا اللواتي تناولن **نورونتين** خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لم يظهر خطر متزايد للتشوهات الخلقية أو مشاكل في تطور وظائف الدماغ (اضطرابات في التطور العصبي). ومع ذلك، تبين أن أطفال النساء اللواتي تناولن **نورونتين** أثناء الحمل كانوا معرضين لخطر متزايد لوزن منخفض بالولادة وللولادة المبكرة.

عند استخدامه أثناء الحمل، قد يؤدي جابانتين إلى ظهور أعراض انسحاب لدى المواليد الجدد. وقد يزداد هذا الخطر عند تناول جابانتين مع المسكنات الأفيونية (أدوية لعلاج الألم الشديد).

### الرضاعة

ينقل جابانتين، المادة الفعالة في **نورونتين**، إلى حليب الأم. بما أن تأثيره على الطفل غير معروف، يوصى بعدم الإرضاع أثناء تناول الدواء.

### الخصوبة

في الأبحاث التي أجريت على الحيوانات، لم يُلاحظ أي تأثير على الخصوبة.

### السياقة واستخدام الماكينات

قد يسبب استخدام هذا الدواء الدوخة، النعاس والتعب. عليك الامتناع عن القيادة، تشغيل الآلات أو ممارسة أنشطة أخرى قد تكون خطيرة حتى تتأكد من كيفية تأثير الدواء عليك وعلى قدرتك على أداء هذه المهام. أما بالنسبة للأطفال، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو اللعب بالقرب من الشارع، وما إلى ذلك.

### معلومات هامة عن بعض مكونات الدواء

يحتوي **نورونتين** على اللاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمل لأنواع معينة من السكريات، يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميلي مول من الصوديوم (23 ملغ) لكل كبسولة، أي أنه فعليًا "خالٍ من الصوديوم".

## **3. كيف تستخدم الدواء؟**

ينبغي دائمًا استخدام الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب. يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة وكيفية تلقي العلاج بالدواء.

يتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.

الجرعة المتبعة بشكل عام هي كالتالي:

يجب استخدام هذا الدواء في أوقات منتظمة كما حدد الطبيب.

عادة ما تُعطى الجرعة التي يحددها الطبيب بشكل تدريجي. تتراوح الجرعة الابتدائية ما بين 300 ملغ إلى 900 ملغ يوميًا. بعد ذلك، قد يطلب منك الطبيب زيادة الجرعة، حتى تصل إلى الجرعة اليومية القصوى التي تبلغ 3600 ملغ، مقسمة إلى 3 جرعات منفصلة، أي مرة في الصباح، مرة في ساعات الظهر ومرة في المساء.

هذا الدواء مخصص لعلاج الصرع لدى البالغين والمراهقين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة.

هذا الدواء مخصص لعلاج الألم العصبي لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

**إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو تخضع لغسيل الكلى**

قد يصف لك الطبيب جرعة و/أو نظام جرعات مختلفًا.

**إذا كنت فوق سن 65 عامًا**

عليك تناول جرعة **نورونتين** المتبعة إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى. قد يصف لك الطبيب جرعة و/أو نظام جرعات مختلفًا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

إذا لاحظت أن تأثير الدواء قوي للغاية أو ضعيف للغاية، اتصل بالطبيب أو الصيدلي على الفور. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

### كيفية تناول الدواء

ينبغي دائمًا بلع الكبسولة كاملة مع كمية كبيرة من الماء.

يُمنع فتح ونثر محتوى الكبسولة لأنه لم يتم فحص تأثير هذه الطريقة لإعطاء الدواء.

يوصى بتناول **نورونتين** بعد ساعتين على الأقل من تناول مضادات الحموضة.

يجب مواصلة تناول **نورونتين** حتى يطلب الطبيب منك أن تتوقف.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر  
إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه على الفور إلى الطبيب أو قسم الطوارئ في  
المستشفى وإحضار علبة الدواء معك.  
قد يؤدي تناول جرعة زائدة إلى زيادة الأعراض الجانبية التي تتضمن فقدان الوعي، الدوار، الرؤية المزدوجة، عدم وضوح الكلام،  
النعاس والإسهال.

**إذا نسيت تناول الدواء**  
إذا نسيت تناول هذه الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة فور تذكرك، إلا إذا حان موعد الجرعة التالية. لا يجوز تناول  
جرعة مضاعفة في أي حال من الأحوال للتعويض عن الجرعة المنسية.  
يجب الالتزام بالعلاج كما أوصى به الطبيب.  
حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز وقف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

**إذا توقفت عن تناول الدواء**  
لا تتوقف عن تناول الدواء إلا بموجب تعليمات من الطبيب. إذا كان عليك وقف العلاج، يجب القيام بذلك تدريجيًا على مدار أسبوع  
على الأقل. إذا توقفت عن تناول الدواء بشكل مفاجئ أو قبل أن يطلب منك الطبيب ذلك، فسوف يرتفع خطر حدوث الاختلاجات.  
بعد التوقف عن استخدام نورونتين سواء لفترة علاج قصيرة أو طويلة، قد تعاني من أعراض جانبية معينة، تسمى أعراض  
الانسحاب. وقد تشمل هذه الأعراض الاختلاجات، القلق، صعوبة النوم، الغثيان، الألم، التعرق، الرجفة، الصداع، الاكتئاب، شعور  
غريب، الدوخة وشعور عام بالمرض. عادةً ما تظهر هذه الأعراض خلال 48 ساعة بعد التوقف عن تناول الدواء. إذا شعرت  
بأعراض الانسحاب، عليك مراجعة طبيبك.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول استخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع كل دواء، قد يسبب استخدام نورونتين أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة  
الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي منها.

ينبغي وقف الاستخدام والتوجه فورًا إلى الطبيب إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:  
● يقع تشبه شكل الهدف أو دائرية حمراء غير مرتفعة تكون على جذع الجسم، غالبًا مع بثور في الوسط، تقشر الجلد، تقرحات  
في الفم، الحلق، الأنف، الأعضاء التناسلية والعينين. قبل ظهور هذا الطفح الجلدي الخطير، قد تظهر حرارة وأعراض تشبه  
الإثفلونزا (متلازمة ستيفنز-جونسون أو تقشر الأنسجة الممتوتة البشرية التسممي).  
● طفح جلدي منتشر، ارتفاع درجة حرارة الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS - متلازمة فرط الحساسية  
للأدوية).

يجب التوجه إلى الطبيب فورًا إذا ظهر لديك أحد الأعراض التالية بعد تناول الدواء، لأنها قد تكون خطيرة:  
● ألم متواصل في البطن، غثيان وتقيؤ - فقد تكون أعراض التهاب حاد في البنكرياس.  
● مشاكل في التنفس، وفي الحالات الخطيرة قد تحتاج علاجًا طارئًا من أجل مواصلة التنفس بشكل طبيعي.  
● قد يسبب نورونتين رد فعل تحسسي خطير أو مهدد للحياة، وقد يؤثر على الجلد أو على أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو  
خلايا الدم. قد يظهر طفح جلدي كجزء من رد الفعل هذا، وقد لا يظهر. قد يؤدي رد الفعل هذا إلى دخولك المستشفى أو إلى وقف  
تناول نورونتين. اتصل بالطبيب فورًا إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:

- طفح جلدي واحمرار الجلد و/أو تساقط الشعر
- الشرى
- الحرارة
- تورم في الغدد لا يختفي
- تورم الشفتين، الوجه واللسان
- اصفرار الجلد أو بياض العينين
- ظهور كدمات أو نزيف غير معتاد
- التعب أو الضعف الشديد
- ألم عضلي غير متوقع
- عدوى متكررة

قد تكون هذه الأعراض علامات مبكرة لرد فعل شديد. يجب أن يفحصك الطبيب ويقرر ما إذا كان بإمكانك الاستمرار في تناول  
الدواء.

● إذا كنت تتلقى علاجًا بغسيل الكلى، أخبر الطبيب إذا شعرت بألم و/أو ضعف في العضلات.

## الأعراض الجانبية الإضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

- عدوى فيروسية
- شعور بالنعاس، دوام، فقدان التنسيق الحركي
- شعور بالتعب، حرارة

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):

- التهاب رئوي، عدوى في جهاز التنفس، عدوى في المسالك البولية، التهاب في الأذنين أو عدوى أخرى
- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء
- فقدان الشهية، زيادة الشهية
- غضب تجاه الآخرين، ارتباك، تغييرات في المزاج، اكتئاب، قلق، عصبية، صعوبة التفكير
- اختلاجات، حركات لا إرادية، صعوبات في الكلام، فقدان الذاكرة، رجفة، صعوبات في النوم، صداع، حساسية الجلد، فقدان الإحساس، صعوبات في التنسيق الحركي، حركات غير طبيعية للعينين، زيادة، ضعف أو غياب المنعكسات
- عدم وضوح الرؤية، رؤية مزدوجة
- دوخة (vertigo)
- ضغط الدم المرتفع، احمرار الوجه أو توسع الأوعية الدموية
- صعوبات في التنفس، التهاب الشعب الهوائية، ألم في الحلق، سعال، جفاف الأنف
- تقيؤ، غثيان، مشاكل في الأسنان، التهاب اللثة، إسهال، ألم في البطن، اضطراب في المعدة، إمساك، جفاف الفم أو الحلق، غازات
- تورم الوجه، كدمات، طفح جلدي، حكة، حب الشباب
- ألم في المفاصل، ألم في العضلات، ألم في الظهر، تشنجات
- العجز الجنسي لدى الرجال
- تورم في الساقين والذراعين، صعوبات في المشي، ضعف، ألم، شعور بالمرض، أعراض تشبه الإنفلونزا
- انخفاض في كمية خلايا الدم البيضاء، زيادة الوزن
- إصابة عرضية، كسر، كشط
- في الدراسات السريرية على الأطفال، تم الإبلاغ عن سلوك عدواني وحركات نفضية

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 1,000):

- اضطراب (حالة من التملل المزمّن وحركات غير مقصودة وغير هادفة)
- رد فعل تحسسي مثل الشرى
- انخفاض في الحركة
- نبض سريع
- صعوبة في البلع
- تورم قد يشمل الوجه والجسم والأطراف
- نتائج غير طبيعية في فحوص الدم تشير إلى مشاكل في الكبد
- مشاكل نفسية
- حالات السقوط
- ارتفاع في مستوى الجلوكوز في الدم (يُلاحظ غالبًا لدى المرضى المصابين بالسكري)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 10,000):

- انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم (يُلاحظ غالبًا لدى المرضى المصابين بالسكري)
- فقدان الوعي
- صعوبات في التنفس، تنفس سطحي (كبت تنفسي)

أعراض جانبية تم الإبلاغ عنها بعد تسويق الدواء وشيوعها غير معروف (أعراض جانبية لم يتم تحديد شيوعها بعد):

- انخفاض في مستوى الصفائح الدموية
- أفكار انتحارية، هلوسات
- حركات جسم غير طبيعية مثل التلوي، حركات لا إرادية والتصلب
- طنين في الأذنين
- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)، التهاب الكبد
- قصور كلوي حاد، سلس البول
- تضخم نسيج الثدي، تضخم الثديين

- الأعراض الجانبية الناتجة عن وقف تناول الجابابنتين بشكل مفاجئ (قلق، صعوبات في النوم، غثيان، ألم، تعرق)، ألم في الصدر
- تحلل ألياف العضلات (Rhabdomyolysis)
- تغيير في نتائج فحص الدم (ارتفاع في مستويات فوسفوكيناز الكرياتين)
- مشاكل في الأداء الجنسي تشمل عدم القدرة على الوصول إلى إشباع جنسي، تأخير القذف
- مستوى صوديوم منخفض في الدم
- التأتق (رد فعل تحسسي خطير ومهدد للحياة، يشمل صعوبات التنفس، تورم الشفتين والحلق واللسان، انخفاض ضغط الدم مما يتطلب علاجًا طارئًا)
- تطور اعتماد على نوروبنتين (اعتماد دوائي)

بعد التوقف عن استخدام نوروبنتين سواء لفترة قصيرة أو طويلة، قد تعاني من أعراض جانبية معينة، تسمى أعراض الانسحاب (الرجاء مراجعة البند "إذا توقفت عن تناول الدواء").

إذا ظهر أو تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية من خلال الضغط على رابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) والذي يوجهك للنموذج الإلكتروني للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو من خلال دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف ينبغي تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول الأولاد/الأطفال ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقبيل بدون تعليمات واضحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp.). الموضح على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من ذلك الشهر.
- شروط التخزين: يجب حفظ الدواء في مكان جاف، تحت درجة حرارة 25 مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو في سلة المهملات المنزلية. اسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستخدام. سوف تساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Gelatin, lactose monohydrate, maize starch, talc, water, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), sodium lauryl sulphate, shellac, indigocarmine aluminium salt (E132).

كبسولات نوروبنتين 400 ملغ تحتوي أيضًا على:

Red iron oxide (E172)

ما هو شكل الدواء وما هي محتويات العبوة:

- نوروبنتين 300 ملغ: كبسولة باللون الأصفر، مطبوع على الجزء العلوي "Neurontin 300" وعلى الجزء السفلي "VLE".
  - نوروبنتين 400 ملغ: كبسولة باللون البرتقالي، مطبوع على الجزء العلوي "Neurontin 400" وعلى الجزء السفلي "VLE".
- أحجام العلب المصادق عليها: 10، 50 و- 100 كبسولة. قد لا تسوق جميع أحجام العلب.

تم تحرير النشرة في تموز 2025 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

نوروبنتين 300 ملغ: 125-05-30497-00

نوروبنتين 400 ملغ: 125-06-30498-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للجنسين.

المصنّع وصاحب التسجيل: دكسل م.ض.، شارع دكسل 1، أور عاكيفا 3060000، إسرائيل