

| <div><span><span></span></span></div>                        | <div><b>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986</b> <p>התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד</p></div> |
|--|---|
| <div> <div><div><span><span></span></span></div></div></div> |   |
| <div><b>טבליות</b></div>                                     |   |
| <div><b>הרכב:</b></div>                                      |   |

כל טבליה מצופה מכילה:

לבוֹפלוֹקסצין (הכמהידראט) 500 mg
Levofloxacin (as hemihydrate) 500 mg
לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלורגים בתכשיר אנא ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה", וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את האת עליו עד סופו בטרם שתשתמש בתרופה.**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש של שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקל להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים או למתבגרים.

## 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול במבוגרים, ביהומים הבאים:

• דלקת חריפה בכלית בלוגת הכליה וזיהומים מורכבים בדרכי השתן
• דלקת חיידקית של כליות בעמדת הערמונית, כאשר הזיהום מתמשך

יש להשתמש ב**לבד** רק כאשר לא מתאים להשתמש בחומרים אנטיביוטיים אחרים מומלצים בדרך כלל, לטיפול בזיהומים הבאים:

- סינוסיטיס חיידקית חריפה
- המחלות חריפות של מחלת ריאות חסימתית כרונית, כולל ברונכיטיס
- דלקת ריאות (מהדבק בקהילה)
- זיהומים מורכבים בעור וברקמות רכות.

ניתן להשתמש ב**לבד** גם להשלמת הטיפול בחולים שהראו שיפור במהלך התהליך הראשוני בלבופולקסצין בלבחן תוך-וריד.

**קבוצה פרופיטית:**
אנטיביוטיקה שהיכת למשפחת ה"פלוואורוקוולונים".

## 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) ללבופולקסצין, לכל אנטיביוטיקה אחרת משפחת הקווינולונים כגון מוקסיפולקסצין, ציפרולקסצין או אולקוסקסצין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

סימנים לגובה אלרגיה כוללים: פריחה, בעיות בבליעה או בשמימה, נפיחות בשפתיים, כפינים, בלגון או בלבול.

היך סובל או סבלת בעבר ממחלת הנפילה (אפילפסיה).

היך נכבד או סבלת בעבר מבעיות בגידים כגון דלקת בגידים, שנבעו מטיפול באנטיביוטיקה מקבוצת ה"קווינולונים". הגיד מתחב בין השריר והעצם.

היך ידל או נער מחבגר.

היך בהריון, עשויה להיכנס להריון או חושבת שהיך בהריון.

היך מניקה.

היך טיול את התרופה אם אחד מהמצבים מעלה מתייחס אליך. אם אינך בטוח, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת לבד.

**אזהרות מיוחדות לגבינו, ספר לרופא אם:**

- היך בן 60 שנים או יותר.

היך נוטל תרופה ממשפחת הקורטיקוסטרואידים, הנקראות לפעמים סטרואידים (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות").

- עברת השתלה.
- סבלת אי פעם מפרוס.
- סבלת מזק מוור עקב שבץ או פגיעה מוחית אחרת.
- יש לך בעיות בכליות.

היך סובל מחוסר באנזים G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency), קיים סיכוי גבוה שתסבל מבעיות חמורות בדם בעת שתיטול תרופה זו.

היך סובל או סבלת בעבר מבעיות בריאותיות נפשיות.

היך סובל או סבלת בעבר מבעיות לב. יש לנקוט זהירות כשנוטלים תרופה זו אם נולדת עם או שיש היסטוריה משפחתית של הארכת מקטע QT (המצפה בבדיקת ECG, רישום הפעילות החשמלית של הלב), אם היך סובל מחוסר איוון במלחים בדם (במיוחד רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם), אם קצב הלב שלך איטי מאוד (נקרא "ברדיקרדיה"), אם יש לך אי ספיקת לב, אם חוותי בעבר אוטם שריר הלב (התקף לב), אם היך אשה או קישה או אם היך נוטל תרופות אחרות הגורמות לשינויים לא תקינים ב- ECG (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות").

היך סובל או סבלת בעבר מבעיות כבדב.
יש לך מחלה הגורמת לחולשת שרירים חמורה (מיאסטיניה גרביס, myasthenia gravis).
יש לך בעיות במערכת הלב (heart failure).
אובחנת עם מחלת אבליטה של כלי דם גדול (מפרצת באבי העורקים או מפרצת פרפיראלית של כלי דם גדול).

הייתה לך בעבר דיסקפיה של אבי העורקים (קעקע בדופן אבי העורקים).
אובחנת עם מסתמי לב דולפים (heart valve regultation).
יש לך היסטוריה משפחתית של מפרצת באבי העורקים או דיסקפיה של אבי העורקים או מחלת מסתמי בולדת או גורמי סיכון אחרים:
אם מצבים אחרים המגבירים את הסייגיה להיווצרות (לדוגמה: הפרעות עינת הקמת החיבור בגון תסמונת מירפ, תסמונת אהלרס-דלוס, תסמונת טרנר, תסמונת סיורגן [מחלה אוטואימונית דלקתית או הפרעות וסקולריות כגון דלקת עורקים על שם טקאיאסו, דלקת עורקים של הפרקה, מחלת כבצט, יתר לחץ דם, או טרשת עורקים ידועה או דלקת מפרקים גורנית [מחלת מפרקים] או דלקת פנים יחבת [Endocarditis]).

כאב ונפיחות ממפרקים ודלקת או קרע בגידים פעילים להופיע לעיתים נדירות.
הסיכון שלך מוגבר אם אתה שוק (מעל גיל 60), עברת השתלת איברים, סובל מבעיות בכליות או אם אתה מטפל בקורטיקוסטרואידים.

דלקת וקרעים בגידים פעילים להתרחש חתן 48 השעות הראשונות של הטיפול ואפילו עד מספר חודשים לאחר הפסקת הטיפול בלבד.
בסימן הראשון לכאב או לדלקת בגיד (למשל בקרסולך, בפרק כף היד, במרפק, בכתף או בברך), הפסק לטיל לבד, צור קשר עם הרופא שלך ותן מנוחה לאזור הכואב. הימנע מכל פעילות גופנית מיותרת שכן הדבר עלול להגביר את הסיכון לקרע בגיד.

לעיתים חרוקות היך עלול לחוות תסמינים של נזק עצבי (ניורופתיה) כמו כאב, צריבה, קצפוצים, חוסר תחושה /או חולשה, במיוחד ברגליים, כפפות הרגליים או בידיים ובזרועות. אם הדבר קורה, יש להפסיק לטיל **לבד** ולהודיע לרופא באופן מיידי, על מנת למנוע התפתחות של מצב שעלול להיות בלתי הפיך.

**תגובות עוריות חמורות**

דיזוןח עם תגובות עוריות חמורות הקרויים (TEN), תסמונת התגובה התרופתית עם אאזינופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS), ופוסטטוליום חריפה כליתת אקסנתמטוס (exanthematous pustulosis) – acute AGEP – pustulosis) הקשקבל בשמיש לבופולקסצין.

SJS/TEN יכול להופיע בתחילה ככתמים אדמדםים דמויי מטרה או כתמים עגולים לעיתים קרובות עם שלפוחיות במרכזם. כמו כן יכולים להופיע כיבים של הפה, הגרון, האף, איברי המין והעיניים (עיינים אדומות ופוחתות).
את פריחות העור החמורות אלה מקדמים לרוב חום ו/או תסמינים דמויי שפעת. הפריחות עלולות להתפתח לקילוף נרחב של העור ולסיבוכים מסכני חיים אם להיות קטלניות.

תסמונת DRESS מופיעה בתחילה כתסמינים דמויי שפעת ופריחה על הפנים אך פריחה מורחבת עם תסמפטרות נגד גבוהה, עלייה ברמות אנזימי הכבד והנפיצת בבדיקות דם ועלייה בסוג של תאי דם לבנים (אוזינופיליה) ובלוטות מוגדלות.

פריחה אדומה וקשקשית נרחבת עם גליטות מחת לעור (כולל כפפלי העור, בחוץ, בבטן [כולל ארסון], בגב ובזרועות), במחלות המלווה המולה בחום, התסמינים מופיעים בדרך כלל בתחילת הטיפול (פוסטוליום חריפה כליתת אקסנתמטית [exanthematous pustulosis) – acute AGEP – acute generalized).

פריחה אדומה וקשקשית נרחבת עם גליטות מחת לעור (כולל כפפלי העור, בחוץ, בבטן [כולל ארסון], בגב ובזרועות), במחלות המלווה בחום, התסמינים מופיעים בדרך כלל בתחילת הטיפול (פוסטוליום חריפה כליתת אקסנתמטית [exanthematous pustulosis) – acute AGEP – acute generalized).

פנה אל הרופא או הרוקח לפני נטילת לבד.

התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** זאת כיוון שהפעילות כלשהי המתייחדת רמה גבוהה של השמות לב.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגראם נתרן (23 mg) בכל טבליה, כלומר היא נחשבת "נטולת נתרן".

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול ואופן הכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
המינון תלוי בסוג הזיהום שיש לך ובמיקומו בגוף.
פי עי חומרת הזיהום יקבע משך הטיפול.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

**יש להפסיק את השימוש בלבד ולפנות מייד לרופא אם היך מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות – ייתכן שתדקק לטיפול רפואי דחוף:**

**תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמים מתוך 10,000:**

- שלשול שמימי, אשר עלול להיות דממי, ייתכן שמלווה בהתכווציות בבטן וחום גבוה.
- אלו עלולים להיות מסתמים של בעיה חמורה במעיים.
- כאב או דלקת בגידים או ברצועות, אשר עלולים להוביל לקריעתם.
- גיד האכילס הוא המושפע לרוב.

- פרכוסים.

- ראיית או שמיעת דברים שאינם קיימים (היזית, פרנויה).
- תחושת דיכאון, בעיות נפשיות, תחושת חוסר שקט, חלומות מהררים או סוטים.

היך על עורך מפני השמש
**אם היך כבר נוטל טבליות ברזל, תוספי אבץ, סותרי חומצה, דיאזנחין או סוכרלאפטא,** אין לקחת תרופות אלה באותו זמן עם **לבד**. יש להכות פרק זמן של שעותיים לפחות לפני או לאחר נטילת לבד.

**ספר לרופא שלך אם אחד מהמצבים לעיל מתייחס אליך.**

**תופעות לוואי חמורות ממושכות, גורמות/למוגבלות והעוללות להיות בלתי הפיכות**

תרופות אנטי בקטריאליות מסוג פלוואורוקויונולן/קווינולון, כולל **לבד**, הן שקולות לתופעות לוואי נדירות מאוד אך חמורות, לוקח אורכות טווח (שמשמכות חודשים או שנים), הגורמות לגמולות או עלולות להיות בלתי הפיכות. הדבר כולל כאבי גידים, שרירים מופרקים של הנויים העליונות והתחתונים, קושש בהליכה, תחושות חריגות המתארות כדקירות סיכות מוחיות, קצפוצים, גדגוג, קרחת או צריבה באברי המרה, הפרעות חישיות כולל פגיעה רגלית, בטעם ובריחה, בשמימה, דיכאון, ליקוי ביזרון, ייעויות קשה והפרעות שינה קשות.

אם אתה חווה את תופעות הלוואי הללו לאחר נטילת **לבד**, פנה לרופא מייד לפני המשך הטיפול. אתה והרופא שלך חלשתי על המושך הטיפול בהתפתח גם באפשרות נטילת אנטיביוטיקה מקבוצה אחרת.

תרופות ממשפחת הפלואורוקויונולונים, כולל **לבד**, עלולות לגרום להחמרה של התסמינים של מחלת מיאסטיניה גרביס (myasthenia gravis) כגון החמרת חולשת השרירים או בעיות בנשימה – **אם היך חש בתופעות אלו פנה לרופא מייד.**

אם אינך בטוח אם אתה מאוזנת לעיל מתייחסת אליך, פנה אל הרופא או הרוקח לפני נטילת לבד.

היך סוכרת ממושכת ובתכשירים נוגדי סוכרת פומיים או אינסולין

יש לעקוב אחר רמת הסוכר בדידים.

**שימוש בתרופה ומזון**

ניתן לטיל את התרופה עם הארוחה או בכל זמן בין הארוחות.

### הריזון והקנה

אין להשתמש ב**לבד** אם:

היך בהריון, עשויה להיכנס להריון או חושבת שהיך בהריון.

היך מניקה או מתכננת להניק.

**נהיגה ושימוש במכוונות**

היך עלול לסבול מתופעות לוואי לאחר נטילת תרופה זו הכוללות תחושת של סחרחורת, שנוניות, תחושת סחרור (ורטגו) או שינויים בראייה. חלק מתופעות לוואי אלו עלולות להשפיע על היכולת שלך להתרכז ועל תגובות ההגובה שלך. אם זה קורה, אין לנהוג או לעסוק בפעילות כלשהי המתייחדת רמה גבוהה של השמות לב.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגראם נתרן (23 mg) בכל טבליה, כלומר היא נחשבת "נטולת נתרן".

**נהיגה ושימוש במכוונות**

היך עלול לסבול מתופעות לוואי לאחר נטילת תרופה זו הכוללות תחושת של סחרחורת, שנוניות, תחושת סחרור (ורטגו) או שינויים בראייה. חלק מתופעות לוואי אלו עלולות להשפיע על היכולת שלך להתרכז ועל תגובות ההגובה שלך. אם זה קורה, אין לנהוג או לעסוק בפעילות כלשהי המתייחדת רמה גבוהה של השמות לב.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגראם נתרן (23 mg) בכל טבליה, כלומר היא נחשבת "נטולת נתרן".

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**לבד** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות אלו הן בדרך כלל קלות או כיוניות ולעיתים קרובות נעלמות לאחר זמן קצר.

המינון תלוי בסוג הזיהום שיש לך ובמיקומו בגוף.
פי עי חומרת הזיהום יקבע משך הטיפול.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

**יש להפסיק את השימוש בלבד ולפנות מייד לרופא או לבית חולים אם היך סובל מתופעות הלוואי הבאות:**

**תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמופיעות ב-10,000 משתמשים מתוך 10,000:**

- שלשול שמימי, אשר עלול להיות דממי, ייתכן שמלווה בהתכווציות בבטן וחום גבוה.
- אלו עלולים להיות מסתמים של בעיה חמורה במעיים.
- כאב או דלקת בגידים או ברצועות, אשר עלולים להוביל לקריעתם.
- גיד האכילס הוא המושפע לרוב.

- פרכוסים.

- ראיית או שמיעת דברים שאינם קיימים (היזית, פרנויה).
- תחושת דיכאון, בעיות נפשיות, תחושת חוסר שקט, חלומות מהררים או סוטים.

היך על עורך מפני השמש
**אם היך כבר נוטל טבליות ברזל, תוספי אבץ, סותרי חומצה, דיאזנחין או סוכרלאפטא,** אין לקחת תרופות אלה באותו זמן עם **לבד**. יש להכות פרק זמן של שעותיים לפחות לפני או לאחר נטילת לבד.

**ספר לרופא שלך אם אחד מהמצבים לעיל מתייחס אליך.**

**תופעות לוואי חמורות ממושכות, גורמות/למוגבלות והעוללות להיות בלתי הפיכות**

תרופות אנטי בקטריאליות מסוג פלוואורוקויונולון/קווינולון, כולל **לבד**, הן שקולות לתופעות לוואי נדירות מאוד אך חמורות, לוקח אורכות טווח (שמשמכות חודשים או שנים), הגורמות לגמולות או עלולות להיות בלתי הפיכות. הדבר כולל כאבי גידים, שרירים מופרקים של הנויים העליונות והתחתונים, קושש בהליכה, תחושות חריגות המתארות כדקירות סיכות מוחיות, קצפוצים, גדגוג, קרחת או צריבה באברי המרה, הפרעות חישיות כולל פגיעה רגלית, בטעם ובריחה, בשמימה, דיכאון, ליקוי ביזרון, ייעויות קשה והפרעות שינה קשות.

אם אתה חווה את תופעות הלוואי הללו לאחר נטילת **לבד**, פנה לרופא מייד לפני המשך הטיפול. אתה והרופא שלך חלשתי על המושך הטיפול בהתפתח גם באפשרות נטילת אנטיביוטיקה מקבוצה אחרת.

תרופות ממשפחת הפלואורוקויונולונים, כולל **לבד**, עלולות לגרום להחמרה של התסמינים של מחלת מיאסטיניה גרביס (myasthenia gravis) כגון החמרת חולשת השרירים או בעיות בנשימה – **אם היך חש בתופעות אלו פנה לרופא מייד.**

אם אינך בטוח אם אתה מאוזנת לעיל מתייחסת אליך, פנה אל הרופא או הרוקח לפני נטילת לבד.

היך סוכרת ממושכת ובתכשירים נוגדי סוכרת פומיים או אינסולין

יש לעקוב אחר רמת הסוכר בדידים.

**שימוש בתרופה ומזון**

ניתן לטיל את התרופה עם הארוחה או בכל זמן בין הארוחות.

**הריזון והקנה**

אין להשתמש ב**לבד** אם:

היך בהריון, עשויה להיכנס להריון או חושבת שהיך בהריון.

היך מניקה או מתכננת להניק.

**נהיגה ושימוש במכוונות**

היך עלול לסבול מתופעות לוואי לאחר נטילת תרופה זו הכוללות תחושת של סחרחורת, שנוניות, תחושת סחרור (ורטגו) או שינויים בראייה. חלק מתופעות לוואי אלו עלולות להשפיע על היכולת שלך להתרכז ועל תגובות ההגובה שלך. אם זה קורה, אין לנהוג או לעסוק בפעילות כלשהי המתייחדת רמה גבוהה של השמות לב.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגראם נתרן (23 mg) בכל טבליה, כלומר היא נחשבת "נטולת נתרן".

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגראם נתרן (23 mg) בכל טבליה, כלומר היא נחשבת "נטולת נתרן".

היך סוכרת ממושכת ובתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול ואופן הכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
המינון תלוי בסוג הזיהום שיש לך ובמיקומו בגוף.
פי עי חומרת הזיהום יקבע משך הטיפול.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

דלקת ריאות: טבליה אחת של **לבד** פעם או פעמיים ביום.
דלקות בדרכי השתן: טבליה אחת של **לבד** פעם ביום.

אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חלשה מדי או חוקה מדי אל תשנה את המינון על דעת עצמך, אל שאל על כך את הרופא שלך.

**יש להפסיק את השימוש בלבד ולפנות מייד לרופא או לבית חולים אם היך סובל מתופעות הלוואי החמורות הבאות – ייתכן שתדקק לטיפול רפואי דחוף:**

**תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמים מתוך 10,000:**

- שלשול שמימי, אשר עלול להיות דממי, ייתכן שמלווה בהתכווציות בבטן וחום גבוה.
- אלו עלולים להיות מסתמים של בעיה חמורה במעיים.
- כאב או דלקת בגידים או ברצועות, אשר עלולים להוביל לקריעתם.
- גיד האכילס הוא המושפע לרוב.

- פרכוסים.

- ראיית או שמיעת דברים שאינם קיימים (היזית, פרנויה).
- תחושת דיכאון, בעיות נפשיות, תחושת חוסר שקט, חלומות מהררים או סוטים.

היך על עורך מפני השמש
**אם היך כבר נוטל טבליות ברזל, תוספי אבץ, סותרי חומצה, דיאזנחין או סוכרלאפטא,** אין לקחת תרופות אלה באותו זמן עם **לבד**. יש להכות פרק זמן של שעותיים לפחות לפני או לאחר נטילת לבד.