

نشرة للمستهك بموجوب أنظمة الصلبة (مستحضرات) – 1986

يسمَّق الدواء بموجوب وصفة طبيب فقط

ليقو

أقراص

التريتيب:

يجتوي كل قرص مطلي على:

ليفوفلوكساسين (كميهيميدرات) 500 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر رجاء أنظر في الفقرة 2

"معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء." والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاجك، لا تحمله لأخريين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

كُنت تعاني من التهاب حاد في الكلىة وفي حوض الكلىة وتلوثات معدقة في المسالك البولية

• التهاب جرثومي في غدة البروستات، عندما يستمر التلوث

يجب إستعمال **ليفو** فقط عندما لا يكون من المناسب إستعمال مواد أخرى مضادة لللرثائم الموصى بها عادة، لعلاج التلوثات التالية:

• التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي الحاد

• تلوثات معدقة في الجلد والأنسجة الرخوة.

• التهاب الرتئين (جراء عدوى في المجتمع)

• التهاب حاد للعرض الرزوي الإسنادي المزمن، بما في ذلك التهاب القصبات الهوائية بالأمكان إستعمال **ليفو** أيضاً لإتمام العلاج لدى مرضى أظهرها تحسن خلال العلاج الأولي بليفوفلوكساسين بالإعطاء الوريدي.

الفصلية العلاجية: مضاد حيوي ينتمي إلى فصيلة الـ "فلوروكينولونات".

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كُنت حساساً (اليريجي) لـ ليفوفلوكساسين، لأي مضاد حيوي آخر من فصيلة الكينولونات مثل موكسيفلوكساسين، سبيروفلوكساسين أو أوفلوكساسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

علامات رد فعل تحسسي تشتمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

• كُنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض الصرع (epilepsy).

• كُنت تعاني أو عانيت في مشاكل في الأوتار مثل التهابات الأوتار، التي نتجت عن علاج بمضاد حيوي من فصيلة الـ "كينولونات". الوتر يربط بين العضل والعظم.

• كُنت طفلاً أو فتىٍ مرهماً.

• كُنت حاملاً، من شأنك أن تصبغي حاملاً أو تظنين بأنك حامل.

• كُنتٍ مرضية.

لا تتناول الدواء إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن وثاقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول **ليفو**.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بليفو، أخبر الطبيب إذا:

- كُنت بعمر 60 سنة أو أكثر.

كُنت تتناول أدوية من فصيلة الـ كورتيكوستيرويدات، تسمى أحياناً ستيرويدات (أنظر الفقرة 2) التلخلات/التفاعلات بين الأدوية".

- عجزت زراعة أعضاء.
- عانيت ذات مرة من إختلاج.
- عانيت من ضرر دماغي جراء صدمة أو إصابة دماغية أخرى.

إذا تطور لديك طفح خظير أو عرض آخر من هذه الأعراض الجلدية توقف عن تناول **ليفو** وتوجه إلى طبيبك أو توجه فوراً لتلقي علاج طبي.

لا يجوز تناول أدوية مضادة للجرثامين من نوع فلوروكينولون/كينولون، بما في ذلك **ليفو**، إذا قاستي في الماضي من أي عرض جانبي خطير عند تناول كينولون أو فلوروكينولون.

في هذه الحالة، عليك إبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن.

عندما تتناول الدواء:

- إذا كُنت تشعر بالأم مفاجئة وشديدة في البطن، في الصدر أو في الظهر لديك، التي يمكن أن تكون أعراض لدُم الدم الأبهريية وتسلخ (تمزق) – **توجه فوراً** إلى غرفة الطوارئ. قد تتزايد الخطورة لديك إذا كُنت تتعالم بـكورتيكوستيرويدات جهازية (systemic).
- إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.
- إذا بدأت تعاني من "نفضات" مفاجئة وغير إرادية، تشنجات عضلية أو تقلصات في العضلات – راجع الطبيب فوراً إلى هذه الأعراض وقد تكون علامات على الروع العصلي. قد يحتاج الطبيب إلى إيقاف العلاج بـ **ليفو** وبدء علاج مناسب آخر.
- إذا سُرت بغثيان، شعور عام سيء، إزعاج شديد أو ألم مستمر أو بتفاقم في منطقة المعدة أو تقيؤ – **توجه إلى الطبيب فوراً** لأن ذلك قد يكون علامة لإلتهاب في البنكرياس (التهاب حاد في البنكرياس).
- إذا كُنت تعاني من إرتقار، شعوب في الجلد، كدمات، نزيف خارج عن السيطرة، سخونة، ألم في الحنجرة وتدهور وتغير في حاليتك العامة، أو شعور بأن مقاومتك للتلوثات قد تكون ضعيفة – **راجع الطبيب حالاً** لأن هذه قد تكون علامات لإضطرابات في الدم. يتوجب على طبيبك مراقبة دمك من خلال فحوصات تعداد الدم، وفي حال وجود شذوذ في فحوصات تعداد الدم، قد يضطر الطبيب إلى إيقاف العلاج.

إذا كُنت تعاني من الغفاف والتهاب أو تمزق في الأوتار قد تظهر في أوقات نادرة. تزداد الخطورة لديك إذا كُنت مسناً (تجاوزت عمر 60 سنة)، عجزت زراعة أعضاء، تعاني من مشاكل في الكلى أو إذا كُنت معالِجاً بـكورتيكوستيرويدات. قد يحدث التهاب وتمزق في الأوتار خلال **48** ساعة الأولى من العلاج لا بل حتى عدة أشهر بعد التوقف عن العلاج بـ **ليفو**. عند العلامة الأولى لآلم أو لإلتهاب في الوتر (مثلاً في كاحلك، في رصفتك، في المرفق، الكتف أو الركبة)، توقف عن تناول **ليفو**، اتصل بطبيبك وأرج المنطقة المؤلمة، تجنب أي نشاط بدني غير ضروري لأن هذا الأمر قد يزيد من خطورة حدوث تمزق في الوتر.

قد تقاسي في أوقات متباعدة من أعراض لضرع عصبي (إعتلال عصبي) مثل ألم حرقه، وخز خدر و/ أو ضعف، خاصة في الرجلين، في القدمين أو في اليدين والذراعين. إذا حدث هذا الأمر، توقف عن تناول **ليفو** وأبلغ الطبيب بشكل فوري، من أجل تجنب تطور حالة التي قد تكون غير قابلة للعكس.

أعراض جانبية خطيرة مطولة، تسبب العجز والتي قد تكون غير قابلة للعكس

أدوية مضادة للجرثامين من نوع فلوروكينولون/كينولون، بما في ذلك **ليفو**، ترتبط بأعراض جانبية نادرة جداً لكنها خطيرة، بعضها طويل الأمد (التي تستمر أشهر أو سنوات)، حيث تسبب العجز أو قد تكون غير قابلة للعكس. يشمل الأمر آلم في الأوتار، العضلات ومفاصل الأطراف العلوية والسفلية، صعبوية في المشي، آحاسين شاذة التي توصف كخزخ الدبابيس والإبر، وخزخ، دغفغة، فنور أو حرقه (parasthesia)، إضطرابات حسية بما في ذلك تضرب في الرؤة، في حاسة التذوق والشعم، في السمع، إكتئاب، خلل في الذاكرة، إرتقار شديد وإضطرابات شديدة في النوم.

إذا قاستي من إحدى لك الأعراض الجانبية بعد تناول **ليفو**، توجه للمختبر فوراً إلى مواصله العلاج. تقرر ذلك وطبيبك حول مواصلة العلاج مع الأخذ بعين الإعتبار أيضاً نسب الإزيمات الكلية التي يلاحظت في فحوص الدم وترافق في نوع من خلايا الدم البيضاء (الكبت الحاضات) وتضخم الغدد الليمفاوية.

• طفح أحمر وحرفشي واسع النطاق مع نتوءات تحت الجلد (يشمل طيات الجلد، الصدر، البطن [بما في ذلك المعدة]، الظهر والذراعين) وحويصلات، يترافق بسخونة. تظهر

مشاكل في التنفّس – إذا سُرت بهذه الأعراض **توجّه إلى الطبيب فوراً**.

إذا لم تكن وثاقاً فيما إذا كانت إحدى التحذيرات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل تناول **ليفو**.

الأطفال والمرامهون

الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

لا يجوز إستعمال **ليفو** إذا:
كُنت تتناول أدوية مضادة للجرثامين من نوع فلوروكينولون/كينولون، بما في ذلك **ليفو**.

كُنت تمرضة أو تخططن للإرضاع.

السباقة وإستعمال الكماكتات

قد تعاني من أعراض جانبية بعد تناول هذا الدواء والتي تشمل الشعور بدوار، الميل للنوم، الشعور بدوران (فيرتيغو) أو تغيرات في الرؤية.

إذا كُنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى **بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**. ذلك لأن **ليفو** قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأدوية أخرى قد تؤثر على عمل **ليفو**.

إذا كُنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية **أخرى** **بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**. ذلك لأن **ليفو** قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأدوية أخرى قد تؤثر على عمل **ليفو**.

• كُنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الصحة النفسية.

• كُنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في القلب. يجب توخي الحذر عند تناول هذا الدواء وذلك إذا ولدت مع أو لديك سابقاً عاثلية لإحالة مقطع QT (الذي يمكن ملاحظته في فحص الـ ECG). تخطيط النشاط الكهربائي للقلب،) إذا كُنت تعاني من عدم توازن في أملاح الدم (خاصة نسبة منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم)، إذا كان قلبك ظمطي جيداً (يسمى "bradycardia")، إذا وُجد لديك قصور قلبي، إذا قاستي في الماضي من إحشاء في عضلة القلب (تودية قلبية)، إذا كُنت إمراة أو مسناً أو إذا كُنت تتناول أدوية أخرى تؤدي إلى تغيرات غير سليمة في الـ ECG (أنظر في الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من "نفضات" مفاجئة وغير إرادية، تشنجات عضلية أو تقلصات في العضلات – راجع الطبيب فوراً إلى هذه الأعراض وقد تكون علامات على الروع العصلي. قد يحتاج طبيبك إلى توجيهك لإجراء فحوص دم منتظمة، لفحص قابلية تخثر الدم لديك.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من "نفضات" مفاجئة وغير إرادية، تشنجات لحالت الألم والإلتهاب مثل أسبيرين، إيبوبروفين، فينوبوفين، كيتوبروفين وإيندومتاسين، لديك إحتمال أكبر بأن تعاني من إختلاج عند تناول مشترك مع **ليفو**.

• إذا سُرت بغثيان، شعور عام سيء، إزعاج شديد أو ألم مستمر أو بتفاقم في منطقة المعدة أو تقيؤ – **توجه إلى الطبيب فوراً** لأن ذلك قد يكون علامة لإلتهاب في البنكرياس (التهاب حاد في البنكرياس).

• إذا كُنت تعاني من إرتقار، شعوب في الجلد، كدمات، نزيف خارج عن السيطرة، سخونة، ألم في الحنجرة وتدهور وتغير في حاليتك العامة، أو شعور بأن مقاومتك للتلوثات قد تكون ضعيفة – **راجع الطبيب حالاً** لأن هذه قد تكون علامات لإضطرابات في الدم. يتوجب على طبيبك مراقبة دمك من خلال فحوصات تعداد الدم، وفي حال وجود شذوذ في فحوصات تعداد الدم، قد يضطر الطبيب إلى إيقاف العلاج.

إذا كُنت تعاني من إرتقار، شعوب في الجلد، كدمات، نزيف خارج عن السيطرة، سخونة، ألم في الحنجرة وتدهور وتغير في حاليتك العامة، أو شعور بأن مقاومتك للتلوثات قد تكون ضعيفة – **راجع الطبيب حالاً** لأن هذه قد تكون علامات لإضطرابات في الدم. يتوجب على طبيبك مراقبة دمك من خلال فحوصات تعداد الدم، وفي حال وجود شذوذ في فحوصات تعداد الدم، قد يضطر الطبيب إلى إيقاف العلاج.

إذا كُنت تعاني من إرتقار، شعوب في الجلد، كدمات، نزيف خارج عن السيطرة، سخونة، ألم في الحنجرة وتدهور وتغير في حاليتك العامة، أو شعور بأن مقاومتك للتلوثات قد تكون ضعيفة – **راجع الطبيب حالاً** لأن هذه قد تكون علامات لإضطرابات في الدم. يتوجب على طبيبك مراقبة دمك من خلال فحوصات تعداد الدم، وفي حال وجود شذوذ في فحوصات تعداد الدم، قد يضطر الطبيب إلى إيقاف العلاج.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

إنتظام النبض، غثيان أو الشعور بحرقان في المعدة.

لا يجوز إستعمال **ليفو** إذا:
لا يجوز إستعمال **ليفو** إذا:
لا يجوز إستعمال **ليفو** إذا:
لا يجوز إستعمال **ليفو** إذا:
لا يجوز إستعمال **ليفو** إذا:

• كُنت في فترة الحمل، من شأنك أن تصبغي حاملاً أو تظنين بأنك حامل.

كُنت مرضية أو تخططن للإرضاع.

الأطفال والمرامهون

الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين.

السباقة وإستعمال الكماكتات

قد تعاني من أعراض جانبية بعد تناول هذا الدواء والتي تشمل الشعور بدوار، الميل للنوم، الشعور بدوران (فيرتيغو) أو تغيرات في الرؤية.

إذا كُنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية **أخرى** **بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**. ذلك لأن **ليفو** قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأدوية أخرى قد تؤثر على عمل **ليفو**.

إذا كُنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية **أخرى** **بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**. ذلك لأن **ليفو** قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأدوية أخرى قد تؤثر على عمل **ليفو**.

• كُنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الصحة النفسية.

• كُنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في القلب. يجب توخي الحذر عند تناول هذا الدواء وذلك إذا ولدت مع أو لديك سابقاً عاثلية لإحالة مقطع QT (الذي يمكن ملاحظته في فحص الـ ECG). تخطيط النشاط الكهربائي للقلب،) إذا كُنت تعاني من عدم توازن في أملاح الدم (خاصة نسبة منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم)، إذا كان قلبك ظمطي جيداً (يسمى "bradycardia")، إذا وُجد لديك قصور قلبي، إذا قاستي في الماضي من إحشاء في عضلة القلب (تودية قلبية)، إذا كُنت إمراة أو مسناً أو إذا كُنت تتناول أدوية أخرى تؤدي إلى تغيرات غير سليمة في الـ ECG (أنظر في الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (صعور لبئض سريع أو غير منتظم) – **عليك إبلاغ الطبيب فوراً**.

• إذا بدأت تعاني من إنذاعات سريعة لضيق في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كُنت تلاحظ إنتفاخاً في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهوراً جديداً لغضبات القلب (ص