

في-تيرز، نقاط للعينين، محلول

التركيب:

هيدروكسي إيثيل سلولوز 0.4% W/V (Hydroxyethylcellulose 0.4% W/V).

يحتوي كل 1 مل على: 4 ملغ هيدروكسي إيثيل سلولوز.

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية- أنظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

1. لماذا هذا الدواء؟

يُستعمل في-تيرز لحماية العينين ولتشحيمها في حالات جفاف العينين، عندما يكون إنتاج الدموع غير كافٍ.

المجموعة العلاجية: دموع اصطناعية.

2. قبل البدء باستعمال الدواء

ممنوع استعمال الدواء إذا:

• لديك حساسية (الرجي) للمادة الفعالة (هيدروكسي إيثيل سلولوز) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء أثناء وضع العدسات اللاصقة (أنظر معلومات إضافية في بند 2 "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء").

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والرضاعة:

يُمكن استعمال في-تيرز في فترة الحمل والرضاعة.

السواقة واستعمال الماكينات:

كما في كل أدوية نقاط العينين، قد تكون رؤيتك مشوشة بعد الاستعمال. انتظر حتى عودة الرؤية الى وضوحها قبل السواقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على المادة الحافظة كلوريد البنزالكونيوم (Benzalkonium Chloride)، والتي يمكن أن تمتصها العدسات اللاصقة اللينة وتغير لونها. يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل استعمال الدواء وإعادتها بعد 15 دقيقة من الاستعمال.

قد يتسبب كلوريد البنزالكونيوم أيضًا في تهيج العين، خاصةً إذا كنت تعاني من جفاف العين أو اضطرابات القرنية (الطبقة الشفافة في مقدمة العين). إذا كان لديك إحساس غير طبيعي في العين أو حرقان أو ألم في العين بعد استخدام الدواء، فتوجه الى الطبيب.

يحتوي هذا الدواء على 0.1 ملغ من كلوريد البنزالكونيوم في كل 1 مل، وهو تركيز يعادل 0.1 ملغ/مل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وكيفية العلاج.

هذا الدواء مناسب للأطفال والمراهقين والبالغين.

الجرعة الموصى بها عادة:

1-2 نقطة، 3-4 مرات في اليوم أو حسب الحاجة. إذا تفاقم الاحساس بالجفاف في العينين أو إذا لم يحدث تحسن بعد 3 أيام، فعليك التوجه الى الطبيب.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

طريقة الاستعمال:

1. اغسل يديك جيدًا قبل إستخدام قطرات العينين.

2. احن رأسك الى الخلف أو استلق على السرير وبمساعدة الاصبع، ابعده قليلاً الجفن الاسفل عن العين وكون فجوة.

3. نقط الدواء الى داخل الفراغ واغلق عينيك لمدة 1-2 دقيقة ولا تغمض.

4. لمنع تلوث المحلول، حافظ على ان لا تتلامس فتحة القنينة مع اي جسم آخر، بما في ذلك الاصبع والعين، واغلق القنينة جيدًا بعد الاستعمال.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

لا يجوز إستعمال أدوية في القنينة! يجب تشخيص طابع الدواء والمقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، فإن استعمال في-تيرز قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تتصدم عند قراءة تلك الأعراض الجانبية، قد لا تشكو من أي منها.

من الممكن بعد استخدام القطرات أن تشعر برؤية مشوشة أو إحساس خفيف بالحرقان لفترة قصيرة.

قد تسبب قطرات العين التي تحتوي على كلوريد البنزالكونيوم تهيج في العين، خاصةً لدى الذين يعانون من جفاف العين أو اضطرابات القرنية. لمعلومات إضافية، أنظر بند 2- "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء".

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)

الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• شروط التخزين:

◦ يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.

◦ يُمكن استخدام الدواء حتى 30 يوماً بعد فتح القنينة للمرة الأولى، ولا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

◦ يجب الحفاظ على إبقاء القنينة مغلقة جيداً.

◦ يُمنع استعمال الدواء إذا كان هناك تغيير في لون المحلول، أو أصبح عكراً.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المياه العادمة أو القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات اضافيه

بالإضافة للمركب الفعال، يحتوي الدواء على:

Sodium Chloride, Sodium Citrate, Potassium Chloride, Disodium Edetate, Benzalkonium Chloride, Hydrochloric Acid/ Sodium Hydroxide, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

قنينة تحوي محلول نقي، بدون لون حتى الاصفرار قليلاً.

حجم العبوة المصادق عليها: 15 ملل.

المنتج وصاحب الامتياز: فيتامد للصناعات الدوائية م.ض.،

شارع هتجانا 6، ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، إسرائيل.

تم التحرير في يوليو (تموز) 2025 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 100-93-28588-02

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

