

برينتلكتس

5 ملغ، 10 ملغ، 15 ملغ، 20 ملغ
أقراص مغلفة

المادة الفعالة

برينتلكتس 5 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على: 5 ملغ من الفورتيكسيبتين (كهيدروبروميد)، vortioxetine (as hydrobromide)
برينتلكتس 10 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على: 10 ملغ من الفورتيكسيبتين (كهيدروبروميد)، vortioxetine (as hydrobromide)
برينتلكتس 15 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على: 15 ملغ من الفورتيكسيبتين (كهيدروبروميد)، vortioxetine (as hydrobromide)
برينتلكتس 20 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على: 20 ملغ من الفورتيكسيبتين (كهيدروبروميد)، vortioxetine (as hydrobromide)

المواد غير الفعالة في المستحضر: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كان لديك أسئلة إضافية، اتصل بالطبيب أو الصيدلي.
هذا الدواء قد وصف لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين. قد يضرهم حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

أدوية مضادة للاكتئاب (anti-depressants) تزيد من خطر سلوك وأفكار انتحارية لدى الأطفال، المراهقين والبالغين الشباب.

مع بداية العلاج بالدواء، على المتعالجين في كافة الأجيال وأقاربهم، متابعة تغيرات في السلوك مثل: تفاقم الاكتئاب، أفكار انتحارية، عدائية وما شابه. في حال طرأت تغيرات مثل هذه، يجب التوجه للطبيب فوراً.

1. لماذا يستعمل هذا الدواء؟

يستخدم برينتلكتس لعلاج نوبات الاكتئاب (Major depressive episodes) عند الكبار.
المجموعة العلاجية: أدوية مضادة للاكتئاب.

أثبت أن برينتلكتس خفف من مجموعة واسعة من أعراض الاكتئاب، بما في ذلك الحزن، التوتر الداخلي (الشعور بقلق)، اضطرابات النوم، انخفاض الشهية، صعوبة في التركيز، الشعور بعدم القيمة، فقدان الاهتمام في الأنشطة المفضلة، الشعور بالبطء.

2. قبل استعمال الدواء

لا تستعمل الدواء إذا:

- كنت حساساً (لديك حساسية) للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر قائمة المواد غير الفعالة في الفصل 6).
- كنت تأخذ أدوية أخرى لعلاج الاكتئاب معروفة باسم مثبطات المونوأمين أو أكسيداز غير الانتقائية، أو مثبطات المونوأمين أو أكسيداز الانتقائية من نوع MAO-A. اسأل الطبيب إذا كنت غير متأكد.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل استعمال برينتلكتس، أخبر طبيبك إذا:

- كنت تأخذ أدوية لها تأثير على السيروتونين، مثل:
 - ترامادول وأدوية مشابهة (مسكنات آلام قوية)
 - سوماتريبتان وأدوية مشابهة مع مركب فعال ينتهي اسمه بـ "تريبتان" (تستخدم لعلاج الصداع النصفي).تناول هذه الأدوية جنباً إلى جنب مع برينتلكتس قد يزيد من خطورة حدوث متلازمة السيروتونين. قد ترتبط هذه المتلازمة مع حالات الهلوسة، حالات التشنج غير الطوعية، تسارع دقات القلب، ارتفاع ضغط الدم، حمى، غثيان وإسهال.
- كان لديك نوبات (تشنجات).
سوف يقوم الطبيب بمعالجتك بحذر إذا كان لديك تاريخ من نوبات أو اضطراب غير مستقر من التشنجات أو صرع غير مستقر. التشنجات هي مخاطر محتملة من الأدوية التي تستخدم لعلاج الاكتئاب. يجب التوقف عن العلاج في أي مريض تتطور لديه نوبات أو عندما يكون هناك زيادة في وتيرة النوبات.

- كان لديك هوس.
- كان لديك ميل للنزيف أو تتلقى الكدمات بسهولة، أو إذا كنت حاملا (انظري البند "حمل، إرضاع وخصوبة").
- كان لديك انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم.
- كان عمرك 65 عاما وأكثر.
- كنت تعاني من مرض الكلى الحاد.
- كنت تعاني من مرض الكبد الحاد أو أمراض الكبد التي تسمى تشمع الكبد (cirrhosis).
- كان لديك الآن أو كان لديك في السابق ارتفاع في الضغط داخل العين أو جلوكوما. إذا ظهرت آلام في العينين أو إذا تطور لديك خلال العلاج تشوش في الرؤية، توجه إلى الطبيب.

عندما تعالج بأدوية مضادة للاكتئاب، يشمل فورتيوكسيتين، قد تعایش كذلك مشاعر من العدائية، قلة الهدوء، غضب وهيجان. إذا شعرت بذلك، بلغ الطبيب بذلك.

التفكير في الانتحار وتفاقم الاكتئاب

إذا كنت مكتئبا و/أو تعاني من اضطرابات القلق، أحيانا، قد يكون لديك أفكار في إيذاء النفس أو أفكار انتحارية. هذه الأفكار قد تزيد في بداية العلاج بمضادات الاكتئاب، لأن فاعلية الدواء تبدأ بالتأثير بعد مرور بعض الوقت: عادة يبدأ التأثير بعد أسبوعين من بدء العلاج، وحتى لاحقا في بعض.

الاحتمال لأن تتعرض لمثل هذه الأفكار يكون أعلى:

- إذا كانت لديك في السابق أفكار انتحارية أو أفكار لإيذاء نفسك.
- إذا كنت بالغ شاب.

أظهرت المعلومات المستقاة من التجارب السريرية زيادة في خطورة السلوك الانتحاري لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة والذين يعانون من حالات نفسية وتناولوا دواء مضاد للاكتئاب.

إذا كان لديك أفكار انتحارية أو أفكار لإيذاء نفسك في أي وقت كان، عليك الاتصال بالطبيب أو اذهب إلى المستشفى على الفور. من المستحسن إخبار أحد أقاربك أو صديق قريب، أنك تعاني من الاكتئاب أو لديك اضطرابات القلق، أطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يخبروك إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب أو القلق يزداد سوءاً عندك، أو إذا كانوا قلقين بشأن تغييرات طرأت على سلوكك.

الأطفال والمراهقون

برينتلكتس غير موصى به للاستعمال لأطفال ومراهقين دون جيل 18 سنة.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

- فينيلزين، إبيرونيازيد، إيزوكربوكسازيد، نيالاميد، ترانيلسيبرومين (أدوية لعلاج الاكتئاب من مجموعة مثبطات المونوأمين أوكسيداز غير الانتقائية). لا يجوز تناول أي من هذه الأدوية سوية مع برينتلكتس.
- إذا كنت قد تناولت أي من هذه الأدوية المذكورة سابقا، عليك الانتظار 14 يوما قبل البدء بتناول برينتلكتس.
- بعد توقفك عن تناول برينتلكتس، عليك الانتظار 14 يوما قبل البدء بتناول أي من الأدوية المذكورة أعلاه.
- موكلوبيد (لعلاج الاكتئاب).
- سيليجيلين، راساجيلين (لعلاج مرض الباركنسون (الرعاش)).
- لينزوليد (لعلاج التلوث الجرثومي).
- مستحضرات طبية ذات تأثير سيروتونيرجي مثل ترامادول وأدوية مشابهة (مسكنات ألم قوية) وكذلك سوماتريبتان وأدوية مشابهة تحتوي على مواد فعالة التي ينتهي اسمها بـ "تريبتان" (تستعمل لعلاج الصداع النصفي). تناول هذه الأدوية سوية مع برينتلكتس قد يزيد من اختطار ظهور متلازمة السيروتونين (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- ليثيوم (لعلاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية) أو الليثيوم.
- الأدوية التي تعرف بأنها تسبب انخفاض مستوى الصوديوم.
- ريفامبيسين (دواء لعلاج السل وغيره من الأمراض المعدية الأخرى).
- كاربامازيبين، فينيتوين (أدوية لعلاج الصرع أو أي أمراض أخرى).
- وارفارين، ديبيريادامول، فينوبروكومون، أدوية معينة مضادة للذهان، فينوثيرازينات، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، جرعة منخفضة من حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين) وأدوية مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية (أدوية تمييع الدم وأدوية تستعمل لتسكين الألم). قد تزيد هذه الأدوية من الميل لحدوث نزيف.

الأدوية التي تزيد من خطر نوبات الصرع (اختلاجات):

- سوماتريبتان وأدوية مماثلة مع مركبات فعالة ينتهي اسمها بـ "تريبتان".
- ترامادول (وهو مسكن آلام قوي).
- ميفلوكوين (لمنع الملاريا وعلاجها).
- بوبروبيون (لعلاج الاكتئاب وللغذاء من التدخين).
- فلوكسيتين، پاروكسيتين وغيرها من الأدوية لعلاج الاكتئاب من مجموعة SSRI/SNRI، ثلاثية الحلقات.
- نبتة العرن المتقوب (St John's wort) (لعلاج الاكتئاب)
- كينيدين (لعلاج اضطرابات بنظم القلب)
- كلوربرومازين، كلوربروتيكتين، هالوبريدول (أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية التي تنتمي لمجموعات تسمى الفينوثيازينات، الثيوكسانيت، والبوتيرفينون).

يرجى منك اخبار الطبيب إذا كنت تستخدم أي من هذه الأدوية أعلاه، لأنه على الطبيب أن يعرف إذا كنت عرضة لخطر حدوث اختلاجات.

إذا كنت تخضع لفحص بول للكشف عن المخدرات، بطرق فحص معينة قد يؤدي تناول برينتلكس إلى ظهور نتائج إيجابية للميثادون رغم أنك قد لا تكون تتناول ميثادون. إذا حدث ذلك، يمكن إجراء فحص محدد أكثر.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

من المستحسن عدم استهلاك الكحول عند استعمال هذا الدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حامل، مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

الحمل

لا تستخدم برينتلكس خلال الحمل إلا إذا أخبرك الطبيب أنه من الضروري جدًا تناوله.

إذا كنت تستعملين أدوية لعلاج الاكتئاب، يشمل برينتلكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية من حملك، عليك أن تدركي أنه قد تظهر أعراض جانبية في الطفل المولود: صعوبات في التنفس، جلد يميل إلى الزرقة، اختلاجات، تغيرات في حرارة الجسم، صعوبات في الأكل، تقيؤ، سكر دم منخفض، تصلب العضلات أو ارتخاء العضلات، ارتكاسات حادة، رجفة، عصبية، هياج، خمول (lethargy)، بكاء من دون توقف، نعاس وصعوبات في النوم. يجب الاتصال على الفور بالطبيب إذا ظهر أي من هذه الأعراض لدى الطفل.

تأكدي بأن القابلة و/أو الطبيب يعرفون بأنك تستعملين برينتلكس. عند الاستعمال خلال الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، قد تزيد الأدوية مثل برينتلكس الخطر لحالة وخيمة في الأطفال، تسمى ضغط دم رئوي مرتفع ومقاوم لدى حديث الولادة (PPHN)، يجعل الطفل يتنفس بوتيرة أسرع ويبدو أزرق اللون. عادة ما تبدأ هذه الأعراض خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة. في حال حدث هذا مع طفلك، عليك الاتصال على الفور بالقابلة و/أو الطبيب.

تناول برينتلكس بالقرب من موعد انتهاء الحمل، قد يؤدي إلى ارتفاع في خطر ظهور نزيف مهبلي ثقيل بعد الولادة بفترة قصيرة، خاصة إذا كان لديك تاريخ من اضطرابات نزيف. على الطبيب أو القابلة أن يكونا على علم بأنك تتناولين برينتلكس ليتمكنوا من تقديم المشورة لك بخصوص ذلك.

الإرضاع

يتوقع بأن تنتقل مركبات برينتلكس لحليب الأم. لا يجوز استعمال برينتلكس خلال فترة الإرضاع. سوف يقرر الطبيب إذا كان يتوجب عليك التوقف عن الإرضاع، أو وقف استعمال برينتلكس وفقا للفائدة من إرضاع الطفل، والفائدة من العلاج بالنسبة لك.

السياقة واستعمال الآلات

لا يؤثر برينتلكس، أو أنه ذو تأثير هامشي على قدرة السياقة واستعمال الآلات، مع ذلك حيث أنه تم التبليغ عن أعراض جانبية مثل الدوار، يوصى بتوخي الحذر عند القيام بهذه النشاطات في بداية العلاج بواسطة برينتلكس وعند تغيير الجرعة.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

برينتلكس يحتوي على صوديوم

هذا الدواء يحتوي أقل من 1 مليمول صوديوم (23 مليغرام) بالقرص، ولذلك يعتبر "خاليا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائما استعمال المستحضر وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الاعتيادية هي: 10 ملغ مرة في اليوم لدى الكبار دون جيل 65 سنة. يمكن للطبيب أن يزيد الجرعة لحد أقصى من 20 ملغ لليوم أو خفضها حتى حد أدنى بقدر 5 ملغ لليوم حسب استجابتك للعلاج. للكبار بجيل 65 سنة فما فوق، الجرعة الابتدائية هي 5 ملغ مرة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع قرص واحد مع كأس ماء. يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام. لا تتوفر معلومات عن سحق أو شطر القرص.

مدة العلاج

خذ برينتلكس طوال المدة الزمنية التي يوصي بها الطبيب. استمر بتناول برينتلكس حتى لو استغرقك بعض الوقت قبل أن تشعر بأي تحسن في حالتك. يجب الاستمرار بتناول الدواء حتى يشير عليك الطبيب بالتوقف.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى الأقرب إليك مصطحباً عبوة الدواء والأقراص المتبقية معك. عليك التصرف بهذا النحو حتى لو لم تشعر بأي تأثير أو مضايقة. يمكن أن تكون علامات الجرعة المفرطة دوار، غثيان، إسهال، مضايقة في البطن، حكة في كل الجسم، نعاس وتورد الوجه.

عقب تناول جرعات أعلى بعدة أضعاف من الجرعة الموصى بها، بلغ عن حالات اختلاجات وحالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، يجب تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب حتى لو شعرت بتحسن. قد يقرر طبيبك تقليل جرعتك قبل أن تتوقف عن تناول هذا الدواء كلياً.

بعض المتعالجين الذين توقفوا عن تناول برينتلكس عابثوا أعراض مثل دوخة، صداع، مشاعر نخز مثل نخز إبر ودبابيس أو شعور يشبه التيار الكهربائي (خاصة في الرأس)، عدم القدرة على النوم، شعور بالغثيان أو النقيز، شعور بالقلق، عدم الهدوء أو قلة الراحة، تعب أو ارتجاج. قد تظهر هذه الأعراض خلال الأسبوع الأول بعد وقف تناول برينتلكس.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كأي دواء، قد يسبب استعمال برينتلكس أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي واحدة منها. بشكل عام، الأعراض الجانبية التي شوهدت كانت بدرجة طفيفة إلى متوسطة من حيث شدتها وحدثت خلال أول أسبوعين من العلاج. كانت الأعراض مؤقتة عادة ولم تؤد إلى وقف العلاج. تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية بحسب الشبوع المفصل:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة

- غثيان

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض جانبية تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100

- إسهال
- إمساك
- تقيؤ
- دوام
- حكة في كل الجسم، حكة
- أحلام شاذة
- تعرق زائد
- صعوبات هضم

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض جانبية تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000

- تورم
- تعرق في الليل
- رؤية مشوشة
- رجفة لا إرادية (رجفان)
- حالات هلوسة (رؤية، سماع أو الشعور بأشياء غير موجودة)

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000

- توسع الحدقات، ما قد يزيد الخطر للجوكوما (انظر الفصل 2).

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد شيوعتها بعد)

- مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (قد تشمل الأعراض شعور بالدوار، وهن، بلبلة، نعاس أو تعب شديد، غثيان أو تقيؤ؛ أعراض وخيمة أكثر من اغماء، اختلاجات أو سقوط)
- متلازمة سيروتونين (انظر الفصل 2)
- ردود فعل تحسسية، التي قد تكون وخيمة، تسبب انتفاخا في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق، صعوبات في التنفس أو البلع، و/أو انخفاض فجائي في ضغط الدم (يجعلك تشعر بالدوار أو الضبابية)
- شرى (طفح)
- نزف زائد أو نزف غير مبرر (يشمل ظهور كدمات، نزف من الأنف، نزف من جهاز الهضم ونزيف مهلي)
- طفح
- اضطرابات في النوم
- قلة الهدوء والعداية. في حال شعرت بهذه الأعراض الجانبية، توجه إلى الطبيب (انظر الفصل 2).
- صداع
- ارتفاع في مستويات هرمون البرولاكتين في الدم
- حاجة متواصلة وخارجة عن السيطرة للتحرك (تململ حركي)
- صرير الأسنان (صك الأسنان)
- عدم القدرة على فتح الفم ("فك" مقفل)
- متلازمة الرجل عديمة السكون (رغبات بتحريك الساقين بغية وقف مشاعر مؤلمة أو غريبة، التي تحدث غالبا في الليل)
- إفراز حليبي غير طبيعي من الثدي (ثر الحليب)
- متلازمة إيقاف العلاج

شاهد خطر زائد لكسور في العظام لدى متعاطي يستعملون أدوية من هذا النوع.

تم التبليغ عن تناول جرعة 20 ملغ على أنه مرتبط بارتفاع في خطر اضطراب في الأداء الجنسي، وفي عدد من المرضى شوهد هذا العرض الجانبي أيضا بين متعاطي يتناولون جرعات أقل.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية التابعة لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30°C.

لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Mannitol, cellulose microcrystalline, hydroxypropylcellulose (5%, 75%-150 mPa.s), sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate, hypromellose (6 mPa.s), macrogol 400, water purified **5 mg:** titanium dioxide, iron oxide red, **10 mg:** titanium dioxide, iron oxide yellow, **15 mg:** titanium dioxide, iron oxide red, iron oxide yellow, **20 mg:** titanium dioxide, iron oxide red.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

5 ملغ: قرص مطلي وردي بشكل لوزة وبحجم 5 x 8.4 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و-"5" في الجهة الأخرى.
10 ملغ: قرص مطلي أصفر بشكل لوزة وبحجم 5 x 8.4 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و-"10" في الجهة الأخرى.
15 ملغ: قرص مطلي برتقالي بشكل لوزة وبحجم 5 x 8.4 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و-"15" في الجهة الأخرى.
20 ملغ: قرص مطلي أحمر بشكل لوزة وبحجم 5 x 8.4 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و-"20" في الجهة الأخرى.

الأقراص بعبوة لويحة (بليستر) 7، 14 و 28 قرصًا.
قد لا تسوق كافة أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه:

لوندبيك إسرائيل م.ض.، چلچالي هيلادا 11، ص.ب. 13105، هرتسليا 4672211

اسم المنتج وعنوانه: H. Lundbeck A/S, Othiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

تم تحريرها في تشرين الثاني 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

برينتلكس 5 ملغ: 153 72 34152

برينتلكس 10 ملغ: 153 73 34155

برينتلكس 15 ملغ: 153 74 34156

برينتلكس 20 ملغ: 153 75 34157

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.