

## ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ، أقراص مطلية

يحتوي كل قرص مطلي على ميتفورمين هيدروكلوريد (Metformin Hydrochloride) 850 ملغ.

لمعلومات حول المواد غير الفعّالة ومُسيّبات الحساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه للطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وصف للعلاج من أجليك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مُخصّص لعلاج السكري من نوع 2، وخاصةً لدى متعالمين لديهم وزن زائد، عندما يكون التغيير في التغذية وممارسة الرياضة لودهما غير كافٍ لاستقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

• لدى البالغين، ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ مُستطب كعلاج وحيد أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري عن طريق الفم أو مع إنسولين.

• لدى الأطفال من جيل 10 والمراهقين، ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ مُستطب كعلاج وحيد أو بالدمج مع إنسولين. لوحظ انخفاض في مضاعفات السكري لدى المتعالمين البالغين الذين لديهم سكري من نوع 2 ولديهم وزن زائد والذين تمت معالجتهم بميتفورمين كخط علاج أولي بعد فشل التغيير في التغذية.

**الفصيلة العلاجية:** أدوية لخفض مستويات الجلوكوز في الدم. المادة الفعّالة تنتمي لمجموعة البيجوانيدات.

الإنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس، الذي يجعل الجسم يستقبل الجلوكوز (السكر) من الدم. يستخدم جسمك الجلوكوز لتوليد الطاقة أو يتم تخزينه لاستخدامه في المستقبل.

إذا كنت تعاني من السكري، لا يقوم البنكرياس بتصنيع الإنسولين بشكل كافٍ أو لا يستطيع جسمك استخدام الإنسولين الذي ينتجه بصورة صحيحة. هذا يؤدي إلى مستوى عالي من الجلوكوز في الدم. يساعد ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ على خفض مستوى الجلوكوز في الدم إلى أن يصل للوضع السليم قدر الإمكان.

إذا كنت بالغًا ولديك وزن زائد، فإن تناول ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ لفترة طويلة يُساهم أيضًا في تقليل اختطار (احتمال خطر) حدوث مضاعفات المرتبطة في السكري. هناك علاقة بين ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ وبين ثبات وزن الجسم أو انخفاضه باعتدال.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجيا) للمادة الفعّالة (ميتفورمين) أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- كنت تعاني من خلل وخيم في وظيفة الكلية.
- لديك سكري غير متوازن مع، على سبيل المثال، فرط سكر الدم الوخيم (hyperglycemia) غثيان، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حُمّاض لاكتيكي (انظر في الأسفل "الاختطار لحُمّاض لاكتيكي") أو حُمّاض كيتوني (ketoacidosis). الحُمّاض الكيتوني هي حالة تتراكم فيها مواد تسمى "اجسام كيتونية" في الدم، والتي قد تؤدي إلى مُقدّمات غيبوبة سكرية. تشمل الأعراض: ألم بطن، تنفس سريع وعميق، نُعاس أو رائحة فواكه شاذة عند التنفس. فقدت الكثير من السوائل من الجسم (جفاف) على سبيل المثال نتيجة الإسهال المستمر أو الوخيم أو التقيؤ المتتالية. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل في الكلى، والتي قد تؤدي لاختطار حدوث حُمّاض لاكتيكي (انظر للبند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").
- كنت تعاني من عدوى وخيمة مثل عدوى التي تؤثر على الرئتين/جهاز القصبات/الكلى لديك. إن العدوى الوخيمة قد تؤدي إلى مشاكل في الكلى، الأمر الذي قد يؤدي لاختطار حدوث حُمّاض لاكتيكي (انظر للبند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").
- كنت تعاني من قصور قلبي وخيم، أو مررت مؤخرًا بنوبة قلبية، كنت تعاني من مشاكل وخيمة في الدورة الدموية (مثل صدمة) أو تعاني من صعوبات في التنفس. هذه الأوضاع قد تؤدي لنقص في تزويد الأوكسجين للأنسجة، الأمر الذي قد يؤدي لاختطار حدوث حُمّاض لاكتيكي (انظر للبند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").

- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول. إذا كانت واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، استشر الطبيب قبل البدء بالعلاج في هذا الدواء.

#### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ**، أخبر الطبيب إذا:

- كنت بصدد الخضوع لفحص مثل التصوير بالأشعة السينية (رونغن) أو المسح، الذي يتطلب حقن مواد تباين التي تحتوي على يود لدمك.
- كنت بصدد الخضوع لعملية جراحية كبرى.
- يجب عليك التوقف عن تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** لفترة معينة قبل وبعد الفحص أو العملية الجراحية. سوف يقرر طبيبك إذا كنت بحاجة لعلاج آخر في هذه الفترة الزمنية. من المهم تنفيذ تعليمات الطبيب بشكل دقيق.

#### تحذيرات خاصة إضافية

##### الاختطار لحمض لاكتيكي

قد يؤدي **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** لعرض جانبي نادر جدًا لكنه أيضًا وخيم، يدعى حمض لاكتيكي، خاصة إذا كانت الكلى لديك لا تعمل كما ينبغي. إن الاختطار لتطوير حمض لاكتيكي يزداد أيضًا في الحالات التالية: عندما يكون السكري غير متوازن، عدوى وخيمة، صوم مستمر، الإفراط في استهلاك الكحول، جفاف (انظر للمعلومات الإضافية في الأسفل)، مشاكل في الكبد وفي أية حالة طبية يكون فيها انخفاض في تزويد الأكسجين لأعضاء الجسم (على سبيل المثال مرض قلب شديد وخيم).

إذا كانت واحدة أو أكثر من الحالات أعلاه تنطبق عليك، استشر الطبيب لتلقي تعليمات إضافية.

**يجب التوقف عن تناول ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** لفترة قصيرة، إذا كنت تعاني من حالة يمكن أن تكون مرتبطة بالجفاف (فقدان كبير للسوائل) مثل حالات تقيؤ وخيمة، إسهال، حمى، التعرض للحرارة أو إذا كنت تستهلك سوائل أقل من المعتاد. استشر الطبيب لتلقي تعليمات إضافية.

**توقف عن تناول ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** وتوجه للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى حالاً، إذا عايشت بعض أعراض الحمض اللاكتيكي، لأن هذه الحالة قد تسبب الغيبوبة. أعراض الحمض اللاكتيكي تشمل: تقيؤات، ألم بطن، تشنجات عضلية، شعور عام سيء يرافقه تعب وخيم، صعوبات في التنفس، انخفاض في حرارة الجسم وفي النبض. الحمض اللاكتيكي هو حالة طبية طارئة تتطلب العلاج في المستشفى.

استشر الطبيب فوراً للحصول على تعليمات إضافية إذا:

- كنت تعاني من مرض وراثي يؤثر على الميتوكوندريا (المكونات المنتجة للطاقة في الخلايا)، مثل متلازمة MELAS (إصابة دماغية [اعتلال الدماغ المتقدي]، تلف العضلات [اعتلال عضلي]، الحمض اللبني وأعراض تشبه السكتة الدماغية) أو داء السكري والصمم الذي ينتقل بالوراثة من الأم (MIDD).
- كنت تعاني من أحد الأعراض التالية بعد بدء العلاج بميتفورمين: اختلاجات، انخفاض القدرات الذهنية، صعوبات في حركات الجسم، أعراض تشير إلى ضرر عصبي (مثل الألم أو فقدان الحس)، صداع نصفي وصمم.

إذا كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية كبرى، يجب عليك التوقف عن تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** أثناء ولفترة معينة بعد الإجراء. سوف يقرر طبيبك متى عليك التوقف ومتى عليك البدء بالعلاج **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** مجدداً.

**ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** كعلاج وحيد لا يسبب نقص سكر الدم (مستوى منخفض للغاية من الجلوكوز في الدم). لكن، في حال كنت تتناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري التي قد تسبب نقص سكر الدم (مثل سولفونيل يوريا، إنسولين، ميغلينيدات)، هناك اختطار لنقص سكر الدم. إذا كنت تعيش أعراض نقص سكر الدم مثل ضعف، دوخة، تعرق مفرط، تسارع النبض، اضطرابات في الرؤية أو صعوبات في التركيز – فإن شرب أو تناول طعام يحتوي على سكر يساعد عادةً في هذه الحالة.

#### الفحوصات والمتابعة

- سيقوم طبيبك بإجراء فحوصات منتظمة للجلوكوز في الدم ويقوم بملاءمة جرعة **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** لمستويات الجلوكوز الخاصة بك في الدم. يجب الحرص على التحدث مع الطبيب بشكل منتظم. هذه المراقبة مهمة خصوصاً لدى الأطفال، المراهقين والمسنين.
- سيقوم طبيبك أثناء العلاج بـ **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** بفحص وظائف كليتيك على الأقل مرة في السنة أو بوتيرة أكثر إذا كنت مسناً و/أو إذا ساءت وظيفة الكلى لديك.

### التفاعلات بين الأدوية

إذا كان عليك الخضوع لحقن مادة تباين التي تحتوي على يود في الدم – مثلاً من أجل التصوير بأشعة رونتغن أو المسح، عليك التوقف عن تناول **ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ** قبل أو أثناء الحقن. سيأخذ الطبيب القرار بخصوص متى عليك التوقف ومتى عليك البدء بالعلاج بـ **ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ** مجدداً.

إذا كنت تأخذ، أو أخذت في الآونة الأخيرة أو يُحتمل أن تأخذ أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد تحتاج إلى مراقبة بوتيرة أعلى لمستويات الجلوكوز في الدم ووظيفة الكلى أو يتوجب على طبيبك ملاءمة جرعة **ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ**.

أخبر الطبيب أو الصيدلي خاصةً إذا كنت تأخذ:

- أدوية تزيد من كمية البول (مدرات البول).
- أدوية لعلاج الألم والالتهاب (NSAID) ومثبطات COX-2، مثل إيبوبروفين، سيليكوكسيب).
- بعض الأدوية لعلاج فرط ضغط الدم (مثبطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين ACE، حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين II).
- ناهضات لمستقبلات بيتا-2 مثل سالبوتامول أو تيربوتالين (لعلاج الربو).
- كورتيكوستيرويدات (لعلاج حالات مختلفة، مثل التهاب وخيم في الجلد أو الربو).
- أدوية التي قد تغير مستوى **ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ** في دمك، وخاصةً في حالة انخفاض وظيفة الكلى (مثل فيراپاميل، ريفامبيسين، سيميبتينين، دولوتيجرافير، رانولازين، ترايميثوبريم، فانديتانيب، إيسافوكونازول، كريزوتينيب، أولاپاريب).
- أدوية أخرى لعلاج السكري.

### استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع أو بعد الوجبة مباشرةً لتجنب الأعراض الجانبية في الجهاز الهضمي.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

تجنّب الإفراط في شرب الكحول خلال فترة العلاج بـ **ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ**، لأنه قد يزداد اختطار حدوث الحُمّاض اللاكتيكيّ (انظر للبنّد " تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء ").

### الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنتِ حاملاً، تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل، حتى يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة لتغيير علاجك أو مراقبة مستويات الجلوكوز بالدم.

لا ينصح بهذا الدواء إذا كنتِ مُرضعةً أو تخططين للإرضاع.

### السياقة واستعمال الآلات

**ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ** لوحده لا يسبب نقص سكر الدم (مستوى منخفض للغاية من الجلوكوز في الدم). لذلك، ليس من شأن الدواء أن يؤثر على قدرتك على السياقة أو استعمال الآلات.

لكن، يجب توخي الحذر إذا كنت تتناول **ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ** سويةً مع أدوية أخرى لعلاج السكري التي قد تؤدي لنقص سكر الدم (مثل سولفونيل يوريا، إنسولين، مچليتينيدات). أعراض نقص سكر الدم تشمل ضعف، دوخة، تعرق مفرط، نبض سريع، اضطرابات في الرؤية أو صعوبات في التركيز.

لا يجوز السياقة أو استعمال الآلات إذا كنت تبدأ بالشعور بهذه الأعراض .

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة وطريقة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط.

**ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ** ليس بديلاً عن وجود نظام حياة صحي. يجب اتباع تعليمات التغذية التي أوصى بها الطبيب والحرص على القيام بنشاط بدني منتظم.

### الجرعة المتبعة هي:

الأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق والمراهقون:

الجرعة الابتدائية بشكل عام هي 500 ملغ أو 850 ملغ مرّة في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2,000 ملغ في اليوم مقسمة لـ 2 أو 3 جرعات. يُنصح بعلاج الأطفال بعمر 10-12 سنة فقط في حال وجود تعليمات واضحة من الطبيب لأن التجربة على هذه الفئة العمرية محدودة.

### البالغون:

الجرعة الابتدائية الاعتيادية بشكل عام هي 500 ملغ أو 850 ملغ 2-3 مرات في اليوم.

الجرعة اليومية القصوى هي 2,550 ملغ في اليوم، مقسمة لـ 3 جرعات.

إذا كنت تعاني من خلل في الوظيفة الكلوية، قد يصف لك الطبيب جرعة أقل.

إذا كنت تتعالج أيضاً بإنسولين، سيرشدك الطبيب حول كيفية بدء العلاج بـ **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ**.

لا يجوز شطر قرص **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** لتقسيم الجرعة. عندما تكون هناك حاجة إلى جرعة من **500 ملغ**، يجب استعمال دواء يحتوي على **ميتفورمين 850 ملغ** يمكن شطره (للحصول على جرعة **425 ملغ**)، والذي يمكن أن يشكل بديلاً لقرص يحتوي على **500 ملغ**.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

**كيفية أخذ ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ؟**

يجب تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** مع أو بعد الوجبة مباشرة، لمنع الأعراض الجانبية في الجهاز الهضمي. يجب بلع القرص مع كأس ماء.

- إذا كنت تأخذ جرعة واحدة في اليوم، خُذها في الصباح (مع وجبة الإفطار).
- إذا كنت تتناول الدواء مرتين في اليوم، خُذها في الصباح (مع وجبة الإفطار) وفي المساء (مع وجبة العشاء).
- إذا كنت تتناول الدواء 3 مرات في اليوم، خُذها في الصباح (مع وجبة الإفطار)، في الظهر (مع وجبة الغداء) وفي المساء (مع وجبة العشاء).

**طريقة تناول**

لا توجد معلومات حول السحق/المضغ.

لتسهيل البلع، يمكن، عند الحاجة، شطر القرص للاستعمال الفوري. يجب بلع كلا النصفين معاً بعد الشطر مباشرة.

إذا كنت تعتقد، بعد فترة ما، بأن تأثير **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** أقوى أو أضعف مما يجب، استشر الطبيب.

**إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة**

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة، فقد تعاني من حُمّاض لاكتيكي. إن أعراض الحُمّاض اللاكتيكي ليست محددة مثل تقيؤات، ألم بطن مع تشنجات عضلية، شعور عام سيء يصاحبه تعب وخيم وصعوبات في التنفس. أعراض إضافية تشمل انخفاض في حرارة الجسم والنبض إذا كنت تشعر بهذه الأعراض، توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية، لأن الحُمّاض اللاكتيكي قد يؤدي إلى غيبوبة. توقّف حالاً عن تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** وتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

**إذا نسيت تناول الدواء**

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد. يجب المداومة على العلاج كما أوصي به من قبل الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الجانبية**

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعمال **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

قد يسبب **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** عرضاً جانبياً نادراً جداً (عرض يظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000)، ولكنه وخيم جداً يدعى حُمّاض لاكتيكي (انظر للبند 2 "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء"). إذا ظهر هذا العرض، توقّف عن تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** وتوجه فوراً للطبيب أو للمستشفى، لأن الحُمّاض اللاكتيكي قد يؤدي إلى غيبوبة.

**أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من عشرة):**

- اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم في البطن وفقدان الشهية. هذه الأعراض الجانبية تحدث عادةً في بداية العلاج بـ **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ**. يمكن تخفيف هذه الأعراض عن طريق تقسيم الجرعة خلال اليوم وعن طريق تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** مع أو مباشرة بعد الوجبة. في حال استمرت الأعراض، توقّف عن تناول **ميتفورمين چالينيكوم 850 ملغ** واستشر الطبيب.

**أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):**

- تعيَّرات في حاسة الذوق.
- انخفاض أو مستويات منخفضة من فيتامين B12 في الدم [الأعراض ممكن أن تشمل تعب شديد، ألم واحمرار اللسان (التهاب اللسان-glossitis)، الشعور بدبابيس وإبر (تتميل) أو جلد شاحب أو أصفر]. من الممكن أن يجري طبيبك بعض الفحوصات لاكتشاف سبب الأعراض لأن قسم منها قد ينتج أيضًا جزاء مرض السكري أو جزاء مشاكل صحية أخرى ليست ذات صلة.

- أعراض جانبية نادرة أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):  
  - حُمّاض لاكتيكيّ. تعقيد نادر جدًا لكنه وخيم جدًا، خاصة إذا كانت الكلى لديك لا تعملان كما ينبغي. أعراض الحُمّاض اللاكتيكيّ ليست محددة (انظر للبند 2 "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").
  - شذوذ في فحوصات وظائف الكبد أو يرقان (التهاب الكبد، الذي يمكن أن يؤدي لتعب، فقدان شهية، فقدان الوزن، مع أو بدون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا كنت تعانين هذه الأعراض، يجب التوقف عن تناول ميتفورمين جالينيكوم 850 ملغ والتوجه لطبيبك.
  - ردود فعل جلدية مثل احمرار في الجلد (حُمّامى)، حكة أو طفح يسبب الحكة (شرى).

#### الأطفال والمراهقون

- أظهرت بيانات محدودة بخصوص الأطفال والمراهقين أعراض جانبية مشابهة في طبيعتها ووخامتها لتلك التي تم التبليغ عنها لدى البالغين.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جواء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجه إلى الإستمارة الإنترنتية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزّن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب النقيوّ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين تحت 25°C.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. إن هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Hydroxypropylmethyl cellulose, povidone K90, magnesium stearate, macrogol 400 and macrogol 6000.

#### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

أقراص مطلية بفيلم بشكل بيضوي، محدبة من كلا الجهتين، مصبوغة باللون الأبيض حتى المائل للأصفر، مع خط شطر بين الأحرف M و B في جهة واحدة، وخط شطر في الجهة الثانية. الهدف من خط الشطر هو كسر القرص وتسهيل البلع، وليس مخصصًا للتقسيم إلى جرعات متساوية.

تحتوي كل عبوة كرتون على 30 قرصًا مطليًا مغلفة بأشرطة (بليسترات).

#### اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

إي.إل.مدي-ماركت م.ض.، شارع هكطيف 3، المجمع الصناعي عيمك حيفر، 3877701

#### اسم المنتج وعنوانه:

Galenicum Health S.L.U., Sant Gabriel, 50 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

تم تحريرها في تشرين الثاني 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 176-39-37066-99

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.