



**مايزنت® (سيپونيمود):**  
معلومات للمتعالجات  
القادرات على الحمل

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

إضافة إلى ذلك، يمكنك إبلاغ صاحب التسجيل، نوفارتيس إسرائيل م.ض.، على:

[safetydesk.israel@novartis.com](mailto:safetydesk.israel@novartis.com)

تمت المصادقة على هذا الكتيب ومحتواه من قبل وزارة الصحة في تشرين الثاني 2025.

 **NOVARTIS**

نوفارتيس إسرائيل م.ض.، هاتف: 03-9201111

## المحتويات:

1. قبل بدء العلاج بمايزنت.....
2. خلال تناول مايزنت.....2-3
3. بعد التوقف عن العلاج بمايزنت.....3
3. تفاصيل الاتصال بطبيبك.....

## قبل بدء العلاج بمايزنت (سيبونيمود)

**مايزنت (سيبونيمود) ليس معدًا للاستعمال لدى النساء الحوامل أو النساء القادرات على الحمل اللواتي لا يستعملن وسائل منع حمل ناجعة.**



قبل بدء العلاج، إلزامي إجراء فحص حمل للنساء القادرات على الحمل، وإلزامي أيضا أن يصادق الطبيب على أن نتيجة الفحص سلبية. يجب تكرارها بفواصل زمنية ملائمة.

تحدثي مع طبيبك عن وسائل منع الحمل الموثوق بها، والتي عليك استعمالها خلال العلاج بمايزنت ولمدة 10 أيام على الأقل بعد إيقاف العلاج.



لمزيد من المعلومات، اقرأ من فضلك النشرة للمستهلك والدليل للمعالج والمعالج قبل استعمال المنتج.

## خلال تناول مايزنت

عليك تجنب أن تصبجي حاملا خلال تناول مايزنت.



عليك استعمال وسائل منع حمل ناجعة أثناء العلاج وخلال 10 أيام على الأقل بعد إيقاف العلاج.

إذا كنت تخططين للحمل، يرجى أن تتحدثي مع طبيبك لأنك ستحتاجين إلى إيقاف العلاج بمايزنت. سيقدّم لك الطبيب استشارة حول المخاطر المحتملة لدى الجنين والتي قد يسببها مايزنت، ويتحدث معك أيضا عن احتمال معاودة نشاط المرض مجددا.



أخبري طبيبك فوراً إذا أصبحت حاملا أو إذا كنت تعتقدين أنك حامل أثناء تناول مايزنت، لأن هناك حاجة إلى إيقاف العلاج. سيتحدث معك الطبيب عن احتمال معاودة نشاط المرض مجددا.



سيطلب منك أيضا إجراء فحوصات طبية للمتابعة (مثل فحص الموجات فوق الصوتية).

في حال أصبحت حاملا خلال العلاج بمايزنت، يرجى أن تخبري طبيبك فوراً.



تفاصيل الاتصال بطبيبك المعالج:

---

---

---

أو أخبري نوفارتيس عبر كتابة رسالة بريد إلكتروني على العنوان [safetydesk.israel@novartis.com](mailto:safetydesk.israel@novartis.com).

## بعد التوقف عن العلاج بمايزنت

يجب استعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال 10 أيام على الأقل بعد إيقاف العلاج بمايزنت.



في حال حدوث حمل خلال 10 أيام بعد إيقاف العلاج، يرجى أن تبلغي طبيبك بذلك فوراً (تفاصيل الاتصال بالطبيب المعالج: \_\_\_\_\_) أو نوفارتيس عبر كتابة رسالة بريد إلكتروني



على العنوان: [safetydesk.israel@novartis.com](mailto:safetydesk.israel@novartis.com)، من دون علاقة بنتائج شاذة كانت قد شوهدت

عليك إبلاغ طبيبك فوراً إذا كنت تعتقدين أن مرض التصلب المتعدد لديك أخذ بالتفاقم (مثل ضعف أو تغييرات في الرؤية) أو إذا اخترت أعراضاً جديدة أيًا كانت بعد إيقاف العلاج بمايزنت.

## تفاصيل الاتصال بطبيبك



---

---