



מייזנט® (סיפונימוד):
מידע עבור מטופלות בעלות
פוטנציאל להרות



נוברטיס ישראל בע"מ, טל: 03-9201111

RMP-2025-011-HEB FA-11550515

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות:

<https://sideeffects.health.gov.il>

כמו כן, באפשרותך לדווח לבעל הרישום, נוברטיס ישראל בע"מ דרך:

safetydesk.israel@novartis.com

חוברת זו, הפורמט והתוכן אושרו על ידי משרד הבריאות בנובמבר 2025.



במקרה של היריון במהלך הטיפול במייזנט, אנא דווחי על כך לרופא שלך באופן מיידי. פרטי הקשר של הרופא המטפל שלך:



או דווחי לנוברטיס, על ידי שליחת הודעה בדוא"ל לכתובת safetydesk.israel@novartis.com

לאחר הפסקת הטיפול במייזנט

יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים במשך לפחות 10 ימים לאחר הפסקת הטיפול במייזנט.



במקרה של היריון בטווח של 10 ימים לאחר הפסקת הטיפול, אנא דווחי על כך לרופא שלך באופן מיידי (פרטי קשר של הרופא המטפל: _____) או לנוברטיס על ידי שליחת הודעה בדוא"ל לכתובת safetydesk.israel@novartis.com, ללא קשר לתוצאות חריגות שנצפו.



עליך ליידע את הרופא שלך באופן מיידי אם את מאמינה שמחלת הטרשת הנפוצה שלך מחמירה (כגון חולשה או שינויי ראייה) או אם את מבחינה בתסמינים חדשים כלשהם לאחר הפסקת הטיפול במייזנט.

פרטי הקשר של הרופא שלך



תוכן עניינים:

- 2.....לפני תחילת הטיפול במייזנט
- 2-3.....במהלך נטילת מייזנט
- 3.....לאחר הפסקת הטיפול במייזנט
- 3.....פרטי קשר של הרופא שלך

לפני תחילת הטיפול במייזנט (סיפונימוד)

מייזנט (סיפונימוד) אינה מיועדת לשימוש בנשים הרות או בנשים בעלות פוטנציאל להרות שאינן משתמשות באמצעי מניעה יעיל.



לפני תחילת הטיפול, חובה לבצע בדיקת היריון בנשים בעלות פוטנציאל להרות ותוצאה שלילית חייבת להיות מאושרת על ידי רופא. חובה לחזור עליה במרווחי זמן מתאימים.

שוחחי עם הרופא שלך אודות אמצעי מניעה אמינים שבהם עליך להשתמש במהלך הטיפול ובמשך לפחות 10 ימים לאחר הפסקת הטיפול במייזנט.



למידע נוסף, אנא קראי את העלון לצרכן ואת המדריך למטופל ולמטפל לפני השימוש במוצר.

במהלך נטילת מייזנט

עליך להימנע מלהרות במהלך נטילת מייזנט.



עליך להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול ובמשך לפחות 10 ימים לאחר הפסקת הטיפול.

אם את מתכננת להרות, אנא שוחחי עם הרופא שלך מאחר שתצטרכי להפסיק את הטיפול במייזנט. הרופא ייתן לך ייעוץ לגבי הסיכונים הפוטנציאליים לעובר העלולים להיגרם על ידי מייזנט, וידון איתך על חזרה אפשרית של פעילות המחלה.



דווחי לרופא שלך באופן מיידי אם תהרי או תחשבי שאת בהיריון בזמן נטילת מייזנט, מכיוון שיהיה צורך בהפסקת הטיפול. הרופא ידון איתך על חזרה אפשרית של פעילות המחלה.



תקבלי גם בדיקות רפואיות למעקב (כגון בדיקת אולטרסאונד).