

أمبيان سي. آر 6.25 ملغ

أمبيان سي. آر 12.5 ملغ

أقراص ذات تحرير ممتد

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص من أمبيان سي. آر 6.25 ملغ على:

زولبيديم تارترات 6.25 ملغ

يحتوي كل قرص من أمبيان سي. آر 12.5 ملغ على:

زولبيديم تارترات 12.5 ملغ

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أكل. لا تعطه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

تحذير: قد يكون الـ زولبيديم مرتبطاً بسلوكميات شاذة وخطيرة محتملة أثناء ما يبدو كأنه نوم. تشمل هذه السلوكيات المشي أثناء النوم، قيادة المركبات وسلوكيات غريبة أخرى. قد تتفاعل بعض الأدوية مع زولبيديم ويتطلب الأمر الحذر الخاص عند العلاج بأدوية أخرى قد تؤثر هي أيضاً على الدماغ: قبل تناول زولبيديم، اقرأ بتعمق فقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية" أثناء أو إستشر الطبيب أو الصيدلي. لا يجوز شرب الكحول أثناء تناول زولبيديم. لا يجوز تناول زولبيديم لمدة تزيد عن 4 أسابيع. إذا استمرت مشاكل النوم، فاستشر الطبيب.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص كعلاج قصير الأمد بالأرق المتمثل بصعوبات في الخلود إلى النوم و/أو صعوبة في الحفاظ على الإستمرارية النوم.

الفصيلة العلاجية: من المواد المنومة والمهدئة.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة (زولبيديم) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- عليك دائماً فحص المركبات للتأكد من أنك تستطيع إستعمال هذا الدواء.
- شربت الكحول أو تعتقد بأنه قد يوجد كحول في مجرى دمك.
- كنت تعاني من إنقطاع النفس أثناء النوم (اضطراب تنوقف فيه عن التنفس مؤقتاً أثناء النوم).
- كنت تعاني من الوهن العضلي الوبيل (اضطراب تضعف فيه العضلات وتصاب بالإرهاق بسهولة).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت تعاني من مشاكل حادة و/أو خطيرة في الرئتين.
- قاسيت في الماضي من سلوكيات نوم معقدة بعد تناول هذا الدواء، بما في ذلك المشي أثناء النوم، القيادة أثناء النوم، و/أو الإنخراط في أنشطة أخرى بينما لم تكن يظنّاً بالكامل.

بلِّغ الأطباء، أطباء الأسنان والصيدالدة الذين يعالجونك بأنك تتناول أمبيان سي. آر. إذا كنت على وشك بدء العلاج بدواء جديد، بلِّغ الطبيب والصيدلي بأنك تتناول أمبيان سي. آر.

إذا كنت تخطط للخضوع لعملية جراحية تتطلب تخديراً عاماً، بلِّغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول هذا الدواء.

قبل العلاج بالدواء أخبر الطبيب إذا:

- قاسيت من مشاكل تنفسية أو إذا كنت تتخدر في أوقات مقاربة أثناء النوم.
- أدمنت ذات مرة على الكحول، المخدرات أو دواء، أو إذا عانيت ذات مرة من مرض نفسي. إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون معرضاً لخطورة تطوير نمط ثابت أو عادة لتناول أمبيان سي. آر.
- كنت تعاني أو عانيت من إضطرابات طبية أخرى، خاصة تلك المذكورة أعلاه: مشاكل في القلب، الكبد، الكلى أو في الرئتين، الصرع، الإكتئاب، مرض نفسي، على سبيل المثال القصور.
- كنت تخطط للخضوع لعملية جراحية.
- كنت تعاني من حساسية تجاه إحدى المركبات المذكورة في نهاية هذه النشرة.
- كنت تتناول أدوية لعلاج إضطراب آخر.

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي إذا سبق أن عانيت من إضطراب نفسي، أسأت استخدام الكحول أو المخدرات، أو عانيت من التعلق بها.

أثناء العلاج، قد تكون معرضاً لخطورة تطور أعراض جانبية معينة. من المهم أن تفهم هذه المخاطر وأن تعرف كيفية متابعتها. أنظر معلومات إضافية في الفقرة 6.

تحذيرات إضافية

- إذا كان عمرك فوق 65 عاماً وكنت مريضاً أو تتناول أدوية أخرى، فقد تكون أكثر حساسية لبعض الأعراض الجانبية لـ أمبيان سي. آر. قد يكون بعض المتعالمين حساسين بشكل خاص لتأثيرات الدواء المهدئة، التي قد تزيد من احتمال السقوط.
- قد يسبب أمبيان سي. آر العباس وإنخفاض مستوى الوعي. عليك حفظ أمبيان سي. آر في مكان آمن لحمايتك من السرقة، إذ قد يستعمل بشكل غير قانوني للقيام بأعمال جنائية (التي قد تكون خطيرة) خاصة عند دمهج مع الكحول، عندما يُعطى للضحية دون علمها. لا يجوز أبداً إعطاء أمبيان سي. آر لأشخاص آخرين لأنه قد يسبب لهم الضرر.
- في معظم الحالات، يجب إستعمال أدوية النوم لفترات زمنية قصيرة فقط. إذا إستمرت مشاكل النوم، فاستشر الطبيب.
- قد تؤدي بعض الأدوية إلى التعلق، خاصة عند إستعمالها بانتظام لأكثر من عدة أسابيع. الأشخاص الذين عانوا في السابق من التعلق بالكحول أو بأدوية أخرى قد يكونون أكثر عرضة للإدمان على أدوية النوم. إذا كنت مدمناً على الكحول أو الأدوية في الماضي، فمن المهم إبلاغ الطبيب بذلك قبل البدء بإستعمال أمبيان سي. آر.
- أحياناً عند إيقاف العلاج الدوائي بشكل مفاجئ بعد إستعمال مطوّل، فقد تظهر أعراض انسحاب. قد تشمل أعراض الانسحاب تشنجات في البطن والعضلات، تقيؤات وتعرق. في بعض الحالات قد يحدث تفاقم لفترة قصيرة في الأرق، الذي قد يكون مصحوباً برودة فعل إضافية تشمل تغيرات في المزاج، قلق وعدم إرتياح؛ تحدث مع الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض. إن المتعالمين الذين شاركوا في التجارب لم يقاسوا من أية مشاكل جراء التوقف عن تناول أمبيان سي. آر. مع ذلك، بلغ الطبيب إذا قاسيت من مشاكل جراء التوقف عن تناول أمبيان سي. آر.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء أمبيان سي. آر لطفل أو المراهق دون عمر 18 سنة، لا توجد تجربة حول الإستعمال لدى الأطفال أو المراهقين دون عمر 18 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد تؤدي بعض الأدوية إلى تشويش تأثير أمبيان سي. آر والتأثير على طريقة عمله.

الأدوية التي قد تزيد من تأثير أمبيان سي. آر تشمل:

- الكحول
- أدوية لعلاج الإكتئاب، القلق ومرض نفسي
- أدوية التي تستعمل للتهدئة أو للحث على النوم
- أدوية لعلاج الصرع
- مسكنات الآلام
- أدوية لإرخاء العضلات
- مضادات الهيستامين
- سيبروفلوكساسين، دواء يستعمل لعلاج التلوثات

● كيتوكونازول، دواء لعلاج التلوثات الفطرية

● مواد أفيونية المفعول

قد تزيد هذه الأدوية من النعاس. قد يؤثر هذا الأمر في القدرة على قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات الخطرة. من الجائز أن تحتاج إلى إستعمال كميات مختلفة من الدواء أو إلى تناول أدوية أخرى. سيقدم لك الطبيب الإستشارة.

الأدوية التي قد تقلل من تأثير أمبيان سي. آر تشمل:

● St John's wort (المعروفة أيضاً بهيبيريكوم)، دواء نباتي الذي يستعمل لعلاج الإكتئاب

● ريفامپيسين، دواء الذي يستعمل لعلاج التلوث

إستوضح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من الأدوية، الفيتامينات أو المكملات التي تتناولها ومن تأثيرها المحتمل على أمبيان سي. آر.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول قبل أو بعد تناول هذا الدواء. قد يؤدي الأمر إلى زيادة خطورة حدوث أعراض جانبية أو إلى إمكانية تفاقم تأثيرات الكحول أثناء تناول أمبيان سي. آر. بلّغ الطبيب إذا كنت تشرب الكحول.

الحمل والإرضاع

إستشيري الطبيب إذا كنتِ حاملًا، تظنين بأنك حامل، أو تخططين للحمل. بالمشابه لغالبية الأدوية من هذا النوع، لا يوصى بإستعمال أمبيان سي. آر أثناء الحمل. سيناقش الطبيب المخاطر والفوائد المرتبطة بتناوله إذا كنتِ حاملًا.

إذا حملت أو شككت بأنك حامل أثناء تناول هذا الدواء، فتوقفي عن تناوله وبلّغي الطبيب أو الصيدلي فورًا.

تحدثي مع الطبيب إذا كنتِ مرضعة أو تخططين للإرضاع.

قد ينتقل أمبيان سي. آر إلى حليب الأم. سيناقش الطبيب المخاطر والفوائد المرتبطة بإستعماله إذا كنتِ مرضعة أو تخططين للإرضاع.

السياقة وإستعمال الماكينات

بما أن أمبيان سي. آر قد يسبب النعاس، فلا يجوز تشغيل الماكينات الخطرة أو قيادة المركبات لمدة 8 ساعات بعد تناوله. كما أنه، عليك توخي الحذر في صباح اليوم التالي عند الإستيقاظ.

تأكد من معرفتك كيفية إستجابتك لـ أمبيان سي. آر قبل القيادة أو تشغيل الماكينات. يعتبر ذلك مهمًا جداً إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تسبب لك هي أيضاً النعاس.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على الكلتوز. إستشر طبيبك قبل بدء إستعمال الدواء إذا وُجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

عند الحاجة، يجب تناول قرص واحد فقط من أمبيان سي. آر في الليل، مباشرة قبل النوم. المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو عادة: للنساء – قرص من عيار 6.25 ملغ. للرجال – 12.5-6.25 ملغ.

بالنسبة للمسنين والمتعالجين الذين لديهم مشاكل في وظيفة الكبد، فإن المقدار الدوائي هو قرص من عيار 6.25 ملغ، مرة واحدة في الليل، مباشرة قبل النوم. لا يجوز الإستعمال إذا تم تشخيص قصور شديد في الكبد.

لا يجوز تجاوز مقدار دوائي قدره 12.5 ملغ مرة في اليوم، مباشرة قبل النوم.

يجب التأكد من أنه بإمكانك النوم 7-8 ساعات على الأقل بعد تناول الدواء. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا تتناول أمبيان سي. آر إذا شربت الكحول في نفس المساء أو قبل النوم.

لا يجوز تناول أمبيان سي. آر مع وجبة الطعام أو مباشرة بعدها. بإمكان أمبيان سي. آر أن يساعده على النوم بشكل أسرع وذلك إذا قمت بتناوله على معدة خاوية.

مدة العلاج:

أمبيان سي. آر مخصص للإستعمال قصير الأمد فقط. يجب أن يكون العلاج بـ أمبيان سي. آر قصيراً قدر الإمكان لأن الخطورة لحدوث تعلق تزداد طالما كانت فترة العلاج مطوّلة أكثر. مدة العلاج الإعتيادية بالدواء هي يومين حتى أربعة أسابيع.

لدى بعض المتعالجين، إن النسب الأعلى للدواء في الدم تكون في الصباح، وذلك بعد تناول 12.5 ملغ قبل النوم، مما تزيد الخطورة لتضرر اليقظة، القدرة على السياقة والقدرة على التركيز.

توجه لطبيبك إذا تفاقت أو لم تتحسن حالة الأرق لديك خلال 7-10 أيام. قد يدل هذا الأمر بأن هناك حالة طبية أخرى تؤدي إلى مشاكل في نومك. الأقراص غير مخصصة للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

طريقة التناول:

يجب بلع القرص بشكله الكامل. لا يجوز مضغ، شطر أو سحق القرص. القرص مركب من طبقتين، تُحرران المادة الفعالة بشكل ممتد. إذا لم يكن بمقدورك بلع قرص أمبيان سي. آر بشكله الكامل، أخبر الطبيب بذلك. من الجائز أن تحتاج إلى تلقي دواء آخر.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء:

يجب تناول الدواء مباشرة قبل النوم فقط إذا كنت تستطيع النوم بعد ذلك 7-8 ساعات على الأقل. إذا نسيت تناول الدواء قبل النوم فلا يجوز تناول مقدار دوائي بأي وقت آخر لأنه من الجائز أن تشعر بنعاس، دوار وإرتباك خلال اليوم.

لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بـ أمبيان سي. آر بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسّن على حالتك الصحية، وحينئذ يكون التوقف بشكل تدريجي فقط.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

في اليوم أو اليومين التاليين لبيان التوقف عن تناول الدواء من الجائز أن تظهر ردود الفعل التالية: مشاكل في النوم، غثيان، تورد، دوار، بكاء خارج عن السيطرة، تقيؤ، تقلصات بطنية، نوبة قلق، عصبية وألم في منطقة المعدة.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أمبيان سي. آر قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. بلّغ الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا شعرت بسوء خلال فترة تناول أمبيان سي. آر.

قد يؤدي أمبيان سي. آر لأعراض جانبية خطيرة، تشمل:

ردود فعل تحسسية:

● إنخفاف في الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة، الذي قد يؤدي إلى صعوبات في البلع أو التنفس

● شرى

● إغماء

المشي أثناء النوم وسلوكيات مصاحبة:

المشي أثناء النوم، قيادة المركبات وسلوكيات شاذة أخرى، وأحياناً خطيرة، أثناء ما يبدو كأنه نوم. شملت هذه السلوكيات، أيضاً، تحضير الطعام وتناوله، إجراء مكالمات هاتفية أو ممارسة علاقات جنسية. الأشخاص الذين قاسوا من هذه الأعراض لم يتذكروا الأحداث.

توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض الجانبية الخطيرة.

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. لا يجوز تناول الدواء إذا كانت العبوة معطوبة أو يبدو عليها علامات تضرر.

شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

إذا لم تعد بحاجة لهذا الدواء أو إذا إنقضت صلاحيته، فيجب إعادته إلى أي صيدلية للتخلص منه بطريقة آمنة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Ambien CR 6.25 mg: lactose monohydrate 138.913 mg, microcrystalline cellulose, hypromellose, potassium hydrogen tartrate, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 3350, colloidal anhydrous silica, red iron oxide.

Ambien CR 12.5 mg: lactose monohydrate 138.913 mg, microcrystalline cellulose, hypromellose, potassium hydrogen tartrate, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 3350, indigotine (E132)-aluminium lake, colloidal anhydrous silica, yellow iron oxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أمبيان سي. آر 6.25 ملغ أقراص ذات تحرير ممتد – أقراص مستديرة بلون زهري. أمبيان سي. آر 12.5 ملغ أقراص ذات تحرير ممتد – أقراص مستديرة بلون أزرق. تتوفر عبوات ذات 14 أو 28 قرصاً ذو تحرير ممتد. من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العبوة.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي إسرائيل م.ض.، مُجمّع جرينوروك، ص.ب. 47، باكوم.

تم إعدادها في أيلول 2025 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

Ambien CR 6.25 mg: 1420531833

Ambien CR 12.5 mg: 1420631834

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

لمزيد من المعلومات حول المستحضر والنشرات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، قوموا بمسح الكود التالي:

For further information about the medicinal product and for updated consumer leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:

أمبيان سي. آر 12.5 ملغ
AMBIEN CR 12.5 mg



أمبيان سي. آر 6.25 ملغ
AMBIEN CR 6.25 mg



بالإمكان التوجه إلى شركة سانوفي، صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني: PrintedLeaflet@sanofi.com أو على هاتف رقم 09-8633081.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder sanofi by email: PrintedLeaflet@sanofi.com or by telephone: 09-8633081.

قد يزيد الكحول من خطورة المشي أثناء النوم والسلوكيات الأخرى المرتبطة بذلك. كما أنه، يمكن أن تظهر هذه الأعراض الجانبية حتى في غياب الكحول. على الرغم من إمكانية حدوث هذه الأعراض عند استعمال المقادير الدوائية الاعتيادية الموصى بها، فإن خطورة ظهور هذه التصرفات قد تزداد إذا تناولت مقدار دوائي أعلى من المقدار الدوائي الموصى به.

قد تسبّب أدوية معينة للنوم فقداناً قصير الأمد للذاكرة. عند حدوث ذلك، قد لا يتذكر الشخص الأحداث التي وقعت خلال عدة ساعات بعد تناول الدواء. عادة لا يشكل ذلك مشكلة، لأن معظم الأشخاص ينامون بعد تناول هذا الدواء. أعراض جانبية أقل خطورة:

مرتبطة بالرأس والجهاز العصبي:

- نعاس
- دوام
- صداع
- إنهاك
- قلق
- توهان
- هلوسة
- كوابيس
- بطء في التفكير والحركة
- خلل في الإصغاء والتركيز
- تضرر الذاكرة وفقدان الذاكرة
- تغيرات غير متوقعة في السلوك. شملت تلك نوبات غضب، تفاقم الأرق، إرتباك، عدم هدوء، هلوسة، إرتباك حاد (هذيان) وأشكال أخرى من السلوك غير المرغوب به

مرتبطة بالجهاز الهضمي:

- إنزعاج في المعدة، عسر الهضم، غازات، التبرز بوتيرة كبيرة
- إسهال، غثيان وتقيؤات
- إمساك
- تغيرات في الشهية للطعام

مرتبطة بالجهاز العضلي الهيكلي:

- آلام عضلية، ضعف عضلي أو تحسس في العضلات غير ناتج عن مجهود
- تشنجات عضلية
- آلام في الرقبة والظهر

مرتبطة بالتوتوث:

- الإنفلوانزا أو أعراض شبيهة بالإنفلوانزا، مثل سخونة مرتفعة، ألم في الحلق، سيلان الأنف، سعال وقشعريرة

مرتبطة بالعينين:

- إضطرابات في الرؤية

على الرغم من إمكانية ظهور هذه الأعراض الجانبية عند استعمال المقادير الدوائية الاعتيادية الموصى بها، فإن خطورة ظهور هذه السلوكيات قد يزداد إذا تناولت مقدراً دوائياً أعلى من المقدار الدوائي الموصى به.

تحدّث مع الطبيب إذا قاسمت من إحدى هذه الأعراض الجانبية الأقل خطورة وكانت تقلقلك.

بلّغ الطبيب أو الصيدلي إذا لاحظت عرض آخر قد يسبّب شعوراً سيئاً. قد تظهر أعراض جانبية إضافية غير مذكورة هنا لدى بعض الأشخاص. توجه إلى الطبيب لأي إستفسار لديك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إستمرت لأكثر من عدة أيام أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>