

פקסופנאדין-תרימה	פקסופנאדין-תרימה
120 מ"ג	180 מ"ג
טבליות מצופות	טבליות מצופות
חומר פעיל וכמות: כל טבלייה מכילה: פקסופנאדין הידרוכלוריד (fexofenadine hydrochloride)	כל טבלייה מכילה: פקסופנאדין הידרוכלוריד (fexofenadine hydrochloride)
120 מ"ג	180 מ"ג

חומרים לא פעילים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע אמצעית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המימון בעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. פנה לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת להקלת תסמינים הקשורים לנזלת אלרגית עונתית.
פקסופנאדין-תרימה 180 מ"ג: התרופה משמשת להקלת תסמינים הקשורים לתפוחית תתמשכת המלווה בגרד.
קבוצה תרופית: אנטיהיסטימי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
אתה רגיש (אלרגי) לפקסופנאדין או לכל אחד ממרכיבי התרופה הנוספים (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני הטיפול בפקסופנאדין-תרימה היועץ עם הרופא אם:**
- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכליה או הכבד.
 - אתה סובל או סבלת בעבר ממחלת לב, כיוון שתרופה מסוג זה יכולה לגרום לקצב לב מהיר או לא סדיר.
 - אתה קשיש.
 - אם אחד מהמצבים הללו רלוונטי אליך או אם אינך בטוח, ספר לרופא לפני שאתה נוטל פקסופנאדין-תרימה.
 - ילדים ומתבגרים**
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

תגובות בין-תרופתיות

- אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
- אפלוטמיד (תרופה לטיפול בסרטן הערמונית), כיוון שההשפעה של פקסופנאדין-תרימה עלולה לרדת.
 - תרופות לבעיות עיכול שמכילות אלומיניום או מגנזיום. אלו עשויות להשפיע על פעילות פקסופנאדין-תרימה בכך שהן מקטינות את כמות התרופה שנספגת.
- מומלץ ליטול תרופות אלו לבעיות עיכול שעתיים לפני או אחרי נטילת פקסופנאדין-תרימה.

שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

יש לבלוע את התרופה עם מים לפני האוכל. אין ליטול את התרופה עם מיץ פירות.

הריון והנקה

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת הריון, יש היוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.
אין לקחת פקסופנאדין-תרימה בהריון אלא אם זה הכרחי.
פקסופנאדין-תרימה אינו מומלץ בזמן הנקה.

היגיה ושימוש במכונות

לא סביר שפקסופנאדין-תרימה ישפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות, אולם, עליך לודא לפני שאתה נוהג או מפעיל מכונות שהטבליות לא גורמות לך לישנוניות או לסחרחורת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה, לכן ניתן לומר שהיא "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
למבוגרים וילדים מגיל 12 ומעלה המינון המקובל בדרך כלל הוא:
פקסופנאדין-תרימה 120 מ"ג: טבלייה אחת (120 מ"ג) פעם ביום.
פקסופנאדין-תרימה 180 מ"ג: טבלייה אחת (180 מ"ג) פעם ביום.
יש לבלוע את התרופה עם מים לפני האוכל. אין ליטול את התרופה עם מיץ פירות.
אין קו חציה בטבלייה. אין מידע לגבי ריסוק/כתישה של הטבלייה.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלעת ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים של מנת יתר במבוגרים הם סחרחורת, ישנוניות, עייפות ויובש בפה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה רוצה להפסיק לקחת פקסופנאדין-תרימה לפני סיום הטיפול שהומלץ על ידי הרופא, ספר זאת לרופא.

אם תפסיק לקחת פקסופנאדין-תרימה מוקדם מהמתוכנן הסימפטומים עלולים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושיך! בדיקת התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפקסופנאדין-תרימה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

פנה לרופא מייד והפסק לקחת פקסופנאדין-תרימה אם אתה סובל מנפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון ומקשיים בנשימה, מכיוון שאלו עשויים להעיד שאתה סובל מתגובה אלרגית חמורה.

תופעות הלוואי הבאות דוחו בביסויים קליניים, עם שכיחות דומה לאלו שנצפו בחולים שלא קיבלו את התרופה (פלצבו):

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10): כאב ראש, נמנם, בחילה וסחרחורת.

תופעות לוואי שכיחות

(100): עייפות/ישנוניות.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה): נדודי שינה, הפרעות שינה, חלומות רעים, עצבנות, דפיקות לב מהירות או לא סדירות, שלשול, פריחה בעור וגרד, חרלת, תגובות אלרגיות קשות העלולות לגרום לנפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון, הסמקה, לחץ בחזה וקשיי נשימה, ראייה מטושטשת.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> או safety@trima.co.il. ניתן גם לדווח על תופעות לוואי לדוא"ל: safety@trima.co.il.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להאקלה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום יבש, מתחת ל-25°C.
- אל תזרוק תרופה כלשהי באמצעות שפיכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח איך לזרוק את התרופות שאתה כבר לא משתמש בהן. צעדים אלו יסייעו להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, Opadry OY 8704 Orange (hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C yellow #6/sunset yellow fcf aluminum lake, D&C yellow #10 aluminum lake).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פקסופנאדין-תרימה 120 מ"ג – טבלייה מצופה, עגולה, קמורה משני הצדדים, בצבע כתום בהיר.
פקסופנאדין-תרימה 180 מ"ג – טבלייה מצופה, מאורכת, קמורה משני הצדדים, בצבע כתום בהיר.
כל אריזה מכילה 15 טבליות הארוזות במגשיט (בליסטרים).

יצרן ובעל הרישום: תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.
נערך בספטמבר 2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
פקסופנאדין-תרימה 120 מ"ג: 162-12-35365-00
פקסופנאדין-תרימה 180 מ"ג: 162-13-35366-00

לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.