

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إلْتِوب 25	إلْتِوب 50	إلْتِوب 75
أقراص مطلية	أقراص مطلية	أقراص مطلية

يحتوي كل قرص من إلْتِوب **25** على:

إلترومبوبات (كـ أولامين) **25** ملغ

يحتوي كل قرص من إلْتِوب **50** على:

إلترومبوبات (كـ أولامين) **50** ملغ

يحتوي كل قرص من إلْتِوب **75** على:

إلترومبوبات (كـ أولامين) **75** ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة وموادنا الحساسة في المستحضر، أنظر في الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بعناية حتى يهتائكما قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إن ذا توغرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصِفَ دواء إلْتِوب للحلاج من أجل، لا تحمله لأخرين، هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي عرض مخصص الدواء؟

• لعلاج البالغين الذين إضطراب نخثر من نوع قلة الصفائح الدموية المناعي الأولي (ITP)،

• لعلاج إلْتِوب ITP معروضون لخطورة أكبر لحدوث نزف، إن إلتحاذ الذي مرضى لديهم ITP من

ملازمة إلْتِوب الأولي (ITP) الذي يستمر 6 أشهر أو أكثر منذ التشخيص، المقاوم للعلاجات الأخرى (مثل الكورتيكوستيرويدات، الغلوبولينات المناعية).

• لعلاج الأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق لديهم إضطراب نخثر من نوع قلة الصفائح الدموية المناعي الأولي (ITP)،

• لعلاج إلْتِوب ITP معروضون لخطورة أكبر لحدوث نزف، إن إلتحاذ الذي مرضى لديهم ITP من

ملازمة إلْتِوب الأولي (ITP) الذي يستمر 6 أشهر أو أكثر منذ التشخيص، المقاوم للعلاجات الأخرى (مثل الكورتيكوستيرويدات، الغلوبولينات المناعية).

• لعلاج ITP بسبب إنخفاض في تعداد الصفائح الدموية (thrombocytopenia). الأشخاص الذين لديهم ITP معروضون لخطورة أكبر لحدوث نزف، إن إلتحاذ الذي مرضى لديهم ITP من

ملازمة إلْتِوب الأولي (ITP) الذي يستمر 6 أشهر أو أكثر منذ التشخيص، المقاوم للعلاجات الأخرى (مثل الكورتيكوستيرويدات، الغلوبولينات المناعية).

• لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.

• لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

الفصلية العلاجية:

ينتمي إلْتِوب لمجموعة الأدوية لمنع الأثرقة، أدوية أخرى جهازية قاطمة للأثرق.

يحتوي إلْتِوب على إلترومبوبات، التي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تُسمى ناضحات مستقل

الثرومبوبيوتين (thrombopoietin receptor agonist)، يُستعمل للمساعدة على رفع عدد

الصفائح الدموية في الدم. الصفائح الدموية هي خلايا دموية تُساهم في تظليل أو منع النزيف.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر

في الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية").

أفحص مع الطبيب إذا كنت تتعمد بأن ذلك ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إلْتِوب أخبر الطبيب إذا:

• وجدت لديك مشاكل في الكبد. الأشخاص الذين لديهم إنخفاض في تعداد الصفائح الدموية بالإضافة إلى مرض كبدى مزمن متقدم لديهم خطورة أعلى لظهور أعراض جانبية، بما في ذلك

ضرر كبدى يشكل خطراً على الحياة وخثرات دموية. إذا اعتقد طبيبك أن فوائد تناول إلْتِوب تفوق

المخاطر، فسنتكون تحت مراقبة شديدة أثناء العلاج.

إذا كنت تتلقى علاجات أساسها إيثريفرون سوية مع إلْتِوب، فستخضع لمراقبة أية علامة لحدوث نزف

في العدة أو الأبعاد بعد التوقف عن تناول إلْتِوب.

مراقبة القلب

من الجائز أن يفكر طبيبك بأنه من الضروري مراقبة قلبك خلال العلاج بـ إلْتِوب ويجري فحص التخطيط الكهربائي للقلب.

كما تقدمت بالمرح

- إذا إضطرت لمرافقة الفراض لفترة زمنية مطوّلة

- إذا وُجد لديك سرطان

- إذا كنت تتناولين أقراص منع الحمل أو علاج هورموني بديل

- إذا إلتزمت عملية جراحية مؤخراً أو تعرضت لإصابة

- إذا كنت ذو مرضاً أو أكثر زائد بشكل كبير (فرط بدانة)

- إذا كنت مدخناً

• **الأطفال والمراهقون** المستحضر حسب إستمعال إلْتِوب لدى مرضى بعمر 6 سنة وما فوق. يجب توخي الحذر عند إستعمال إلْتِوب إذا كان عمرك 6 سنة وما فوق.

• **إلْتِوب غير مخصص** للأطفال دون عمر 6 سنوات لديهم ITP أو فقر دم لا تنسجى خطير (SAA) كعلاج خط أول لمريض مشاركة أدوية أخرى.

• **إلْتِوب غير مخصص** للأطفال ومرافقين دون عمر 18 سنة لديهم إنخفاض في تعداد الصفائح الدموية نتيجة إلتهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C أو فقر الدم اللاتنسجي الخطير (SAA) حيث إن إلتحاذ أو كوري) ومن الجائز أن تتحاذ لبديده بمقدار دوائي **أخفص ذي 25 ملغ**.

• **التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية**

• **وجدت لديك مشكلة لدى تتعلق بالدم، مثل** ملازمة خلل التنسج المناعي (MDS – myelodysplastic syndrome)، سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوص للتأكد من عدم معاناتك من هذه المشكلة الدموية

قبل أن تبدأ بتناول إلْتِوب. إذا وُجدت أنت ملازمة خلل التنسج المناعي وكنت تتناول إلْتِوب، فإن ملازمة خلل التنسج المناعي الكبد قد تتفاقم.

أخبر طبيبك إذا تتلقى عليك أيًا من هذه.

فحوص العينين

يوصى طبيبك بإجراء الفحص لوجود كاتاراكت. إذا لم تجزّ فحوص عينين إعتيادية، سيرسلك طبيبك لإجراء فحوص دورية. من الجائز أيضاً أن تجتاز فحصاً لوجود نزف داخل الشبكية أو حولها (طبقة

شاهها أن تشمل حبرات (بقع حمراء دائرية مسطحة صغيرة تحت الجلد)، كدمات، رعاغ، الأثرقة في

التهلة أو لا يمكن السيطرة على النزف إذا تعرضوا لجروح أو إصابة.

• **للعلاج قلة الصفائح الدموية** (إنخفاض تعداد الصفائح الدموية) لدى مرضى بالغين لديهم إلتهاب كبد فيروسي مزمن من نوع C (HCV)، وذلك لتكثيد هذه ومواصلة علاج يعتمد على الإيثريفرون.

• **لعلاج فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** بالدمج مع أدوية أخرى لمعالجة الـ SAA. كعلاج خط أول لدى البالغين والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق.

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

فحوص نخاع العظم

بالنسبة لأشخاص لديهم مشاكل في نخاع العظم، فإن أوية مثل **إلْتِوب** قد تتفاقمها. علامات لحدوث تغيرات في نخاع العظم يمكن أن تظهر كنتائج شاذة في فحوص دمك. من الجائز أن يقوم طبيبك أيضاً بإجراء فحوص نخثير نخاع العظم لديك بشكل مباشر خلال العلاج بـ إلْتِوب.

فحوص لحدوث نزف في الجهاز الهضمي

إذا كنت تتلقى علاجات أساسها إيثريفرون سوية مع إلْتِوب، فستخضع لمراقبة أية علامة لحدوث نزف

في العدة أو الأبعاد بعد التوقف عن تناول إلْتِوب.

مراقبة القلب

من الجائز أن يفكر طبيبك بأنه من الضروري مراقبة قلبك خلال العلاج بـ إلْتِوب ويجري فحص التخطيط الكهربائي للقلب.

كما تقدمت بالمرح

- إذا إضطرت لمرافقة الفراض لفترة زمنية مطوّلة

- إذا وُجد لديك سرطان

- إذا كنت تتناولين أقراص منع الحمل أو علاج هورموني بديل

- إذا إلتزمت عملية جراحية مؤخراً أو تعرضت لإصابة

- إذا كنت ذو مرضاً أو أكثر زائد بشكل كبير (فرط بدانة)

- إذا كنت مدخناً

• **الأطفال والمراهقون** المستحضر حسب إستمعال إلْتِوب لدى مرضى بعمر 6 سنة وما فوق. يجب توخي الحذر عند إستعمال إلْتِوب إذا كان عمرك 6 سنة وما فوق.

• **إلْتِوب غير مخصص** للأطفال دون عمر 6 سنوات لديهم ITP أو فقر دم لا تنسجى خطير (SAA) كعلاج خط أول لمريض مشاركة أدوية أخرى.

• **إلْتِوب غير مخصص** للأطفال ومرافقين دون عمر 18 سنة لديهم إنخفاض في تعداد الصفائح الدموية نتيجة إلتهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C أو فقر الدم اللاتنسجي الخطير (SAA) حيث إن إلتحاذ أو كوري) ومن الجائز أن تتحاذ لبديده بمقدار دوائي **أخفص ذي 25 ملغ**.

• **التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية**

• **وجدت لديك مشكلة لدى تتعلق بالدم، مثل** ملازمة خلل التنسج المناعي (MDS – myelodysplastic syndrome)، سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوص للتأكد من عدم معاناتك من هذه المشكلة الدموية

قبل أن تبدأ بتناول إلْتِوب. إذا وُجدت أنت ملازمة خلل التنسج المناعي وكنت تتناول إلْتِوب، فإن ملازمة خلل التنسج المناعي الكبد قد تتفاقم.

أخبر طبيبك إذا تتلقى عليك أيًا من هذه.

فحوص العينين

يوصى طبيبك بإجراء الفحص لوجود كاتاراكت. إذا لم تجزّ فحوص عينين إعتيادية، سيرسلك طبيبك لإجراء فحوص دورية. من الجائز أيضاً أن تجتاز فحصاً لوجود نزف داخل الشبكية أو حولها (طبقة

شاهها أن تشمل حبرات (بقع حمراء دائرية مسطحة صغيرة تحت الجلد)، كدمات، رعاغ، الأثرقة في

التهلة أو لا يمكن السيطرة على النزف إذا تعرضوا لجروح أو إصابة.

• **للعلاج قلة الصفائح الدموية** (إنخفاض تعداد الصفائح الدموية) لدى مرضى بالغين لديهم إلتهاب كبد فيروسي مزمن من نوع C (HCV)، وذلك لتكثيد هذه ومواصلة علاج يعتمد على الإيثريفرون.

• **لعلاج فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** بالدمج مع أدوية أخرى لمعالجة الـ SAA. كعلاج خط أول لدى البالغين والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق.

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **مضادات الحموضة –** أدوية ضد الإضطرابات الهضمية **والحرقان**

• **أدوية معينة من مضادات المعادن والفيتامينات،** تشمل: الحديد، الكالسيوم، المغنزيوم، الأومنيوم، السيلينيوم والزنك

إن لم تتلق يدوية العلاجات، فلن يُمنَح الدواء كما ينبغي في جسمك.

إن لم تتلق يدوية العلاجات، فلن يُمنَح الدواء كما ينبغي في جسمك.

لإستشارة إضافية بالنسبة للأطعمة والمشروبات الملائمة، تحدث مع طبيبك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي إلْتِوب على الكلتور. إذا قال لك الطبيب أن لديك عدم تحمّل لأنواع معينة من السكر، فاستشر

الطبيب قبل أن تتناول هذا الدواء.

يحتوي إلْتِوب على أقل من 1 ميليومول (20 ملغ) صوديوم في كل قرص، أي أنه يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

سيتم فحصك لتحديد علامات أو أعراض إذا كانت لحدوث أعراض جانبية ويُعطى لك فوراً علاجاً مناسباً.

إذا نسيتم تناول الدواء

• **3. كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يجب أن يحددها من قبل الطبيب فقط.

لا تقم بتغيير المقدار الدوائي أو الجدول الزمني لتناول إلْتِوب إلا إذا أخبرك الطبيب أو الصيدلي الخاص بك بتغيير ذلك. خلاف فترة تناوك إلْتِوب ستخضع للعلاج من قبل طبيب مختص في علاج حالتك.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

إلْتِوب 25

• **إلْتِوب غير مخصص** للأطفال ومرافقين دون عمر 18 سنة) – المقدار الدوائي الإعتيادي لعلاج الـ ITP هو قرص

دموية نتيجة إلتهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C أو فقر الدم اللاتنسجي الخطير (SAA) حيث إن إلتحاذ أو كوري) ومن الجائز أن تتحاذ لبديده بمقدار دوائي **أخفص ذي 25 ملغ**.

• **العلاجات/التفاعلات بين الأدوية**

• **وجدت لديك مشكلة لدى تتعلق بالدم، مثل** ملازمة خلل التنسج المناعي (MDS – myelodysplastic syndrome)، سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوص للتأكد من عدم معاناتك من هذه المشكلة الدموية

قبل أن تبدأ بتناول إلْتِوب. إذا وُجدت أنت ملازمة خلل التنسج المناعي وكنت تتناول إلْتِوب، فإن ملازمة خلل التنسج المناعي الكبد قد تتفاقم.

أخبر طبيبك إذا تتلقى عليك أيًا من هذه.

• **للعلاج قلة الصفائح الدموية** (إنخفاض تعداد الصفائح الدموية) لدى مرضى بالغين لديهم إلتهاب كبد فيروسي مزمن من نوع C (HCV)، وذلك لتكثيد هذه ومواصلة علاج يعتمد على الإيثريفرون.

• **لعلاج فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** بالدمج مع أدوية أخرى لمعالجة الـ SAA. كعلاج خط أول لدى البالغين والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق.

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

• **لعلاج بقايا منخبط لجهاز المناعة.**

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو مرض يحدث فيه ضرر في نخاع العظم، مما يؤدي إلى

نقص في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء) والصفائح الدموية (قلة الصفائح).

تحدث للأشخاص معينين **أثرقة** في الجهاز الهضمي بعد توقفهم عن تناول بيج إلتريفيرون، ريبألفرين وإلْتِوب. الأعراض تشمل:

• **براز أسود** يشبه التراب في الكبد، زيادة التبول ليلاً، قيحور كلوي، خلايا دم بيضاء في البول؛

• **براز يؤثر على طعمي 1 من بين 100 شخص**

• **دم في برازك**

• **تقيح دم أو مادة تبدو مثل بيض الحبيبات العفوية**

أخبر طبيبك فوراً إذا وُجد لديك واحد من تلك الأعراض.

الأعراض الجانبية التالية تُبلغَ على أنها مرتبطة بالعلاج بـ إلْتِوب لدى متعالجين بالغين الذين يعانون من ITP:

• **غرفة الطوارئ في المستشفى** وأحصُر معك عبوة الدواء.

• **سيتم فحصك لتحديد** علامات أو أعراض إذا كانت لحدوث أعراض جانبية ويُعطى لك فوراً علاجاً مناسباً.

إذا نسيتم تناول الدواء

• **رشح: شتان، إسهال، سعال،** تلوث في الأنف، في الجيوب الأنفية، في الحنجرة وفي الطرق التنفسية العلوية (تلوث في الفم، التهاب اللوزتين، التهابات في العين، التهابات في الجهاز الهضمي).

• **أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل إلْتِوب في يوم واحد.**

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول إلْتِوب من دون التحدث مع طبيبك. إننا أوصاك الطبيب بإيقاف العلاج، فسيتم فحص تعداد الصفائح الدموية لديك بعد ذلك كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع. أنظر معلومات إضافية في الفقرة 4 "لإشارة أو كدمات بعد توقفك عن العلاج".

• **أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – أعراض التي تظهر لدى أكثر من بين 100 واحد من عشرة:**

• **إلْتِوب غير مخصص** للأطفال ومرافقين دون عمر 18 سنة) – المقدار الدوائي الإعتيادي لعلاج الـ ITP هو قرص

دموية نتيجة إلتهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C أو فقر الدم اللاتنسجي الخطير (SAA) حيث إن إلتحاذ أو كوري) ومن الجائز أن تتحاذ لبديده بمقدار دوائي **أخفص ذي 25 ملغ**.

• **العلاجات/التفاعلات بين الأدوية**

• **وجدت لديك مشكلة لدى تتعلق بالدم، مثل** ملازمة خلل التنسج المناعي (MDS – myelodysplastic syndrome)، سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوص للتأكد من عدم معاناتك من هذه المشكلة الدموية

قبل أن تبدأ بتناول إلْتِوب. إذا وُجدت أنت ملازمة خلل التنسج المناعي وكنت تتناول إلْتِوب، فإن ملازمة خلل التنسج المناعي الكبد قد تتفاقم.

أخبر طبيبك إذا تتلقى عليك أيًا من هذه.

• **للعلاج قلة الصفائح الدموية** (إنخفاض تعداد الصفائح الدموية) لدى مرضى بالغين لديهم إلتهاب كبد فيروسي مزمن من نوع C (HCV)، وذلك لتكثيد هذه ومواصلة علاج يعتمد على الإيثريفرون.

• **لعلاج فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** بالدمج مع أدوية أخرى لمعالجة الـ SAA. كعلاج خط أول لدى البالغين والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق.

• **لعلاج متعالجين بالغين لديهم فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA)** والذين لم يستجيبوا بشكل كافٍ

فقر الدم اللاتنسجي الشديد (SAA) هو