

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

بيلاكستين

أقراص

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص من بيلاكستين على:

20 ملغ من بيلاستين (Blastine).

للاطلاع على قائمة المركبات الإضافية انظر البند 6.

انظر أيضاً "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في

البند 2.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا

توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج حالتك. لا تعطه للآخرين. قد

يضرهم الدواء حتى لو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي عرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج أعراض التهاب الأنف التحسسي والتهاب

الملتحمحة التحسسي (الموسمي أو الدائم) والطفوح الجلدية المثيرة

للحكة (أورتيكاريا/شرى) لدى البالغين والمراهقين الذين يزيد

عمرهم عن 12 عاماً.

الفصلية العلاجية: مضادات الهيستامين.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من

المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (للاطلاع على

قائمة المركبات الإضافية، انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

إذا استمرت الأعراض، فيجب استشارة الطبيب. يُمنع تجاوز

الجرعة الموصى بها.

قبل البدء بالعلاج ببيلاكستين أخبر طبيبك:

إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من تضرر متوسط

إلى شديد في الأداء الوظيفي الكلوي، من مستويات منخفضة في

الدم للبيوتاسيوم، المغنيزيوم، الكالسيوم، إذا وُجدت لديك الآن

أو كانت لديك في الماضي مشاكل في نظم القلب أو إذا كان

نظم القلب لديك منخفضاً جداً، إذا كنت تستعمل أدوية قد تؤثر

على نظم القلب، إذا وُجد لديك الآن أو كان لديك في الماضي

نمط معين شاذ في نظم قلبك (يُعرف باستطالة المقطع QTC

في مخطط كهربية القلب) والذي قد يحدث في أشكال معينة من

أمراض القلب وإذا كنت تستعمل أدوية أخرى (انظر "التفاعلات

بين الأدوية").

الأولاد والمراهقون:

لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد الذين سنهم دون الـ 12.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى

بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية،

فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة يجب إعلام الطبيب

أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية (من الجدير بالذكر

إن القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية، فاستشر

رجاءً الطبيب أو الصيدلي):

• كيتوكونازول (لعلاج التلوث الفطري)، ريتونافير (مضاد

لفيروس HIV).

• إيرينوميسين أو ريفامبيسين (دواءان من المضادات

الحيوية).

• سيكلوسبورين (دواء كابيت للجهاز المناعي).

• ديلتيازيم (لعلاج الذبحة الصدرية).

استعمال الدواء والطعام:

لا يجوز تناول الدواء مع الطعام أو مع عصير الجريبفروت

أو مع عصائر الفواكه الأخرى، لأن هذا الشيء قد يقلل تأثير

الدواء. من أجل الامتناع عن ذلك، بإمكانك:

• أن تتناول الدواء قبل الطعام أو قبل شرب عصير الفواكه

بساعة.

• أن تتناول الدواء بعد الطعام أو بعد شرب عصير الفواكه

بساعتين.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

الدواء، بالجرعة الموصى بها، لا يزيد من النعاس الناجم عن

شرب الكحول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

يجب استشارة الطبيب إذا كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو

تخططين حملاً أو كنت مرضعاً.

لا تتوفر معلومات عن استعمال بيلاكستين لدى النساء الحوامل

أو المرضع. لا تتوفر معلومات عن تأثير بيلاكستين على

الخصوبة.

السياقة واستعمال الماكينات:

لا يُرجَّح أن يؤثر بيلاكستين على قدرتك على السياقة أو تشغيل

الماكينات، لكن، قد يستجيب كل متعالم للدواء بشكل مختلف.

لذلك، يجب أن تتحسس كيف يؤثر الدواء عليك قبل أن تسوق

السيارة أو تشغل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي كل قرص من بيلاكستين على أقل من 23 ملغ من

الصوديوم ولذلك يمكن اعتباره تقريباً خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب الاستعمال دوماً بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة

الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن

كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المثبتة عادة هي:

يجب تناول قرص واحد في اليوم مع كأس ماء. القرص

مخصص للإعطاء الفموي (عن طريق الفم).

يجب أن تتناول القرص قبل الطعام أو قبل شرب عصائر
الفواكه بساعة أو بعدها بساعتين. انظر أيضاً "استعمال الدواء
والطعام".

سيتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

خط الشطر ليس مخصصاً لتقسيم القرص إلى نصفين يحتويان

على جرعتين متساويتين، إنما يمكن الاستعانة به لتقسيم القرص

من أجل تسهيل البلع. يجب بلع كلا الجزأين مباشرةً بعد الشطر.

لا تتوفر معلومات بخصوص هرس أو مضغ القرص.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى: إذا تناولت جرعة مفرطة

أو إذا قام ولد أو أي شخص ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى

الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك

عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المنتظم، فيجب تناول جرعة

فوق تذكرك وبعد ذلك يجب العودة إلى أوقات تناول الاعتيادية.

لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب. حتى لو طرأ

تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون

استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من

الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا

كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر

الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال بيلاكستين إلى نشوء أعراض

جانبية عند بعض المستعملين. إذا لم تكن الأعراض الجانبية

عابرة أو كانت من عجة أو أخذت بالتفاقم، فيجب استشارة الطبيب.

لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي

واحد منها.

توقف عن استعمال الدواء وتوجه لتلقي المساعدة الطبية

الفورية، إذا حدثت الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

ردود فعل تحسسية. يمكن أن تشمل الأعراض على طفح جلدي،

صعوبات في التنفس، دوار، انهيار أو فقدان الوعي؛ انتفاخ

الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق و/أو انتفاخ الجلد واحمراره.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (تظهر عند 1-10 مستعملين من بين

100):

صداع، ميل إلى النوم.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر عند 1-10 مستعملين من بين

1,000):

نتائج غير سليمة في فحص مخطط كهربية القلب (ECG)؛

تغيرات في فحوص الدم الخاصة بوظائف الكبد أو وظائف

الكلى؛ دوار؛ ألم أو انزعاج في البطن (بما في ذلك في الجزء

العلوي من البطن)؛ تعب، تزايد في الشهية؛ دقات قلبية غير

منتظمة، ارتفاع الوزن، غثيان، قلق، انزعاج أو جفاف في

الأنف، إسهال، التهاب المعدة (جاستريتيس)، فبرتيجو (إحساس

بالدوار أو الدوخة)، ضعف، عطش، صعوبات في التنفس،

جفاف في الفم، صعوبات في الهضم، حكة، جروح البرد (هريس

في الفم)، حمى، طفح في الأذنين (تينيتوس)، صعوبات في

النوم، ارتفاع في ذهنيات الدم.

أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم

تحديد مدى شيوعتها بعد):

خفقان القلب (الشعور بدقات القلب)، تسرع القلب (دقات قلب

سريعة)، تقيؤات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو

إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك

استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج

الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة

للتبليغ عن أعراض جانبية، عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان

مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع

وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ

بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

(exp. date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء

الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• ظروف التخزين: يجب التخزين فيما دون 30°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على المركبات

غير الفعالة التالية:

Cellulose, microcrystalline; Sodium starch

glycolate; Silica, colloidal anhydrous;

Magnesium stearate (vegetable).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

أقراص بيضاء، إهليلجية، محدبة مع خط للشطر. الأقراص

مرزومة في عبوة شرائط (بليستر). في كل عبوة 2، 10

أو 30 قرصاً.

قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

صاحب الامتياز: مختبرات رافا م.ص.، ص.ب. 405، أورشليم

القدس 9100301.

المصنع: فاس فارما S.A، إسبانيا.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة

الصحة: 1590634829

تم تحرير النشرة في أيار/مايو 2025.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة

بصيغة الملذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا

الجنسين.