

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

דולפאק 10 וטרינרי - טבליות לבליעה לכלבים
דולפאק 25 וטרינרי - טבליות לבליעה לכלבים

2. חומרים פעילים וכמותם או ריכוזם ביחידת מינון

דולפאק 10 וטרינרי:

אוקסנטל (כ-אמבונט) 200.28 מ"ג
200.28 mg of oxantel (as embonate)

פירנטל (כ-אמבונט) 49.94 מ"ג
49.94 mg of pyrantel (as embonate)

פראזיקוונטל 50.00 מ"ג
50.00 mg of praziquantel

דולפאק 25 וטרינרי:

אוקסנטל (כ-אמבונט) 500.70 מ"ג
500.70 mg of oxantel (as embonate)

פירנטל (כ-אמבונט) 124.85 מ"ג
124.85 mg of pyrantel (as embonate)

פראזיקוונטל 125.00 מ"ג
125.00 mg of praziquantel

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – כמפורט בסעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה

לטיפול בטפילים בכלבים בשלבים הבוגרים של מיני תולעים עגולות ושטוחות.

Nematodes and cestode:

Nematodes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*.

Cestodes: *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp.

קבוצה תרפויטית: תרופות נגד תולעים

4. התוויות נגד

- אין להשתמש בתכשיר במקרים של רגישות יתר לחומרים הפעילים או לאחד מהמרכיבים הנוספים.
- ראה סעיף "תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות".

5. תופעות לוואי

כלבים:

שכיחות (1 עד 10 בעלי חיים/100 בעלי חיים מטופלים):
אנורקסיה ¹
נדירות (1 עד 10 בעלי חיים/10,000 בעלי חיים מטופלים):
הקאות, שלשולים

¹ תופעת לוואי שכיחה של תרופות המכילות פראזיקוונטל (praziquantel)

אם אתה מבחין בתופעת לוואי, גם אם אינה מוזכרת בעלון זה או שאתה חושב שהתרופה אינה פועלת, יש להודיע על כך לוטרינר בהקדם האפשרי.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה כלבים

7. אופן המתן ומינון טבלת מינון:

מספר טבליות	משקל הכלב	דולפאק 10
1/2	3.1-5 ק"ג	המנה המומלצת היא 20 מ"ג אוקסנטל/5 מ"ג פירנטל/5 מ"ג פרזיקוונטל לק"ג משקל גוף, כלומר, טבליה אחת ל 10 ק"ג משקל גוף. למתן דרך הפה.
1	5.1-10 ק"ג	המנה המומלצת היא 20 מ"ג אוקסנטל/5 מ"ג פירנטל/5 מ"ג פרזיקוונטל לק"ג משקל גוף, כלומר, טבליה אחת ל 25 ק"ג משקל גוף. למתן דרך הפה.
2	10.1-20 ק"ג	
3	20.1-30 ק"ג	
מספר טבליות	משקל הכלב	דולפאק 25
1/2	10.1-12.5 ק"ג	המנה המומלצת היא 20 מ"ג אוקסנטל/5 מ"ג פירנטל/5 מ"ג פרזיקוונטל לק"ג משקל גוף, כלומר, טבליה אחת ל 25 ק"ג משקל גוף. למתן דרך הפה.
1	12.6-25 ק"ג	
2	25.1-50 ק"ג	
3	50.1-75 ק"ג	

8. אופן השימוש בתכשיר

יש לתת את מספר הטבליות הדרוש דרך הפה, בהתאם למשקל הכלב, בפעם אחת. רצוי כי הכלב לא יאכל לפני הטיפול. ניתן להאכיל את הכלב שעה או יותר לאחר הטיפול. ניתן לחצות את הטבליות לחצאים. בכלבים הגרים יחד יש לטפל בו זמנית.

9. זמן המתנה לא רלוונטי

10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה זיהומים הנגרמים על ידי תולעים מסוג hookworm ו-roundworm:

בחלק מהכלבים המטופלים, ייתכן כי הטיפול לא יעלים לגמרי את ה-*Ancylostoma canium* וה-*Toxocara canis*, וכתוצאה יש סיכון מתמשך כי הכלבים יפצו את ביצי הטפילים לסביבה. מומלץ לבצע בדיקות מעקב של הצואה, ובהתאם לתוצאות בדיקות אלו ניתן לבצע טיפול בתכשיר ווטרינרי קוטל נמטודות, אם יש בכך צורך.

השימוש בתכשיר זה אינו מומלץ בגורים צעירים משני חודשים או השוקלים פחות מק"ג אחד.

בכלבים תשושים או הנגועים מאוד בטפילים, על הווטרינר לשקול את יחס הסיכון-תועלת של השימוש בתכשיר ולהחליט לפיו על הטיפול.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

חלק ממרכיבי תכשיר ווטרינרי זה עלולים לגרום תגובה אלרגית או גירוי בעור. יש להימנע ממגע התכשיר עם העור.

אנשים עם רגישות יתר ידועה לחומרים הפעילים או לכל אחד ממרכיבי התכשיר צריכים להימנע ממגע עם התכשיר הווטרינרי.

יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

במקרה של בליעת התכשיר בטעות, יש לפנות מיד לייעוץ רפואי ולהציג לרופא את העלון לצרכן או את

התווית.

אזהרות נוספות

עמידות של טפילים לקבוצה מסוימת של תרופות נגד תולעים עשויה להתפתח בעקבות שימוש תכוף וחוזר בתרופה נגד תולעים מאותה קבוצה.
פרעושים משמשים כמאכסני ביניים של אחת מתולעי הסרט הנפוצות: *Dipylidium caninum*.
הופעות חוזרות של תולעי סרט בכלב אפשריות אם לא מטפלים בבעיית הפרעושים.

היריון והנקה של בעל החיים המטופל

הבטיחות של התכשיר הווטרינרי לא הוכחה במהלך ההיריון וההנקה.
השימוש אינו מומלץ במהלך ההיריון וההנקה.

תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

אין להשתמש בתכשיר זה במקביל לשימוש ב- לבמיזול (levamisole), פיפרזין (piperazine) או במעכבי כולין אסטראז.

מינון יתר

מתן התכשיר הווטרינרי לכלבים בריאים במינון הגבוה פי 5 מהמינון המומלץ במשך שישה שבועות רצופים לא גרם לתופעות לוואי.

חוסר תאימות (incompatibility)

לא רלוונטי

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/המגשית.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Dextrates, crosopvidone, sodium stearyl fumarate, povidone K30, lauryl sodium sulphate, bacon flavour.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות מוארכות בצבע צהבהב עד צהוב, ועליהן קו חציה.

הטבליות ארוזה במגשיות (בליסטרים).

בכל אריזת דולפאק 10 וטרינרי: 3, 6, 18, 30 או 60 טבליות.

בכל אריזת דולפאק 25 וטרינרי: 3, 18, 30 או 60 טבליות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

בעל רישום: אליעזר לינביץ, רח' אדום 6, ת.ד. 7006, אזור תעשייה כנות

יצרן: Vetoquinol S.A., Magny-Vernois 70200 Lure, France

נערך בינואר 2026

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

דולפאק 10 וטרינרי: 142 76 92430 00

דולפאק 25 וטרינרי: 142 77 92433 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, הוא מיועד לבני שני המינים.