1986 – 1987 לשנת הדגם

NIIL™

מדריך למשתמש

Ethinyl estradiol 600 mcg **2 טבליות בכל מארז**

Norelgestromin 6 mg **6 טבליות בכל מארז**

תרופות למניעת הריון

אין להשתמש אם האריזה ניזוקה או נפתחה.

יש לקרוא את כל העלון בעיון לפני תחילת השימוש בתרופה זו.
- שמור עלון זה במקום שתוכל לגשת אליו בקלות. ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
- אם יש לך שאלות נוספות, פנה לרופא או לרוקח.
- תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה לגרום להם נזק, גם אם הסימפטומים שלהם זהים לשלך.
- אם אתה חווה תופעות לוואי כלשהן, פנה לרופא או לרוקח. זה כולל תופעות לוואי אפשריות שאינן מפורטות בעלון זה. ראה סעיף 4.

מה כלול בעלון זה:

1. [מידע בסיסי על תרופה זו](#)
2. [לפני השימוש בתרופה זו](#)
3. [כיצד להשתמש בתרופה זו](#)
4. [תופעות לוואי אפשריות](#)
5. [כיצד לאחסן תרופה זו](#)
6. [מידע נוסף](#)

1. מידע בסיסי על תרופה זו

למה מיועדת תרופה זו?

תרופה זו מכילה שתי הורמונים נקביים סינתטיים: אתינילאסטרדיול ונורלגסטרומין. היא משמשת למניעת הריון.

כיצד פועלת תרופה זו?

כאשר נשים נוטלות תרופות למניעת הריון המכילות שני הורמונים נקביים, הן נקראות תרופות למניעת הריון משולבות.

תרופה זו פועלת בשלושה אופנים:
- היא מונעת את השחרור של ביצית בשחלות.
- היא משנה את הרירית של צוואר הרחם, כך שהזרע לא יוכל לעבור דרכה.
- היא משנה את הרירית של הרחם, כך שביצית מופרית לא תוכל להשתרש.

מתי לא תוכל להשתמש בתרופה זו?

אל תשתמש בתרופה זו אם אחד מהמצבים הבאים נכון לגביך. אם אינך בטוח, פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש בתרופה זו.
- יש לך (או היה לך בעבר) קרישי דם בוורידים (כגון פקקת ורידים עמוקה (DVT) או פקקת ריאתית (PE)).
- יש לך (או היה לך בעבר) שבץ מוחי (Stroke) או התקף לב (Heart attack).
- יש לך (או היה לך בעבר) מחלה הגורמת לחסימה של כלי דם בלב או במוח (כגון אי ספיקת לב גודשת, התקף לב קטן (TIA) או כאבי חזה).
- יש לך (או היה לך בעבר) סוג מסוים של מחלת כלי דם בכבד.
- יש לך (או היה לך בעבר) סוג מסוים של מחלת כלי דם בכליות.
- יש לך (או היה לך בעבר) סוג מסוים של מחלת כלי דם בעין.
- יש לך (או היה לך בעבר) סוג מסוים של מחלת כלי דם בלבלב.
- יש לך (או היה לך בעבר) סוג מסוים של מחלת כלי דם בקיבה או במעיים.