



للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم: هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**תאריך תפוגה**) المذون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- ظروف التخزين:** يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبين الفعّالين، يحتوي الدواء أيضًا على: sodium, croscarmellose, Povidone, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), macrogol 400, quinoline yellow aluminum lake (E110), brilliant blue FCF aluminum lake (E133), silica colloidal anhydrous, sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

بين 100):

- صعوبات في النوم، عصبية، دوار
- جفاف في الفم أو غثيان

أعراض جانبية شديدة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
053-6426488-00
من أجل التبسيط ولتسهيل التראה، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المصنِّع وصاحب التسجيل: دكسل م. ص.

شارع دكسل 1، أور عاكفا 3060000، إسرائيل

العديدة (أعراض محتملة لـ Acute Generalised Exanthematous Pustulosis – AGEP) والتي تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا الدواء.

نظم قلبي غير منظم.

- وهلوسات (سماع أصوات ورؤية مشاهد غير موجودة، أفكار ومشاعر غير منطقية)
- الم فجائي وخظيري في البطن أو نزيف دموي شرجي (في فتحة الشرج) في أعقاب التهاب في الأمعاء الغليظة نتيجة لتزويد دموي غير كافٍ (Ischaemic colitis).
- فقدان فجائي للبصر.

قد تكون الأعراض الجانبية عبارة عن: غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الألم في البطن، انتفاخ، تعرق متزايد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا تعكس هذه الأعراض شدة الضرر الكبد.

إذا نسبت تناول الدواء، فتناول الجرعة القائمة بحسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في العَصَة، راجع الملصق وتأكد من كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية
مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال دكسامول ستينوس للعلاج في النهار إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقى قدرًا عا فائدة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية شدى شويعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

أعراض جانبية شديدة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

أعراض جانبية شديدة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

أعراض جانبية شديدة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

أعراض جانبية شديدة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

أعراض جانبية شديدة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الأعدال الدماغية الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- فَقْدان شعور بعدم الهدوء، تَهَيُّجِيَّة، توتر أو شعور بالسعادة المفرطة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية) نعاس

معلومات بخصوص مصنع أو هرس الحبوسلة.

إذا تناولت خطأ جرعة دوامية أعلى
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

حتى لو كان شعورك جيدًا، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب **خطر تطور ضرر شديد للكبد.**

قد تكون الأعراض الجانبية عبارة عن: غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الألم في البطن، انتفاخ، تعرق متزايد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا تعكس هذه الأعراض شدة الضرر الكبد.

إذا نسبت تناول الدواء، فتناول الجرعة القائمة بحسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في العَصَة، راجع الملصق وتأكد من كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال دكسامول ستينوس للعلاج في النهار إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقى قدرًا عا فائدة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية خطيرة
يجب التوقف فورًا عن استعمال الدواء والتوجه لتلقي العلاج الطبي المستعجل:

- صعاب فجائي شديد
- غثيان
- تقيؤات
- ارتباك
- اختلاجات
- تغيرات في الرؤية

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه فورًا إلى الطبيب عند ظهور:

- ردود فعل تحسسية حادة، تشتمل على الطمح الجلدي مثل لمستحضرات من هذا النوع
- الشرى (قد يكون مصحوبًا بحويصلات ويتقشر الجلد) والحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان، الحلق، مما قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو التلعق، انتفاخ الأطراف
- قد يؤدي پاراسيتامول في حالات نادرة إلى ظهور أعراض جلدية حادة قد تكون علاماتها: احمرار، الطمح الجلدي، الحويصلات، التضور الجلدي الواسع النطاق. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضًا إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول دون حدوث مشاكل. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري.

انخفاض في جريان الدم إلى القلب مما قد يسبب النذبة الصدرية (انزعاج أو ألم في الصدر، الرقبة، الظهر، الفك، الكتفين، الذراعين) أو النوبة القلبية.
سكتة دماغية (ضعف في الوجه، الذراعين أو الرجلين أو مشاكل في التكلّم).

ظهور فجائي للحمّى، احمرار الجلد، أو البثور الصغيرة

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعًا، تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تطغنين حملاً، فعليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

الإرضاع:

تنتقل كميات صغيرة من پاراسيتامول وميسودو إيفيردين إلى حليب الأم. يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

الاستعمال لدى الأولاد

هذا الدواء مخصص للبالغين وللأولاد الذين يبلغون أكثر من 6 أعوام من العمر، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

معلومات إضافية

تكون في المادة الفعالة ميسودو إيفيردين إمكانية معاقرتها. الجرعة الدوائية المتزايدة قد تكون سامة. قد يؤدي الاستعمال المطول إلى تناول جرعة أعلى من الموصى بها من أجل بلوغ التأثير المرغوب، وبالتالي يؤدي إلى تزايد خطر التعرض لفرط الجرعة الدوائية.

يُمنع تجاوز الجرعة الدوائية ومدة العلاج الموصى بهما (انظر البند 3).

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
sunset yellow FCF aluminum lake (E110)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.
neuron blockers، نيريسوكين، برينيلوم وبيناتدين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا – انظر البند 2)، "لا يجوز استعمالهم إذا".

أدوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك مثبطات MAO – RIMAS – انظر في البند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا" أو إذا استعملتها في الأسبوعين التاليين.

مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
مكولومبيد – دواء مضاد للاكتئاب.

جليكوزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب أو قصور القلب، مثل ديوكسين).

فلويدات الأيرجوت (ergot alkaloids) – لعلاج الجربجينا مثل إريجوتامين أو ميتيسيرجيد.
أوكسيتوسين (دواء يعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم).
كوليسيترامين (خفض مستوى الدهون في الدم).
ميتوكلوپراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، والتقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم).

أدوية مضادة لتخثر الدم، مثل وارفارين.
حذوب منع الحمل.
أدوية مضادة للتشنجات (لعلاج الصرع) مثل فينيبتونين، كاربامازيبين.

مستحضرات تحفز عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: ريفامبين، باريتوترا).
مستحضرات مضادات التهاب الأسترويدية.
كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
بروبيوتبيد (لعلاج القربص).

فلوكوكساسولين (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (الحمض الاستقلابي) مما يسبوج العلاج المستعجل (انظر في البند 2).

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول الدواء دون ارتباط بالطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

خلال فترة العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك الكحول بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

البرقان

خلال فترة استعمال الدواء، أخبر طبيبك فورًا إذا:

- كنت تعاني من مرض صعب يشمل الاختلال الكروي الخظير أو الإنتان (حالة تتجول فيها الجراثيم وسوموها في التيار الدموي وتؤدي إلى ضرر في الأعضاء) سوء التغذية، الكحولية المزمنة، أو إذا كنت تستعمل أيضًا فلوكوكساسولين (مضاد حيوي). تم الإبلاغ عن حالة خطيرة تسمى الحماض الاستقلابي (اختلال في الدم وفي سوائل الجسم) لدى المرضى في هذه الحالات عندما استعملوا پاراسيتامول بالجرعة المتبّعة لفترة مطولة أو عندما استعملوا پاراسيتامول بالدمج مع فلوكوكساسولين. قد تشتمل أعراض الحماض الاستقلابي على: صعوبات تنفسية شديدة مع تنفس عميق وسريع، نعاس، غثيان وتقيؤات.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصةً يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواء من الفصائل التالية:

- أدوية مضادة للكوليين (لعلاج التشنجات والتقلصات، مثل الأروبيين).
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جرانيتيدين، ميتيل دوبا، حاصرات الخلايا العصبية الأدرينية (adrenergic neuron blockers)، نيريسوكين، برينيلوم وبيناتدين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا – انظر البند 2)، "لا يجوز استعمالهم إذا".
- أدوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك مثبطات MAO – RIMAS – انظر في البند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا" أو إذا استعملتها في الأسبوعين التاليين.
- مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
مكولومبيد – دواء مضاد للاكتئاب.
- جليكوزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب أو قصور القلب، مثل ديوكسين).
- فلويدات الأيرجوت (ergot alkaloids) – لعلاج الجربجينا مثل إريجوتامين أو ميتيسيرجيد.
- أوكسيتوسين (دواء يعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم).
- كوليسيترامين (خفض مستوى الدهون في الدم).
- ميتوكلوپراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، والتقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم).
- أدوية مضادة لتخثر الدم، مثل وارفارين.
- حذوب منع الحمل.
- أدوية مضادة للتشنجات (لعلاج الصرع) مثل فينيبتونين، كاربامازيبين.
- مستحضرات تحفز عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: ريفامبين، باريتوترا).
- مستحضرات مضادات التهاب الأسترويدية.
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- بروبيوتبيد (لعلاج القربص).

فلوكوكساسولين (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (الحمض الاستقلابي) مما يسبوج العلاج المستعجل (انظر في البند 2).

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول الدواء دون ارتباط بالطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

خلال فترة العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك الكحول بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

- كنت تتلقى في نفس الوقت علاجًا بأدوية إضافية للزكام والسعال أو بمستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول.
- كنت تستعمل الأدوية من فصيلة الحاصرات بيتا (تُستعمل لعلاج مشاكل القلب، ضغط الدم المرتفع).
- كنت تتلقى في نفس الوقت علاجًا بأدوية من فصيلة مشتبات الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOis) (لعلاج الاكتئاب) أو بأدوية من مشتبات الأوكسيداز أحادي الأمين الكوسية (RIMAS) أو خلال 14 يومًا منذ إيقاف العلاج بها.
- كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابئة للشهية أو أدوية لعلاج مشاكل النوم.
- كنت تستعمل أدوية (أدوية من المحاكيات الودية).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) في أعقاب استعمال أدوية تحتوي على ميسودو إيفيردين. PRES وRCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بتزايد دموي متدّن للدماغ يجب التوقف فورًا عن استعمال دكسامول ستينوس للعلاج في النهار والتوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي إذا نشأت لديك أعراض قد تكون علامتا لـ PRES أو RCVS (انظر الأعراض في البند 4 "الأعراض الجانبية").

إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تسبب أعراضًا جلدية خطيرة مرة أخرى.

يحتوي المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضررًا لكبد عندما:

- يُعطى بجرعة دوامية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة مطوّلة.
- يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
- يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان مقاربة دون استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الألم أو أدوية للزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم من پاراسيتامول.

لا يجوز استعمال أدوية إضافية من فصيلة الكحولية للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كانت لديك سيرة مرضية من السكتة الدماغية.

كنت تعاني من السكري.

كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).

كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما/زرق).

وجد لديك مرض كلوي خطير حد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.

كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد)
كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما/زرق).

وجد لديك مرض كلوي خطير حد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.

مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (يؤدي إلى التبول بوتيرة عالية)

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يُسوّق هذا الدواء بدون وصفة طبية

دكسامول ستينوس

العلاج في النهار، حبسولات

تحتوي كل حبسولة على:

پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ،

ميسودو إيفيردين هيدروكلوريد

(Pseudoephedrine hydrochloride) 25 ملغ.

المواد غير الفعالة ومسيبات الأرجية في الدواء – انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة يامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.
يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقًا للتعليمات المذكورة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام.
هذا الدواء مخصص للبالغين وللأولاد الذين يزيد عمرهم عن 6 أعوام.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من أعراض الزكام واحتقان الأنف المصحوبين بالحمى والألام – للعلاج في النهار.

الفصيلة العلاجية:
پاراسيتامول – مسكن للألام وخافض للحرارة.
ميسودو إيفيردين هيدروكلوريد – مخفف لاحتقان الأنف.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (لديك أوجبة) للمادتين الفعّالتين (پاراسيتامول، ميسودو إيفيردين هيدروكلوريد) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع جدًا (فرط ضغط الدم الخطير) أو من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كانت لديك سيرة مرضية من السكتة الدماغية.
- كنت تعاني من السكري.
- كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
- كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما/زرق).

وجد لديك مرض كلوي خطير حد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.