

## فيرابريس SR 240، كبسولات بإطلاق متأخر

تحتوي كل كبسولة على 240 ملغ من هيدروكلوريد فيراباميل (Verapamil hydrochloride).

المواد غير الفعالة والمواد المسببة للحساسية في الدواء – انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء".  
اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.  
هذا الدواء موصوف لك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم هذا الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### 1. ما هو الغرض من الدواء؟

لعلاج ارتفاع ضغط الدم الطفيف حتى المتوسط. لعلاج والوقاية من الذبحة الصدرية.

المجموعة العلاجية: حاصر قنوات الكالسيوم.

تعمل حاصرات قنوات الكالسيوم على تغيير كمية الكالسيوم التي تدخل خلايا العضلات في القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير قوة وسرعة ضربات القلب. كما أنه يعمل على توسيع الأوعية الدموية حتى يتمكن الدم من التدفق عبر الجسم بسهولة أكبر. يساعد ذلك على وصول الأكسجين بكمية أكبر إلى عضلة القلب ويمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

### 2. قبل استخدام الدواء

لا تستخدم الدواء في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المادة الفعالة (فيراباميل هيدروكلوريد) أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (انظر القسم 6).
- إذا كنت تعاني من صدمة قلبية (انخفاض خطير في تدفق الدم)
- إذا كنت قد عانيت من نوبة قلبية مصحوبة بمضاعفات مثل بطء شديد في ضربات القلب، انخفاض ملحوظ في ضغط الدم، أو فشل في البطين الأيسر
- إذا لم يكن لديك جهاز تنظيم ضربات القلب فعال وكنت تعاني من انسداد نظام التوصيل الكهربائي للقلب من الدرجة الثانية أو الثالثة أو متلازمة العقدة الجيبية المريضة (sick sinus syndrome)
- إذا كنت تعاني من انسداد الجيب الأذيني (sino-atrial block)
- إذا كنت تعاني من قصور في القلب
- إذا كنت تعاني من بطء معدل ضربات القلب (أقل من 50 نبضة في الدقيقة)
- إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم [القيمة العالية (الانقباضي) أقل من 90 ملم زئبق]
- إذا كنت تعاني من رجفان أذيني أو رجفان مصحوب بمسار توصيل إضافي (على سبيل المثال، متلازمة وولف باركنسون وايت)
- إذا كنت تتناول إيفابرادين (لمشاكل القلب)

### تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل العلاج بفيرابريس SR 240، أخبر طبيبك إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى.
- كان لديك ضغط دم منخفض جداً.
- إذا كنت تتناول أدوية لخفض الدهون في الدم (مثل سيمفاستاتين، أو أتورفاستاتين، أو لوفاستاتين).
- إذا كنت تعاني من مرض يسبب ضعف التوصيل العصبي إلى العضلات، مثل الوهن العضلي الوبيل، أو متلازمة لاميرت إيتون، أو ضمور دوشين العضلي التقدمي.

أخبر الجراح أو طبيب الأسنان أنك تتناول فيرابريس SR 240 إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، حيث قد يؤثر ذلك على المخدر المستخدم.

### التفاعلات الدوائية

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية والمكملات الغذائية. خاصة إذا كنت تتناول:

- حاصرات بيتا مثل أتينولول وبروبرانولول وميتوبرولول (لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب)
- حاصرات ألفا مثل برازوسين وتيرازوسين (لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب)
- مدرات البول
- الأدوية المعروفة باسم الستاتينات مثل أتورفاستاتين، لوفاستاتين، سيمفاستاتين (لخفض مستويات الكوليسترول)
- الكينيدين، الفلبيكاينيد، ديسوبيراميد، الديجوكسين، والديجيتوكسين (لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب [اضطراب النظم])
- دابيجاتران (لمنع تخثر الدم) ومضادات التخثر الأخرى من مجموعة مضادات التخثر الفموية المباشرة (DOACs)
- إيفابرادين (لعلاج بعض أمراض القلب)
- أدوية لعلاج الاكتئاب أو القلق أو الذهان، بما في ذلك المستحضر العشبي نبتة سانت جون أو إيمبيرامين أو بوسبيرون أو الليثيوم
- الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي مثل السيكلوسبورين، والسيروليموس، والإيفيروليموس، والتاكروليموس (لمنع رفض عملية الزرع)

- جليبنكلاميد، لعلاج أنواع معينة من مرض السكري
- الأسبرين (دواء مضاد للالتهابات غير ستيرويدي [NSAID] لتسكين الألم وخفض الحرارة)
- الموتريباتان (لعلاج الصداع النصفي)
- ميدازولام (مهدئ أو مخدر)
- ثيوفيلين (لعلاج الربو)
- دوكسوروبيسين (لعلاج السرطان)
- سيميدين (لعلاج عسر الهضم أو قرحة المعدة)
- ريفامبيسين (لعلاج السل وأنواع أخرى من العدوى)
- كاربامازيبين، فينيتوين، أو فينوباربيتال (فينوباربيتون)، مضادات الاختلاج
- ريتونافير (لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية [HIV])
- إريثروميسين، كلاريثروميسين، تيليثروميسين (لعلاج أنواع معينة من العدوى)
- الكولشيسين أو السلفينبيرازون (لعلاج النقرس)
- الميتفورمين. قد يقلل الفيرباميل من تأثير الميتفورمين في خفض مستوى الجلوكوز في الدم
- أدوية لخفض ضغط الدم (لعلاج ارتفاع ضغط الدم)
- موسعات الأوعية الدموية

#### استخدام الدواء والغذاء

ينبغي تناول فيرابريس SR 240 مع وجبة الطعام. ينبغي عدم شرب عصير الجريب فروت أثناء استخدام الدواء لأنه قد يؤثر على امتصاصه. لا يحدث هذا الوضع مع عصائر الفاكهة الأخرى مثل عصير البرتقال أو التفاح أو الطماطم.

#### استخدام الدواء واستهلاك الكحول

يزيد دواء فيرابريس SR 240 من الوقت الذي يحتاجه جسمك لتحليل الكحول. وهذا يعني أن كمية أقل من الكحول ترفع مستوى الكحول في الدم فوق الحد المسموح به للقيادة. كما سيستغرق الأمر وقتاً أطول للتعافي من آثار الكحول.

#### الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً، أو تعتقدين أنك حامل، أو تخططين للحمل، أو تقومين بالرضاعة الطبيعية، يرجى استشارة الطبيب.

#### القيادة واستخدام الآلات

يمنع القيادة أو تشغيل الآلات أو المشاركة في أي نشاط يتطلب اليقظة حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك. قد يسبب دواء فيرابريس SR 240 الدوخة لدى بعض الأشخاص، وخاصة في بداية العلاج.

#### معلومات هامة عن بعض مكونات الدواء

يحتوي هذا الدواء على ما يقارب 35 ملجم من الصوديوم (المكون الرئيسي لمالح الطهي/ الطعام) في كل كبسولة. وهذا يعادل 1.75% من الحد الأقصى الموصى به من الصوديوم يوميًا للبالغين.

#### 3. كيف تستخدم الدواء؟

ينبغي استعمال الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب. يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من الجرعة أو طريقة استخدام الدواء. الجرعة وطريقة العلاج يحددها الطبيب فقط. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

#### الأطفال

دواء فيرابريس SR 240 غير مخصص للأطفال.

#### طريقة تناول الدواء

ينبغي تناول الدواء مع كوب من الماء، مع وجبة الطعام. يمكن تقسيم الكبسولة إلى نصفين. في حال تقسيم الكبسولة إلى نصفين، يجب التخلص من نصف الكبسولة غير المخصص للاستخدام الفوري. يُمنع مضغ أو سحق الكبسولة لأنه دواء ذو إطلاق متأخر.

#### إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ

إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق الخطأ، فينبغي التوجه إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى على الفور وإحضار عبوة الدواء معك.

#### إذا نسيت تناول الدواء

في حال نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المحدد، فتناول الجرعة فور تذكرك، إلا إذا كان وقت الجرعة التالية قد اقترب. في هذه الحالة، تجاهل الجرعة الفائتة. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة.

ينبغي الاستمرار في العلاج حسب ما أوصى الطبيب.

حتى وإن طرأ تحسن على حالتك الصحية، ينبغي عدم التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء  
إذا توقفت عن تناول الدواء، فقد تزداد حالتك سوءًا.

لا تتناول الدواء في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ارتد النظارات إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام الدواء، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الآثار الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، فإن استخدام فيرابريس SR 240 قد يسبب آثارًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر عند قراءة قائمة الآثار الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

يجب مراجعة الطبيب فورًا عند ظهور الآثار الجانبية التالية:

- اصفرار الجلد أو العينين، الحمى أو الحساسية حول منطقة البطن. هذه علامات تدل على ضعف وظائف الكبد.
- خفقان القلب (الإحساس بضربات القلب)، ألم في الصدر يظهر للمرة الأولى أو ألم في الصدر يظهر بشكل متكرر أكثر، تورم في الكاحلين، الشعور بالحرارة والألم في اليدين أو القدمين.
- تورم في الأطراف.
- الصفير، صعوبة التنفس، تورم الفم أو الشفتين أو اللسان، أو طفح جلدي شديد يظهر بشكل غير متوقع.

التأثير الجانبية الأكثر شيوعًا هو الإمساك.

تشمل الآثار الجانبية الإضافية: عدم انتظام ضربات القلب، احمرار الوجه أو الرقبة، الصداع، الغثيان أو القيء، ألمًا أو انزعاجًا في البطن، الدوخة، الدوار، طنين الأذن، التعب، الرعشة، اضطرابات الحركة، ضعف العضلات، آلام المفاصل و/أو العضلات، طفح جلدي أو حكة، الإحساس بوخز في الجلد، خدر، تساقط الشعر. قد يحدث عجز جنسي في حالات نادرة.

قد تحدث آثار جانبية إضافية عند تناول فيرابريس SR 240 لفترة طويلة. أخبر طبيبك عند ظهور تورم في اللثة يبدأ بالانتشار على الأسنان، أو تورم في الثديين (لدى الرجال)، أو إنتاج الحليب (لدى الرجال والنساء). هذه الآثار نادرة وتزول عند التوقف عن العلاج.

في حالة حدوث أي تأثير جانبي، أو إذا تفاقم أحد الآثار الجانبية، أو إذا كنت تعاني من أحد الآثار الجانبية غير المذكورة في النشرة، ينبغي عليك استشارة الطبيب.

يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية لوزارة الصحة بالضغط على رابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية الناتجة عن العلاج الدوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يحيلك إلى النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية، أو بالدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وجميع الأدوية الأخرى في مكان مغلق بعيدًا عن متناول ورؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك يمكن تجنب حالات التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- شروط التخزين: لا تخزن الدواء في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. يجب حفظ الكبسولات في عبوتها الأصلية (شريط الأفراس) لأن المستحضر حساس للرطوبة. في حال تقسيم الكبسولة إلى نصفين، يجب التخلص من نصف الكبسولة غير المخصص للاستخدام الفوري.
- يُمنع التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sodium alginate, microcrystalline cellulose, povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, macrogol 400, quinoline yellow aluminum lake (E104), indigo carmine aluminum lake (E132), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هي محتويات العبوة:

الكبسولة ذات لون أخضر فاتح مع خط فاصل على كلا الجانبين.  
أحجام العبوات المعتمدة: 10، 30 كبسولة. قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوات.

تم إعداد النشرة في يوليو 2025 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في السجل الوطني للأدوية بوزارة الصحة:

068-63-26427-00

لأغراض التبسيط وتسهيل القراءة، كُتبت هذه النشرة بصيغة الذكر. ومع ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

الشركة المصنعة ومالك الترخيص: شركة ديكسل المحدودة، 1 شارع ديكسل، أور عكيفا 3060000، إسرائيل