

تيريفلونوميديد تيفغ

أقرص مطليّة

التركيبية

يحتوي كل قرص على:

Teriflunomide 14 mg

تيريفلونوميديد 14 ملغ

الحصول على معلومات عن المركبات غير الفعّالة ومسببات الحساسية النظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

قد وُصف هذا الدواء من أجلك فقط، لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أنّ حالتهم الطبية مشابهة.

بطاقة معلومات وقائية لمن تلقى العلاج

بالإضافة إلى النشرة الطبيّة، فإنّ للمستحضر تيريفلونوميديد تيفغ توجد بطاقة معلومات وقائية لمن تلقى العلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائية هامة يتوجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بتيريفلونوميديد تيفغ وخلاله، ويجب عليك اتّباعها.

يجب معاينة بطاقة المعلومات الوقائية لمن تلقى العلاج وكذلك نشرة المستهلك الطبيّة قبل البدء باستعمال الدواء.

يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعاينة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

تيريفلونوميديد تيفغ مخصّص لعلاج البالغين الذين يعانون من التصلّب المتعدّد الانتكاسيّ المتردّد، بهدف تقليل نسبة النوبات وإبطاء تقدّم الإعاقة.

الفصلية العلاجية:

الأدوية المثبطة للجهاز المناعي (Immunosuppressant)، مثبطات الإنزيم ديهيدوروروتيت ديهيدروجينيز (Dihydroorotate dehydrogenase).

تيريفلونوميديد تيفغ يحتوي على المادة الفعّالة، تيريفلونوميديد، وهو مادة تعمل على جهاز المناعة وتحد من مهاجمته للجهاز العصبي.

ما هو التصلّب المتعدّد؟

التصلّب المتعدّد (MS) عبارة عن مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي (CNS). يتكوّن الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي.

في التصلّب المتعدّد، تدمر العملية الالتهابية الغلاف الواقي (المسمى "ميايلين") حول الألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي. يسمّى فقدان الميايلين بـ "زوال الميايلين" وهو يحدث بالعلم السوي للأعصاب.

تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من التصلّب المتعدّد من النوع الانتكاسيّ نوبات متكرّرة من الأعراض البدنية الناتجة عن عدم عمل الأعصاب بصورة صحيحة.

تختلف هذه الأعراض من مريض إلى آخر لكنها ترتبط عادةً بـ:

• صعوبة في المشي.

• مشاكل في الرؤية.

• مشاكل في التوازن.

قد تختفي الأعراض تماماً بعد انتهاء النوبة، لكن مع مرور الوقت، قد تستمرّ مشاكل معيئة في الفترة التي ما بين النوبات، وقد تسبب تعقيدات بدنية بإمكانها أن تعيق نشاطاتك اليومية.

كيف يعمل تيريفلونوميديد تيفغ؟

يساهم تيريفلونوميديد تيفغ في حماية الجهاز العصبي المركزي من هجمات الجهاز المناعي عن طريق تقليد الارتفاع في مستوى أحد أنواع خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية). ويقلص ذلك العملية الالتهابية، التي تسبب ضرراً عصبياً في التصلّب المتعدّد.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (حساس) للمادة الفعّالة، تيريفلونوميديد أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- سبق أن أصبت في الماضي بطفح جلدي شديد أو تقتشر الجلد، حويصلات وأ/و قروح في الفم، بعد تناول تيريفلونوميديد أو لفلونوميديد.
- كانت لديك مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت حاملاً، تعتقدن أنك حامل أو مرضعة.
- كنت تعاني من مشكلة خطيرة تؤثر على جهازك المناعي، مثلاً، نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
- كانت لديك مشكلة خطيرة في نخاع العظم، أو إذا كان لديك انخفاض ملحوظ في مستويات خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو انخفاض في مستوى صفائح الدم.
- كنت تعاني من تلوّث خطير.
- كانت لديك مشاكل خطيرة في الكلية تتطلب الدّيال.
- كان لديك مستويات منخفضة جداً للبروتينات في الدم (نقص بروتين الدم).

إذا لم تكن متأكداً أو إذا توفرت لديك أسئلة بالنسبة لاستعمال هذا الدواء، فكلّم طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ، أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك مشاكل في الكبد؛ أو أنك كنت معادياً على استهلاك كميات كبيرة من الكحول؛ وسجري لك طبيبك فحوصاً للدم قبل العلاج وخلال لفحص وظائف الكبد. إذا أظهرت نتائج الفحص وجود مشكلة في الكبد، فقد يوقف طبيبك العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ. اقرأ رجاة البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كان لديك ضغط دم مرتفع (فرط ضغط الدم)، سواء تمت السيطرة عليه بواسطة الأدوية أم لا.
- قد يؤدي تيريفلونوميديد تيفغ إلى ارتفاع ضغط الدم. سيفحص طبيبك ضغط دمك قبل بدء العلاج وابتداءً خلال فترة العلاج. اقرأ رجاة البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كان لديك تلوّث. قبل أن تستعمل تيريفلونوميديد تيفغ، سيأخذ طبيبك من وجود ما يكفي من خلايا الدم البيضاء والصفائح في دمك. وذلك لأن تيريفلونوميديد تيفغ يقلل عدد كريات الدم البيضاء، فإنّ ذلك قد يؤثر على قدرتك على محاربة التلوّث. بإمكان طبيبك أن يأمر بإجراء فحوص للدم لفحص مستوى خلايا الدم البيضاء، إذا اعتقدت أنّك تعاني من أي تلوّث. قد تحصل حالات عدوى (تلوث) بغيروس الهربس، وبضمنها هربس التجفيف القموي أو الهربس النطاقي (الحزام الناري)، أثناء العلاج بتيريفلونوميديد. في حالات معينة، تحصل مضاعفات جديدة. عليك إبلاغ طبيبك فوراً إذا نشأ لديك شك بأن لديك أي أعراض لحالات عدوى بغيروس الهربس. اقرأ رجاة البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كنت تعاني من ردود فعل جلدية خطيرة.
- كانت لديك أعراض تنفسية.

• كنت تشعر بصعف، نقص الإحساس، وآلم في اليدين والقدمين.

• كنت على وشك تلقي لقاح.

• كنت تتناول ليفلونوميديد مع تيريفلونوميديد تيفغ.

• كنت ستبدأ العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ أو ستوقف عن العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ.

• كنت على وشك الخضوع لفحص دم محدد (مستوى الكالسيوم). قد تشير نتائج الفحص بشكل خاطئ إلى مستويات منخفضة للكالسيوم.

ردود فعل في الجهاز التنفسي:

أخبر طبيبك إذا كان لديك سُعال أو ضيق تنفس لا تفسير لهما. قد يجري طبيبك فحوصاً إضافية.

الأطفال والمرافقون

تيريفلونوميديد تيفغ ليس مخصصاً للأطفال والمرافقين الذين سنهم دون الـ 18 عاماً.

الفحوص والمتابعة

قبل بدء استعمال الدواء سيوجّهك الطبيب إلى إجراء فحوص للدم وفحص للحمل (للنساء).

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خصوصاً إذا كنت تستعمل أحد الأدوية المفصلة أدناه:

- ليفلونوميديد، ميثوتريكسات وأدوية أخرى تؤثر على الجهاز المناعي (المسماة عادةً مثبّطات الجهاز المناعي أو منظمّات الجهاز المناعي).
- ريفامبينسين (دواء يُستعمل لعلاج السلّ والتلوّثات الأخرى).
- كاربامازيبين، فينوباريتال، فينيتوين (علاج الصرع).
- العرن المقدّوس (St. John's wort - نبات طنبّ لعلاج الاكتئاب).
- ريباجلينيد، بيوجليتانزون، نتايجلينيد أو روزبجليتانزون، لعلاج السكري.
- داونوروبيستين، دوكسوروبيستين، باكليتاكسيل أو توبوتيكان، لعلاج السرطان.
- دولوسيتين لعلاج الاكتئاب، عدم السيطرة على التبوّل أو الاعتلال الكلوي لدى مرضى السكري.
- ألوسيترون لعلاج الإسهال الحادّ.
- ثيوفيلين للربو.
- تيزانيدين، لإرخاء العضلات.

• وارفارين، مستحضر مضاد للتخثّر يُستعمل لتسييع الدم (جعله أكثر سيولة) من أجل منع تكوّن خثرات الدم.

• حبوب منع الحمل (التي تحتوي على إيثينيل إستراديول وليفونورجيستريل).

• سيفكالور، بينزويل بينيتسيلين (بينيتسيلين G)، وسيبروفلوكساستين للتلوّثات.

• إيندميثاسين، كيتوبروفين للآلام والالتهاب.

• فوروسيميد لمرض القلب.

• سيميبتيدين لتقليل الحموضة في المعدة.

• زيدوفوردين لتلوّث HIV.

• روزوفاستاتين، سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، براقفاستاتين لفرط الكوليسترول في الدم (الكوليسترول المرتفع).

• سولفاسالازين لداء الأمعاء الالتهابي أو لالتهاب المفاصل.

• كوليستيرامين للكوليسترول المرتفع أو لتخفيف الحكة عند وجود مرض في الكبد.

• الفحم النشط لتقليل امتصاص الأدوية أو المواد الأخرى.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام.

الحمل والإرضاع

الحمل

لا يجوز استعمال تيريفلونوميديد تيفغ إذا كنت حاملاً أو تعتقدن أنك قد تكونين حامل. إذا كنت حاملاً أو حملت خلال فترة استعمال تيريفلونوميديد تيفغ، فإنّ احتمال ولادة طفل مع عاهات خلقية يزداد. لا يجوز استعمال هذا الدواء لدى النساء في سن الخصوبة دون استعمال وسائل موثوق بها لمنع الحمل. توجهي إلى الطبيب إذا كنت تحظّطين للحمل بعد إيقاف العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ، لأنّ عليك التأكّد من أنّ الجسم قد تخلّص من معظم المادة الفعّالة الموجودة في هذا الدواء قبل أن تحاولي أن تحملي. إخراج المادة الفعّالة من الجسم، بشكل طبيعي، قد يستغرق سنتين. يمكن تقصير هذه المدة إلى بضعة أسابيع عن طريق استعمال أدوية معيئة تعجّل عملية إخراج تيريفلونوميديد تيفغ من الجسم. على أيّ حال، يجب التحقق بواسطة فحص الدم من أنّ جسمك قد تخلّص من كمّيّة كافية من المادة الفعّالة ويجب أن يؤكّد طبيبك المعالج أنّ مستوى تيريفلونوميديد تيفغ في الدم منخفض بما فيه الكفاية ليبيح لك الحمل.

للحصول على معلومات إضافية بالنسبة للفحوص المخبرية، توجهي إلى طبيبك. إذا كنت تشكين بأنك حامل خلال فترة استعمال تيريفلونوميديد تيفغ، أو خلال سنتين من لحظة إيقاف العلاج، فتوقفي عن تناول تيريفلونوميديد تيفغ وتوجهي فوراً إلى طبيبك من أجل إجراء فحص للحمل. إذا أكدّ الفحص أنّك حامل، فقد يقترح طبيبك علاجاً بأدوية معيئة بهدف إخراج تيريفلونوميديد من جسمك بسرعة وبشكل كاف، لأنّ ذلك قد يقلّل من الخطر على طفلك.

وسائل منع الحمل

إنّك مجبرة على استعمال وسائل فعّالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ. بعدها، يبقى تيريفلونوميديد في دمك لفترة طويلة بعد أن تتوقفي عن استعمال الدواء.

استمري باستعمال وسائل فعّالة لمنع الحمل بعد إيقاف العلاج.

• قمّي بذلك إلى أن تصبح مستويات تيريفلونوميديد في دمك منخفضة بما فيه الكفاية - سيفحص طبيبك ذلك.

• استسيري الطبيب بخصوص وسيلة منع الحمل الأفضل بالنسبة لك وبخصوص أيّ حاجة محتملة إلى تغيير وسيلة منع الحمل.

الإرضاع

لا يجوز استعمال تيريفلونوميديد تيفغ خلال فترة الإرضاع، لأنّ تيريفلونوميديد ينتقل إلى حليب الأم.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبّب لك تيريفلونوميديد تيفغ شعوراً بالدوار ممّا قد يحدّد قدرتك على التركيز والاستجابة. لذلك، إذا شعرت بدوار، فلا يجوز لك السياقة أو تشغيل الماكينات خلال فترة العلاج.

معلومات هامة عن بعض مركّبات الدواء

يحتوي تيريفلونوميديد تيفغ على السكر المسمّى اللاكتوز. إذا أخبرك طبيبك بأنّ لديك عدم تحمّل لسكريّات معيئة، فاستشر طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك فهو يُعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب أن يتمّ العلاج بتيريفلونوميديد تيفغ تحت إشراف طبيب خبير في مجال علاج التصلّب المتعدّد.

يجب استعمال المستحضر يوماً وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية

يحدد الطبيب فقط الجرعة وطريقة العلاج.

الجرعة الدوائية المتبعة غالباً هي قرص مطليّ واحد (14 ملغ) في اليوم.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال

- تيريفلونويد يتبع عبارة عن دواء مخصص للاستعمال عن طريق الفم، قرص واحد مرة واحدة في اليوم، في كل ساعة من اليوم.
- يمكن تناول القرص مع أو بدون الطعام.
- لا يجوز المضغ؛ يجب ابتلاع القرص بأكمله مع الماء.
- لا يجوز شطر الأقرص عند عدم وجود خط للشطر.
- إذا تناولت خطأ جرعة دوانية أكبر من اللازم
- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عبوة الدواء. قد تشعر بأعراض جانبية شبيهة بما هو موصوف في البند 4 - "الأعراض الجانبية".

إذا نسيت تناول الدواء

- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.
- يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.
- حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

- لا تتوقف عن استعمال تيريفلونويد تبعاً أو تغير الجرعة الدوائية دون استشارة طبيبك أولاً.
- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة؛ راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء.
- ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال تيريفلونويد تبعاً إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

الأعراض الجانبية الخطيرة

قد تكون بعض الأعراض الجانبية، أو قد تصبح، خطيرة. توجه فوراً إلى طبيبك إذا لاحظت نشوء أحد الأعراض الجانبية الخطيرة المذكورة أدناه:

- التهاب البنكرياس قد يشمل أعراض ألم في منطقة البطن، الغثيان أو التقيؤ.
- ردود فعل تحسسية قد تشمل أعراضاً مثل الطفح الجلدي، الشرى، انتفاخ الشفتين، اللسان أو الوجه، أو صعوبة في التنفس.
- ردود فعل خطيرة في الجلد قد تشمل أعراضاً مثل الطفح الجلدي، الحويصلات، ارتفاع الحرارة أو التقرحات في الفم.
- تلوّثات خطيرة أو تعفن الدم - إبتان - (سيبسيس - نوع من التلوّث قد يشكّل خطراً على الحياة)، قد تشمل أعراضاً مثل الحرارة المرتفعة، الارتجافات، القشعريرة، الانخفاض في تدفق البول، أو الارتباك.

• التهاب في الرئتين قد يشمل أعراضاً مثل ضيق التنفس أو السعال المتواصل.

نسبة شيوها غير معروفة (لا يمكن تحديد انتشارها من خلال المعطيات المتوفرة)

• مرض خطير في الكبد قد يشمل أعراضاً مثل اصفرار الجلد أو بياض العينين، بول أعمق من المعتاد، غثيان وتقيؤ غير مفسرين أو ألم في البطن.

أعراض جانبية أخرى قد تحدث وفق التواتر التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- صداع
- إسهال، غثيان
- يظهر ارتفاع في قيم ALT (ارتفاع في مستويات إنزيمات كبدية معينة في الدم) في فحوص الدم
- انخفاض في كثافة الشعر
- أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):
- إظلمت، عدوى في المسالك التنفسية العلوية، عدوى في المسالك البولية، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية، ألم في الحجرة وازعاج عند البلع، التهاب في المائة البولية، التهاب فيروسي في المعدة والأمعاء، عدوى في السن، التهاب الحنجرة، تلوّث فطري في الرجل
- عدوى بفيروس الهربس، وبضمنها هربس التجويف الفموي والهربس النطاقي (الحزام الناري)، مع أعراض مثل البثور، الشعور بالحرق، الحكّة، نقص الشعور أو الألم في الجلد، بالمعادة في جهة واحدة من القسم العلوي من الجسم أو الوجه، وأعراض أخرى، مثل الحمى والضعف.
- القيم المخبرية: شوهد انخفاض في عد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تغيرات في نتائج فحوص وظائف الكبد وعد خلايا الدم البيضاء (انظر البند 2)، وكذلك ارتفاع في إنزيم العضل (كرياتين فوسفوكيناز)
- ردود فعل تحسسية معتدلة
- شعور بالقلق
- شعور بالتمثيل (كوخز الإبرة)، شعور بالضعف، انعدام الإحساس، السمع أو الألم أسفل الظهر أو في الرجل، انعدام الإحساس، اللذع، السمع أو الألم في راحتي اليدين والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)
- الشعور بالخفقان
- ارتفاع ضغط الدم
- غثيان (تقيؤات)، الإم في الأسنان، ألم في الجزء العلوي من البطن

- طفح جلدي، خب الشباب
- ألم في الأوتار، المفاصل، العظام، آلام في العضلات (الأم في العضلات والهيك العظمي)
- الحاجة إلى التبول في أحيان أكثر تقارباً من المعتاد
- دورات طمث تتميّز بنزيف شديد
- ألم
- نقص الطاقة أو الشعور بالضعف
- نقصان الوزن

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- انخفاض في عدد الصفائح (قلة الصفائح)
- شعور متزايد أو حساسية مفرطة خصوصاً في الجلد، الشعور بطعن أو ألم على شكل نبض على طول مسار عصب واحد أو أكثر، مشاكل في أعصاب الذراعين أو الرجلين (اعتلال الأعصاب المحيطي)
- مشاكل في الأظافر، أعراض جلدية خطيرة.
- ألم بعد صدمة (تال للصدمة)
- الصدفة

- التهاب في الفم أو في الشفتين
- مستويات استثنائية من الدهون (الليبيدات) في الدم
- التهاب في الأمعاء (التهاب القولون)
- أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):
- التهاب أو تضمر الكبد

أعراض جانبية انتشارها غير معروف (لا يمكن تحديد نسبة شيوها اعتماداً على المعطيات المتوفرة):

- فرط ضغط الدم الزهوي

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فليكن استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

تجنب التسليم هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك تمنع التسلم. لا تتسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين في مكان جاف، في درجة حرارة أقل من 25°C.

بالنسبة لعبوة القنينة، يمكن استعمال الدواء بعد فتح القنينة لأول مرة حتى انتهاء الصلاحية. لا تُلقي أي دواء في مياه الصرف الصحي أو الفضلات البيئية. اسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد استعمالك. ستساهم هذه الخطوات في الحفاظ على جودة البيئية. انتبه: تحتوي القنينة على ماص للرطوبة. لا يجوز البلع؛ يجب إبقاء الماص داخل القنينة وإغلاق القنينة جيّداً بعد كل استعمال!

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, starch, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, sodium stearyl fumarate, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, talc, polyethylene glycol, colloidal silicone dioxide, FD&C Blue#2 / indigo carmine aluminum lake

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي، أزرق ومستدير، طبع على أحد جانبيه "TV" وطبع على الجانب الآخر "Y12".

تحتوي العبوة على 28 أو 30 قرصاً مطلياً.

قد لا تتسوّق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب الامتياز والمنتج وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ص.

شارع دوفورا هنفيينا 124، تل أبيب 6944020

للاجابة عن الاستفسارات: 03-6864212

تم تحرير النشرة في نيسان 2025.

لا تشتمل هذه النشرة على جميع المعلومات التي تخص المستحضر. إذا كان لديك أي استفسار أو إذا كنت غير متأكد من شيء، ماء فتوجه رجاء إلى الطبيب.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 161.57.35259

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.