

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986 يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ميتفورمين إينوقامد

أقراص

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على:

ميتفورمين هيدروكلوريد 850 ملغ

Metformin hydrochloride 850 mg

المواد غير الفعالة ومسيبات الأرحية في المستحضر – انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تطعه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج السكري من النوع 2، خاصة لدى متلقي العلاج الذين يعانون من الوزن الزائد، عندما يكون تغيير التغذية وممارسة الرياضة لوحدهما غير كافيين لموازنة مستويات الجلوكوز في الدم.

- لدى البالغين، يُستعمل ميتفورمين إينوقامد بحسب دواعي استعماله كعلاج أحادي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

لدى الأولاد من سن الـ 10 والمراهقين، يُستعمل ميتفورمين إينوقامد بحسب دواعي استعماله كعلاج أحادي أو بالدمج مع الإنسولين.

شُهد انخفاض في مضاعفات السكري لدى متلقي العلاج البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 ذوي الوزن الزائد الذين عولجوا بميتفورمين كخط علاجي أول بعد فشل تغيير التغذية.

الفصيلة العلاجية:

أدوية لخفض مستويات الجلوكوز في الدم. تنتمي المادة الفعالة إلى فصيلة البيجوانيدات.

الإنسولين هو هرمون يُنتِجه البنكرياس، يجعل الجسم يستوعب الجلوكوز (السكر) من الدم. يستعمل جسمك الجلوكوز من أجل إنتاج الطاقة أو يُخزّنه لاستعمال مستقبلين.

إذا كنت تعاني من السكري، فإن البنكرياس لديك لا ينتج ما يكفي من الإنسولين أو أن جسمك لا يقدر على استعمال الإنسولين الذي ينتجه كما ينبغي. هذا الشيء يؤدي إلى نشوء مستوى مرتفع للجلوكوز في الدم. يساعد ميتفورمين إينوقامد على خفض مستوى الجلوكوز في الدم إلى وضع سويّ قدر المستطاع.

إذا كنت بالغًا وكنت تعاني من الوزن الزائد، فإن الاستعمال طويل الأمد لميتفورمين إينوقامد يساهم أيضًا في تقليل خطر نشوء مضاعفات مرتبطة بالسكري. هناك علاقة بين ميتفورمين إينوقامد واستقرار وزن الجسم أو الانخفاض المعتدل في الوزن.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (ميتفورمين) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- كنت تعاني من خلل شديد في وظيفة الكلية.
- كنت تعاني من سكري غير متوازن يصحبه، على سبيل المثال، فرط السكر الخطير في الدم (مستويات مرتفعة للجلوكوز في الدم)، غثيان، تقيؤ، إسهال، انخفاض سريع في الوزن، حماض لاكتيكي (انظر أدناه "خطر نشوء الحماض اللاكتيكي") أو حماض كيتوني. الحماض الكيتوني هو وضعٌ تترامك فيه المواد المسماة "أجسام الكيتون" في الدم، مما قد يؤدي إلى حالة ما قبل الغيبوبة السكرية. تشتمل الأعراض على: ألم في البطن، تنفس سريع وعميق، ميل إلى النوم أو راحة فوكة شاذة في النفس.
- فقدّ جسمك كمية أكبر من اللازم من السوائل (جفاف)، نتيجةً لمثلاً لإسهال شديد/المتواصل أو التقيؤات المتتالية. قد يؤدي التجفاف إلى مشاكل في الكليتين، يمكنها أن تسبب خطر نشوء الحماض اللاكتيكي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- كنت تعاني من ثلوث خطير مثل ثلوث يؤثر على الرئتين/الجهاز القصي/الكلية لديك. قد تؤدي التلوثات الخطيرة إلى مشاكل في الكليتين، يمكنها أن تسبب خطر نشوء الحماض اللاكتيكي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- كنت تتناول من قصور القلب الخطير أو أصبت مؤخرًا بنوبة قلبية، كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الدورة الدموية (مثل الصدمة) أو تعاني من صعوبات تنفسية. قد تؤدي هذه الحالات إلى نقص في تزويد الأنسجة بالأكسجين، مما قد يسبب خطر نشوء الحماض اللاكتيكي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول.

إذا انطبق عليك واحد أو أكثر من بين الأوضاع الواردة أعلاه، فاستشر الطبيب قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بميتفورمين إينوقامد، أخبر الطبيب إذا:

كنت على وشك الخضوع لفحص، مثل التصوير بالأشعة السينية (رنجتن) أو المسح، الذي يتطلب حقن مواد تباين تحتوي على اليود في دمك.

- كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

يجب عليك التوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد لفترة معينة قبل الفحص أو الجراحة وبعدهما. سيقرر طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى علاج آخر في هذه الفترة الزمنية. من المهم أن تتفّذ تعليمات الطبيب بحذائرها.

تحذيرات خاصة إضافية

خطر نشوء الحماض اللاكتيكي

قد يسبب ميتفورمين إينوقامد عرضًا جانبيًا نادرًا جدًا لكنه أيضًا خطير جدًا، يسمى الحماض اللاكتيكي، خاصةً إذا لم تكن كليتك توديان ووظيفتها كما ينبغي. يزداد خطر نشوء الحماض اللاكتيكي أيضًا في الأوضاع التالية: عندما يكون السكري غير متوازن، ثلوثات خطيرة، صوم مطول، استهلاك الكحول بشكل مبالغ فيه، تجفاف (انظر التفصيل أدناه)، مشاكل في الكبد وعند وجود أي وضع طبي يقل فيه تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين (مثل مرض قلبي حاد وخطير).

إذا انطبق عليك واحد أو أكثر من بين الأوضاع الواردة أعلاه، فاستشر الطبيب للحصول على إرشادات إضافية. **يجب التوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من وضع يمكن أن يكون مرتبطًا بالتجفاف (فقدان جسيم لسوائل)**، مثل تقيؤات شديدة، إسهال، حمى، التعرض للحرارة أو إذا كان استهلاك السوائل أقل من المعتاد. استشر الطبيب للحصول على إرشادات إضافية.

يجب التوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى فورًا، إذا شعرت ببعض أعراض الحماض اللاكتيكي، لأن هذا الوضع قد يسبب الغيبوبة. تشتمل أعراض الحماض اللاكتيكي على:

- تقيؤات
- آلم في البطن
- تقلصات في العضلات
- شعور عام غير جيد مصحوب بتعب شديد

- صعوبات في التنفس

- انخفاض درجة حرارة الجسم والنبض

الحماض اللاكتيكي عبارة عن حالة طوارئ طبية تستوجب العلاج في المستشفى.

استشر الطبيب بأسرع وقت للحصول على إرشادات إضافية إذا:

- كنت تعاني من مرض وراثي جيني يؤثر على الميتوكوندريا (مكونات إنتاج الطاقة في الخلايا)، مثل متلازمة MELAS (تضرر دماغي [اعتلال دماغي ميتوكوندريالي]، تضرر العضلات [اعتلال عصلي]، حماض لاكتيكي وأحداث شبيهة بالسكتة الدماغية) أو السكري والصمم الموروثن من الأم (MIDD).

نشأ لديك أحد الأعراض التالية بعد البدء بالعلاج بميتفورمين: اختلاجات، انخفاض في القدرات المعرفية، صعوبات في حركات الجسم، أعراض تدل على ضرر عصبي (مثل ألم أو انعدام الإحساس (خدر))، صداع نصفي (ميجرنا) وصمم.

إذا كان عليك الخضوع لعملية جراحية كبيرة، فعليك أن تتوقف عن تناول ميتفورمين إينوقامد أثناء الإجراء ولفترة ما بعده. سيقرر طبيبك متى عليك إيقاف العلاج بميتفورمين إينوقامد ومتى عليك البدء به من جديد.

لا يسبب ميتفورمين إينوقامد كعلاج أحادي نقص السكر في الدم (مستوى جلوكوز أقل من اللازم في الدم). مع ذلك، إذا كنت تستعمل ميتفورمين إينوقامد بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي يمكنها أن تسبب نقص سكر الدم (مثل السولفونيلوريا، الإنسولين، الميجليتينيدات)، فهناك خطر لنشوء نقص سكر الدم. إذا شعرت بأعراض نقص سكر الدم مثل الضعف، الدوار، التعرق المتزايد، النبض السريع، اضطرابات الرؤية أو الصعوبة في التركيز – فإن شرب أو تناول أغذية تحتوي على السكر يساعد عادةً في هذه الحالة.

الحفوض والمتابعة

- سيُجري طبيبك فحوصًا منتظمة للجلوكوز في الدم وسيلانم جرعة ميتفورمين إينوقامد لمستويات الجلوكوز في دمك. يجب الحرص على التحدث مع الطبيب بشكل روتيني. هذه المراقبة مهمة خاصةً في حالة علاج الأولاد والمراهقين أو المسنين.

- خلال فترة العلاج بميتفورمين إينوقامد سيقوم طبيبك بفحص وظائف كليتيك مرة واحدة في السنة على الأقل أو بوتيرة أكبر إذا كنت مسنًا و/أو إذا سامت وظيفة كليتيك.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كان عليك تلقي مادة تباين تحتوي على اليود بالحقن في الدم، مثلًا لغرض التصوير بالأشعة السينية (رنجتن) أو المسح، فعليك التوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد قبل الحقن أو خلاله. سيقرر طبيبك متى عليك إيقاف العلاج بميتفورمين إينوقامد ومتى عليك البدء به من جديد.

إذا كنت تستعمل الأن، إذا استعملت مؤخرًا، أو إذا كان من المحتمل أن تستعمل أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد تحتاج إلى مراقبة بوتائر أكبر لمستويات الجلوكوز في الدم ولوظيفة الكليتين، أو يُحتمل أن يلائم الطبيب لك جرعة ميتفورمين إينوقامد. أخبر الطبيب أو الصيدلي خاصةً إذا كنت تستعمل:

- أدوية تزيد من كمية اليول (مدرات البول).
- أدوية لعلاج الألم والتهاب (NSAIDs) ومثبطات COX-2، مثل إيبuproفين وسيليكوكسيب).
- أدوية معينة لعلاج فرط ضغط الدم (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين [ACE]، حاصرات مستقبل الأنجيوتنسين II).

- ناهضات مستقبل بيتا-2، مثل ساليوتامول أو تيربوتالين (لعلاج الربو).

- كورتيكوستيرويدات (لعلاج حالات مختلفة، مثل علاج التهاب الجلد الخطير أو الربو).

أدوية قد تغير مستوى ميتفورمين إينوقامد في دمك، خاصةً في حالة تدنّي الوظيفة الكلوية (مثل فيراپاميل، ريفامپيسين، سيميثدين، دولوتجرافير، رانولازين، تريميثوبريم، فاندنيتابن، إيفازوكسانول، كيزيوتيبي، أو لاإرابير).

- أدوية أخرى لعلاج السكري.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول ميتفورمين إينوقامد مع وجبة الطعام أو بعدها مباشرةً، من أجل منع نشوء أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

امتنع عن استهلاك المفرط للكحول خلال فترة العلاج بميتفورمين إينوقامد، نظرًا لاحتمال ازدياد الخطر لنشوء الحمض اللاكتيكي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت حاملًا. تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل، لكي يقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير علاجك أو مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم.

لا يوصى باستعمال ميتفورمين إينوقامد إذا كنت مرضعًا أو تخططين للإرضاع.

السياقة واستعمال الماكنت

لا يسبب ميتفورمين إينوقامد بمفرده نقص سكر الدم (مستوى جلوكوز منخفض أكثر من اللازم في الدم)، ولذلك لا ينبغي أن يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة أو استعمال الماكنت.

مع ذلك، يجب توخّي الحذر إذا كنت تستعمل ميتفورمين إينوقامد بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي من شأنها أن تسبب نقص سكر الدم (مثل السولفونيلوريا، الإنسولين، الميجليتينيدات). تشتمل أعراض نقص سكر الدم على ضعف، دوار، تزايد التعرق، نبض سريع، اضطرابات في الرؤية أو صعوبة في التركيز. لا تجوز السياقة أو استعمال الماكنت إذا بدأت تشعر بهذه الأعراض.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

ميتفورمين إينوقامد ليس بديلًا لانتهاج نمط حياة صحي. يجب اتباع إرشادات التغذية التي أوصى بها الطبيب، والحرص على ممارسة النشاط البدني المنتظم.

الجرعة الدوائية المتبعة هي:

الأولاد من سن الـ 10 فما فوق والمراهقون:

الجرعة الدوائية الابتدائية عادةً هي 500 ملغ أو 850 ملغ مرة واحدة في اليوم. الجرعة الدوائية اليومية القصوى هي 2,000 ملغ في اليوم مقسمة إلى 2 أو 3 جرعات. يوصى بعلاج الأولاد الذين يتراوح عمرهم بين 10-12 عامًا فقط إذا أُرشد الطبيب إلى ذلك بشكل صريح لأن الخبرة عن هذه الفئة العمرية محدودة.

البالغون:

الجرعة الدوائية الابتدائية المتبعة عادةً هي 500 ملغ أو 850 ملغ 2-3 مرات في اليوم.

الجرعة الدوائية اليومية القصوى هي 2,550 ملغ في اليوم، مقسمة إلى 3 جرعات.

إذا كنت تعاني من خلل في الوظيفة الكلوية، فقد يصف لك الطبيب جرعة دوائية أقل.

إذا كنت تتلقى العلاج بالإنسولين أيضًا، فسيُرشدك الطبيب إلى كيفية البدء بالعلاج بميتفورمين إينوقامد.

لا يجوز شطر قرص ميتفورمين إينوقامد. عندما تكون هناك حاجة إلى جرعة 500 ملغ، فيجب إيجاد مستحضر يحتوي على 850 ملغ من ميتفورمين قابل للشطر (للحصول على جرعة 425 ملغ)، بحيث يمكن أن يشكل بديلًا لقرص يحتوي على 500 ملغ.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية استعمال ميتفورمين إينوقامد:

يجب تناول ميتفورمين إينوقامد مع وجبة الطعام أو بعدها مباشرةً، من أجل منع نشوء أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

يجب بلع القرص مع كأس ماء.

- إذا كنت تستعمل جرعة واحدة في اليوم، فتناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).
- إذا كنت تستعمل الدواء مرتين في اليوم، فتناوله في الصباح (مع وجبة الفطور) وفي المساء (مع وجبة العشاء).

- إذا كنت تستعمل الدواء 3 مرات في اليوم، فتناوله في الصباح (مع وجبة الفطور)، في الظهيرة (مع وجبة الغداء) وفي المساء (مع وجبة العشاء).

الهرس/النظر/المضغ:

لا يجوز هرس الأقراص أو مضغها.

لا تتوفر معلومات عن الشطر.

إذا نلنتك، بعد مدة من الزمن، أن تأثير ميتفورمين إينوقامد أقوى أو أضعف من اللازم، فاستشر الطبيب.

إذا استعملت بالخطأ جرعة دوائية أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة فقد تعاني من حماض لاكتيكي. أعراض الحماض اللاكتيكي ليست محددة، مثل التقيؤات، الألم في البطن مع التقلصات في العضلات، شعور عام غير جيد مصحوب بتعب شديد وصعوبات في التنفس. تشتمل الأعراض الأخرى انخفاض درجة حرارة الجسم والنبض. إذا نشأت لديك هذه الأعراض، **فيجب التوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي، لأن الحماض اللاكتيكي قد يسبب الغيبوبة. توقف فورًا عن تناول ميتفورمين إينوقامد وتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.**

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي.

يجب المداومة على العلاج مثلما أوصى الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ميتفورمين إينوقامد إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

قد يسبب ميتفورمين إينوقامد عرضًا جانبيًا نادرًا جدًا (عرض يظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000)، لكنه خطير جدًا. يسمى الحماض اللاكتيكي (انظر في البند 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"). إذا حدث هذا العرض **فيجب التوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد والتوجه فورًا إلى الطبيب أو المستشفى،** لأن الحماض اللاكتيكي قد يسبب الغيبوبة.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم في البطن وفقدان الشهية. تحدث هذه الأعراض الجانبية عادةً في بداية العلاج بميتفورمين إينوقامد. بالإمكان التخفيف من هذه الأعراض عن طريق تقسيم الجرعة الدوائية خلال اليوم وكذلك عن طريق تناول ميتفورمين إينوقامد مع وجبة الطعام أو بعدها مباشرةً. إذا استمرت الأعراض، **فتوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد واستشر الطبيب.**

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

- تغيرات في حساسة الذوق.
- انخفاض أو مستويات منخفضة لقيتامين B12 في الدم (قد تشتمل الأعراض على تعب شديد، لسان مؤلم وأحمر [التهاب اللسان – جلوسيتيس]، إحساس بالديابيس والإبر [خدر] أو جلد شاحب أو أصفر). قد يجري طبيبك عدة فحوص من أجل اكتشاف المسبب للأعراض لأن بعضها قد ينجم أيضًا عن السكري أو عن مشاكل صحية أخرى ليست لها صلة.

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

- حماض لاكتيكي. مضاعفة نادرة جدًا لكنها خطيرة جدًا، خاصةً إذا لم تكن كليتك توديان ووظيفتها كما ينبغي.
- أعراض الحمض اللاكتيكي ليست محددة (انظر في البند 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- شدوذ في الفحوص ووظائف الكبد أو بترقان (التهاب الكبد الذي قد يسبب التعب، فقدان الشهية، نقصان الوزن، مع أو بدون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا نشأت لديك هذه الأعراض، **فتوقف عن استعمال ميتفورمين إينوقامد وراجع طبيبك.**
- ردود فعل جلدية، مثل احمرار في الجلد (حمامى)، حكة أو طفح مثير للحكة (شرى).

الأولاد والمراهقون

المعطيات المحدودة بخصوص الأولاد والمراهقين أظهرت أعراضًا جانبية مشابهة في طبيعتها وخطورتها لتلك التي بلّغ عنها لدى البالغين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (**www.health.gov.il**) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، عن أو طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Hypromellose, povidone (K-90), magnesium stearate, macrogol 400, macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

قرص مطلي، مستدير، محذب من كلا الجانبين، أبيض اللون، طُبع "A" على أحد جانبيه وطُبع "61" على جانبه الآخر.

الأقراص مرزومة في شرائط بليستر داخل عبلة كرتونية تحتوي على 30 قرصًا.

المصنّع: أوروبيندو فارما م.رض.، حيدر أباد، الهند.

صاحب الامتياز والمستورد: إينوقامد م.رض.، ص.ب. 62، إيثن يهودا.

خُربت النشرة في آب/أغسطس 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 162-59-35148.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.