

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

**پاكسلوفيد™
أقراص مطلية**

يحتوي پاكسلوفيد على نوعين من الأقراص مع المواد الفعالة التالية:

- يحتوي كل قرص مطلي وردي على:
نيرماتريلفير 150 ملغ nirmatrelvir 150 mg
- يحتوي كل قرص مطلي بلون أبيض حتى كريمي (off-white) على:
ريتونافير 100 ملغ ritonavir 100 mg

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف من أجلك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

پاكسلوفيد معدّ لعلاج مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) المُشخّص لدى البالغين الذين لا يحتاجون إلى إضافة أكسجين والذين هم معرضون لخطورة متزايدة لحدوث تفاقم إلى مرض كوفيد-19 شديد.

المجموعة العلاجية: مضاد للفيروسات.

مرض كوفيد-19 ينجم عن فيروس يُسمى فيروس كورونا. يوقف پاكسلوفيد تكاثر الفيروس في الخلايا، الأمر الذي يمنع تكاثر الفيروس في الجسم. يمكن لذلك أن يساعد الجسم على التغلب على العدوى الفيروسية، ويمكن أن يمنع تطور مرض خطير.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمواد الفعّالة نيرماتريلفير، ريتونافير أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية، فإن تناول پاكسلوفيد مع هذه الأدوية قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية شديدة أو تشكل خطرًا على الحياة أو يؤثر على عمل پاكسلوفيد:
 - ألفوزوسين (لعلاج أعراض تضخم البروستاتا)
 - رانولازين (لعلاج آلام الصدر المزمنة [الذبحة الصدرية])
 - درونيدارون، پروپافينون، كينيدين (لعلاج أمراض القلب وتصحيح نظم القلب غير المنتظم)
 - ريفامبيسين، ريفاننتين (لعلاج حالات العدوى الجرثومية)
 - أبلوتاميد، إنز الوتاميد، نيراتينيب، فينيتوكلاكس (لعلاج السرطان)
 - كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيتوئين، پريميدون (لمنع والسيطرة على الاختلاجات)
 - كولشيسين (لعلاج النقرس)
 - تيرفينادين (لعلاج الحساسية)
 - كاربيرازين ولوراسيدون (لعلاج الفصام)
 - پيموزيد، كوينيابين (لعلاج الفصام، اضطراب ثنائي القطب، اكتئاب شديد وأفكار أو مشاعر غير عادية)
 - سيلودوسين (لعلاج تضخم غدة البروستاتا)
 - إيليرينون، إيفابادين (لعلاج مشاكل القلب و/أو الأوعية الدموية).
 - ثنائي هيدروأرجوتامين وإرجوتامين (لعلاج حالات الصداع نتيجة الشقيقة)
 - إرجونوفين وميثيل إرجونوفين (يستعملان لوقف النزيف المتزايد الذي قد يحدث نتيجة الولادة أو الإجهاض)

- سيسايريد (لتخفيف بعض مشاكل المعدة)
- St. John's wort (هيبيريكوم بيرفوراتوم) (مستحضر عشبي يستعمل لعلاج الاكتئاب والقلق)
- فوكلوسبورين (لعلاج اضطرابات مناعية)
- لوقاستاتين، سيمفاستاتين، لوميتايد (لخفض الكوليسترول)
- إلتريبتان (لعلاج حالات صداع الشقيقة)
- لوماكافور/إيفاكافور (لعلاج التليف الكيسي)
- فينبرون (لعلاج مرض الكلى المزمن المرتبط بمرض السكري TYPE II)
- نالوكسيجول (لعلاج الإمساك نتيجة استخدام المواد الأفيونية)
- أفانافيل، فاردينا فيل (لعلاج مشاكل الانتصاب [المعروف أيضًا بالعجز الجنسي])
- سيلدينافيل، تادالافيل (لعلاج مشاكل الانتصاب [المعروف أيضًا بالعجز الجنسي] أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي [ضغط دم مرتفع في الشريان الرئوي])
- كلورازيبات، ديازيبام، أسيتازولام، فلورازيبام، تريازولام، ميدازولام عن طريق الفم (تُستعمل لتخفيف القلق و/أو مشاكل النوم)
- تولفاپتان يستخدم لعلاج نقص صوديوم الدم (انخفاض مستويات الصوديوم في الدم)

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- **ردود فعل تحسسية** - بما في ذلك ردود فعل تحسسية شديدة (المعروفة باسم 'تأق') و ردود فعل جلدية شديدة (المعروفة باسم 'انحلال البشرة النخري السمي' [toxic epidermal necrolysis] و'متلازمة ستيفنس-جونسون' [Stevens-Johnson syndrome])، يمكن أن تحدث لدى الأشخاص الذين يتناولون باكسلوفيد، حتى بعد تناول جرعة واحدة فقط. توقف عن تناول باكسلوفيد واتصل بالطبيب على الفور إذا ظهرت عليك أي من علامات الحساسية التالية:

- صعوبة في البلع أو التنفس
- انتفاخ اللسان، الفم والوجه
- تضيق في الحنجرة
- بحة في الصوت
- حكة
- طفح جلدي
- احمرار وألم في الجلد
- حويصلات وتقرح الجلد
- حويصلات أو تقرحات في الفم أو الشفتين

- **خطورة لتطوير مقاومة لفيروس HIV-1** - إذا كانت لديك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية HIV غير معالجة و/أو غير مضبوطة، فقد يؤدي باكسلوفيد إلى عدم عمل بعض الأدوية لـ HIV بنفس القدر في المستقبل.

قبل العلاج بـ باكسلوفيد، أخبر الطبيب إذا:

- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي **مرض كبد**. حدثت اضطرابات في إنزيمات الكبد، التهاب الكبد (hepatitis) ويرقان لدى المرضى الذين تلقوا ريتونا فير.
- يوجد لديك أو كان لديك **مرض في الكلى**.
- يوجد لديك **ضغط دم مرتفع**. قد يحتاج الطبيب إلى فحص ضغط دمك قبل تناول باكسلوفيد وأثناء تناوله لهذا الدواء. كانت هناك تقارير عن ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون باكسلوفيد، وخاصة لدى كبار السن.

الأطفال والمراهقون

يُمنع إعطاء باكسلوفيد للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لأنه لا توجد معلومات بشأن سلامة وفعالية الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

هناك أدوية أخرى يُمنع تناولها مع باكسلوفيد. انظر البند 'يُمنع استعمال الدواء إذا'. كذلك أخبر الطبيب أيضًا إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. بالأخص أخبر عن:

- الأدوية المستعملة لعلاج السرطان، مثل أفاتينيب، أيماسيكليب، سيريتينيب، داساتينيب، إنكورافينب، فوستاماتينيب، إبيروتينيب، إيفوسيدينيب، نيلوتينيب، فنبلاستين وفينكريستين
- الأدوية المستعملة لتميع الدم (مضادات التخثر)، مثل وارفارين، ريفاروكسابان، دابيجاتران وأيكسابان
- الأدوية المستعملة لعلاج الاختلاجات مثل ديفالبروكس، لاموتريجين وكلونازيبام
- الأدوية المستعملة للإقلاع عن التدخين مثل بوپروبيون
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات الحساسية مثل فيكسوفينادين ولوراتادين
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات العدوى الفطرية (مضادات الفطريات)، مثل إيتراكونازول وفوريكونازول
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات العدوى الطفيلية، مثل البيندازول
- الأدوية المستعملة لعلاج متلازمة كوشينج - عندما ينتج الجسم كمية زائدة من الكورتيزول - مثل أقراص كيتوكونازول.
- الأدوية المستعملة لعلاج عدوى HIV، مثل إيفافيرينز، مارافيروك، رالتيفير، زيدوفودين وبيكتيفير/إمتريسيتابين/تينوفوفير
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات العدوى (مثل المضادات الحيوية ومضادات المتفطرات)، مثل أتوفاكون، كلاريتروميسين، إريثروميسين، حمض الفوسيديك (بالإعطاء عن طريق الفم أو عن طريق الوريد IV)، بيداكولين، ريفابوتين، ديلمانيد وسلفاميثوكسازول/تريميثوبريم
- الأدوية المستعملة لعلاج الفصام والأفكار أو المشاعر غير العادية، مثل كلوزابين
- الأدوية المستعملة لعلاج الاضطرابات النفسية أو المزاجية، مثل هالوبيريدول، ريسبيريدون وثيوريدازين
- الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية الرئوية، مثل بوسنتان وربوسيجوات
- الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)، مثل أملوديبين، ديلتيازيم، فيلوديبين، ليركانيديبين، نيكارديبين، نيفيديبين وثيراباميل
- الأدوية المستعملة لعلاج مشاكل القلب و/أو الأوعية الدموية، مثل أليسكيرين، تيكاجريلور، سيلوستازول وكلوبيدوجريل
- الأدوية المستعملة لعلاج أمراض القلب وتصحيح عدم انتظام ضربات القلب، مثل ديجوكسين أميودارون، فليكانتيد وديسوپيراميد
- أدوية لعلاج التليف الكيسي، مثل إيفاكافتور، إلكساكافتور/تيزاكافتور وإيفاكافتور
- الأدوية المستعملة لعلاج مرض السكري مثل ساكساجليبتين
- الأدوية المستعملة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي (التهاب الكبد C)، مثل جلبيكابريفير/بيبرينتاسفير وسوفوسفير/فيلپاتاسفير/فوسيلابريفير
- الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول في الدم، مثل أتورفاستاتين، فلوفاستاتين، پرافاستاتين وروسفاستاتين.
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات صداع الشقيقة مثل ريمجيبانت
- الأدوية المستعملة لعلاج سلس البول، مثل داريفيناسين وسوليفيناسين
- الأدوية المستعملة لعلاج المشاكل النفسية، مثل أريبيرازول وبريكسبيرازول
- الأدوية المستعملة لتثبيط الجهاز المناعي، مثل سيكلوسبورين، إيفيروليموس، سيروليموس وتاكروليموس
- الأدوية المستعملة لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الصدفي أو التهاب القولون التقرحي، مثل توفاسيتينيب وأپاداسيتينيب
- الأدوية المستعملة لعلاج الألم الشديد، مثل مورفين، فنتانيل، أوكسيكودون، ميتادون، بوپرينورفين، أدوية أخرى شبيهة بالمورفين، بيتيدين وبيروكسيكام
- الأدوية المستعملة كأدوية مهدئة، منومة وتحت على النوم مثل ألپرازولام، بوسپيرون وزولبيديم
- الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب نقص الانتباه أو اضطراب النوم المسمى النوم الانتبائي، مثل أمفيتامينات
- ستيروئيدات بما في ذلك الكورتيكوستيروئيدات المستعملة لعلاج الالتهاب، مثل بوديزونيد، ديكساميثازون، فلوتيكاسون، بريدنيزولون وتريامسينولون
- الأدوية المستعملة لعلاج الربو والمشاكل الأخرى المتعلقة بالرئتين مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، مثل سالميتيرول وثيوفيلين
- الأدوية المستعملة لعلاج الاكتئاب مثل أميتريبتيلين، فلوكتستين، إيميپرامين، نورتريبتيلين، پاروكستين وسيرترالين
- الأدوية المستعملة كعلاج بدائل للغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين
- الأدوية المستعملة لعلاج تضخم البروستاتا، مثل تامسولوسين
- أي من الأدوية التالية:
 - وسائل منع الحمل الفموية أو اللصقة التي تحتوي على إيثينيل إستراديول المستعملة لمنع الحمل
 - ميدازولام بالحقن (يُستعمل للتهديئة/للتركين [حالة بقضة لكن هادئة جدًا من السكون أو النعاس أثناء القيام بفحص أو إجراء طبي] أو تخدير)

لـ باكسوفيد ردود فعل بين الأدوية مع العديد من الأدوية. احتفظ بقائمة أدويةك لعرضها على الطبيب أو الصيدلي. لا تبدأ بتناول دواء جديد دون إخبار الطبيب. يمكن للطبيب أن يقدم لك استشارة إذا كان من الأمان تناول باكسوفيد مع أدوية أخرى.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول باكسلوفيد مع أو بدون الطعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، تعتقد أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل تناول الدواء. لا توجد معلومات كافية عن أن باكسلوفيد آمن للاستعمال أثناء الحمل. إذا كنت حاملاً، فلا يُوصى باستخدام باكسلوفيد إلا إذا كانت حالتك الطبية تتطلب هذا العلاج.

يُوصى بتجنب النشاط الجنسي أو استعمال وسيلة لمنع الحمل أثناء تناول باكسلوفيد ولمدة 7 أيام بعد انتهاء تناول باكسلوفيد كإجراء وقائي. إذا كنت تستعملين وسائل هرمونية لمنع الحمل، فمن الموصى به استعمال الواقي الذكري أو غيره من وسائل منع الحمل غير الهرمونية الأخرى، لأن باكسلوفيد قد يقلل من نجاعة وسائل منع الحمل الهرمونية. سوف ينصحك الطبيب بشأن مدة الملاءمة اللازمة لوسائل منع الحمل.

تنتقل كمية صغيرة من باكسلوفيد إلى حليب الأم. كإجراء وقائي، يُمنع إرضاع رضيعك أثناء تناول باكسلوفيد ولمدة 48 ساعة بعد انتهاء تناوله.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يكون لباكسلوفيد تأثير على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي باكسلوفيد على لاكتوز - إذا قيل لك من قبل الطبيب أنّ لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل استعمال المستحضر.

يحتوي باكسلوفيد على الصوديوم - تحتوي كل من أقراص نيرماتريلفير وريتونافير على كمية أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم لكل جرعة، مما يعني أنها تعتبر 'خالية من الصوديوم'.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

الجرعة وطريقة الاستعمال المتبعة عادة هي:

يتكون باكسلوفيد من دوائين: نيرماتريلفير وريتونافير. الجرعة الموصى بها هي قرصين من نيرماتريلفير (أقراص وردية) مع قرص واحد من ريتونافير (قرص أبيض) عن طريق الفم، مرتين كل يوم (صباحًا ومساءً).

يحتوي كل شريط (بليستر) على 4 أقراص نيرماتريلفير (150 ملغ كل واحد) وقرصين ريتونافير (100 ملغ كل واحد) ووصف الأقراص التي يجب تناولها في الصباح وفي المساء (وفقًا لألوان الخلفية المختلفة). مدة العلاج 5 أيام. لكل جرعة، يجب تناول الأقراص الثلاثة معًا في نفس الوقت.

إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن بعد 5 أيام، استشر الطبيب.

إذا يوجد لديك مرض في الكلى، يرجى التحدث مع الطبيب حول تلقي جرعة باكسلوفيد الملائمة.

يجب بلع القرص كاملاً مع الطعام أو بدونه. يُمنع مضغ، شطر أو سحق الأقراص لأنه لم يتم فحص تأثير الإعطاء بهذه الطريقة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا تناولت جرعة أعلى من باكسلوفيد أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت تناول باكسلوفيد

إذا فاتتك جرعة من باكسلوفيد في نطاق 8 ساعات من الوقت المعتاد لتناولها، تناولها بمجرد أن تتذكرها. إذا فاتتك الجرعة لأكثر من 8 ساعات، تخط الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. يُمنع تناول جرعتين من باكسلوفيد في نفس الوقت.

يُمنع تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول باكسلوفيد

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحيّة، يُمنع التوقّف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال باكسلوفيد أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1-10 مستعملين من بين 100):

- إسهال
- تقيؤ
- غثيان
- تغير في حاسة التذوق (مثل طعم معدني، مر)
- صداع

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

- رد فعل تحسسي
- ضغط دم مرتفع
- ألم بطن
- ألم عضلات
- طفح في الجلد (تم الإبلاغ عنه أيضًا كجزء من رد فعل تحسسي)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

- رد فعل تحسسي شديد يعرف باسم 'تأق' (مثل انتفاخ اللسان، الفم والوجه، صعوبة في البلع أو التنفس، تضيق الحنجرة أو بحة في الصوت)
- ردود فعل جلدية خطيرة تعرف باسم 'انحلال البشرة النخري السمي' [toxic epidermal necrolysis] و'متلازمة ستيفنس-جونسون' [Stevens-Johnson syndrome] (مثل احمرار وألم في الجلد، حويصلات وتقرّح الجلد، حويصلات أو تقرحات في الفم أو الشفتين).
- شعور عام سيء
- حكة (تم التبليغ عنها أيضًا كجزء من رد فعل تحسسي)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا توجد شروط تخزين خاصة. يوصى بالتخزين في درجة حرارة الغرفة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

قرص نيرماتريلفير:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, sodium stearyl fumarate

طلاء (Opadry Pink):

HPMC 2910/Hypromellose, titanium dioxide, macrogol/PEG, iron oxide red

قرص ريتونافير:

copovidone, calcium hydrogen phosphate, sorbitan laurate, sodium stearyl fumarate, silica, colloidal anhydrous, ethanol (It will not appear in the final product except in trace)

طلاء (Opadry white):

HPMC 2910/Hypromellose 6cp (E464), titanium dioxide (E171), macrogol /PEG, MW 400 (E1521), hydroxypropyl cellulose (E463), talc (E553b), macrogol/PEG, MW 3350, MACROGOL 4000 (E1521), silica, colloidal anhydrous (E551), polysorbate 80 (E433)

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

تحتوي عبوة باكسلوفيد على 30 قرصًا مطلقًا مقسمة في 5 لوائح شريطية (بليستر) معبأة في كرتون.

يحتوي كل شريط على 4 أقراص نيرماتريلفير (150 ملغ كل واحد) وقرصين ريتونافير (100 ملغ كل واحد) ووصف الأقرص التي يجب تناولها في الصباح وفي المساء (وفقًا لألوان الخلفية المختلفة).

قرص مطلي من نيرماتريلفير 150 ملغ: قرص وردي، ببيضاوي الشكل مع ختم 'PFE' على جانب واحد و- '3CL' من الجانب الآخر.

قرص مطلي من ريتونافير 100 ملغ: قرص ذو لون أبيض حتى كريمي (off-white)، على شكل كبسولة مع ختم 'H' على جانب واحد و- 'R9' على الجانب الآخر.

صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض.، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتوواح 46725.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 175-58-37720-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

تم تحريرها في 09/2025