

АКАМОЛ Тева Каплеты

Состав

Каждая каплетта содержит:

Парацетамол 500 мг (Paracetamol 500 mg)

Для информации о неактивных и аллергенных ингредиентах см. раздел 2 "Важная информация о части ингредиентов, содержащихся в препарате" и раздел 6 - "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Данный препарат (в широкой продаже) не нуждается в рецепте врача и предназначен для взрослых и детей от 12 лет и старше. Применять препарат в соответствии с указаниями в разделе 3 данной инструкции. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации.

Обратитесь к врачу, если повышенная температура сохраняется более 3-х дней, или если симптомы ухудшаются или не прекращаются в течение 5 дней, несмотря на прием препарата.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Препарат предназначен для облегчения боли и понижения температуры, вызванных различными причинами, такими, как: головная боль, зубная боль, простуда, грипп, ревматическая боль и менструальная боль.

Фармакологическая группа:

Анальгетик и жаропонижающее средство.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Не применяйте данный препарат, если:

- Вам известно о чувствительности к парацетамолу или к одному из ингредиентов препарата - см. раздел 6 "Дополнительная информация".

Особые предостережения относительно применения препарата

• **Не принимайте дополнительные препараты из "семейства Анамол" и/или дополнительные препараты, содержащие парацетамол**

• Если в прошлом у Вас были кожные побочные явления в результате приема препаратов, содержащих парацетамол, не принимайте препараты, содержащие парацетамол, во избежание возникновения повторных тяжелых поражений кожи • Препарат содержит парацетамол, который может привести к поражению печени, если: • применяется в дозах, выше рекомендуемых, или продолжительный период времени • в период приема препарата употребляются алкогольные напитки • принимаются дополнительные препараты, влияющие на функцию печени • Не применяйте препарат часто без консультации врача • Во избежание передозировки или отравления парацетамолом не следует принимать дополнительные жаропонижающие и болеутоляющие или противовоспалительные препараты, не проконсультировавшись с врачом или фармацевтом • Следует избегать приема больших доз препарата (в пределах рекомендуемых) в период соблюдения поста.

Перед началом приема препарата посоветуйтесь с врачом, если Вы страдаете или страдали в прошлом:

- Чувствительностью к какому-либо продукту питания или к какому-либо лекарственному препарату • Заболеванием печени или нарушением функции печени • Нарушением функции почек
- Алкоголизмом • Желтухой • Если Вы беременны или кормите грудью.

При применении этого лекарства немедленно сообщите врачу, если: у Вас есть серьезное заболевание, включая тяжелую почечную недостаточность или сепсис (состояние, при котором бактерии и их токсины попадают в кровоток и приводят к повреждению органов), недоодевание, хронический алкоголизм или если Вы также принимаете флуоксациллин (антибиотик). У пациентов с этими заболеваниями, длительно принимавших парацетамол в обычных дозах или в сочетании с флуоксациллином, наблюдалось серьезное состояние, называемое метаболитическим ацидозом (нарушением состава крови и биологических жидкостей). Симптомы метаболитического ацидоза могут включать: серьезное затруднение дыхания с глубоким и учащенным дыханием, сонливость, тошноту и рвоту.

Взаимодействие лекарственных препаратов

Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. В особенности, если Вы принимаете:

- Антикоагулянты, такие, как варфарин • Препараты, стимулирующие синтез печеночных ферментов (например: рифампицин, барбитураты) • Противозипелитические препараты – фенитоин, карбамазепин • Нестероидные противовоспалительные препараты • Метоклопрамид или домперидон (для лечения тошноты, рвоты и других проблем пищеварения) • Хлорамфеникол (антибиотик) • Пробенецид (для лечения подагры) • Холестирамин (для снижения избытка липидов в крови) • Флуоксациллин (антибиотик), вследствие серьезного риска нарушений в крови и жидкостях организма (это расстройство называется метаболитическим ацидозом), требующих срочного лечения (см. раздел 2).

Применение парацетамола и употребление алкоголя

Во время приема парацетамола не следует употреблять алкоголь из-за повышенного риска поражения печени.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Беременность

Следует принимать минимальную дозу, являющуюся для Вас эффективной, для утления боли и/или понижения температуры, в течение как можно более короткого периода времени. Посоветуйтесь с врачом, если нет облегчения боли или температуры, или если Вам необходимо принимать препарат чаще.

Кормление грудью

Небольшие количества парацетамола попадают в материнское молоко, следует посоветоваться с врачом перед применением.

Вождение транспортного средства и использование механизмов

Парацетамол не влияет на способность водить автомобиль или использовать механизмы.

Применение препарата детьми

Данный препарат в широкой продаже предназначен для приема взрослыми и детьми от 12 лет и старше.

Родителям следует сообщить лечащему врачу обо всех побочных явлениях, а также о любом дополнительном препарате, принимаемом ребенком.

Важная информация о части ингредиентов, содержащихся в препарате

Данный препарат содержит менее 23 мг натрия в каплетте, и поэтому считается "без натрия".

3. НАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы не уверены относительно дозировки и режима лечения препаратом.

Рекомендуемыми дозами при отсутствии других указаний врача являются:

Взрослые и дети от 12 лет и старше:

1-2 каплеты каждые 4-6 часов, по мере необходимости.

Не превышайте дозу в 8 каплет (4 грамма) в течение суток.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Если повышенная температура сохраняется более 3-х дней, или если симптомы ухудшаются или не прекращаются в течение 5 дней, несмотря на прием препарата, обратитесь к врачу.

Способ применения

Нет информации об изменении и пережевывании. Каплеты можно разделить надвое по разделительной черте.

Глотать препарат с небольшим количеством воды.

Если Вы превысили дозу, или если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача! Даже при хорошем самочувствии немедленное лечение необходимо **из-за риска развития тяжелого повреждения печени.** Возможные побочные явления из-за передозировки: тошнота и рвота, диарея, потеря аппетита, боль в животе, вздутие, чрезмерная потливость, боль или чувствительность в верхней части живота, и они могут не отражать тяжести поражения печени.

Не принимайте препараты в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым препаратом, применение Анамола может вызывать побочные явления, такие, как головокружение у части пациентов.

Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них. Побочные явления могут быть более тяжелыми у пожилых людей.

Тяжелые побочные явления:

Прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу:

- Если появились тяжелые аллергические реакции, такие, как сыпь и зуд, отек лица, губ, языка, горла, которые могут вызвать затруднения дыхания или глотания и/или отек конечностей
- Если появились в редких случаях тяжелые кожные заболевания, признаками которых могут быть: покраснение, сыпь, волдыри, обширное повреждение кожи. Тяжелые кожные побочные явления могут возникнуть, даже если у Вас не было никаких проблем в прошлом при приеме препаратов, содержащих активное вещество парацетамол. При появлении кожных побочных явлений прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу • Если появились признаки изменений в кровеносной системе, такие, как: кровотечения, легко возникающие кровоподтеки (синяки), продолжительная усталость, повышенная склонность к развитию инфекции (например, боли в горле) в результате резкого снижения числа лейкоцитов

• Если возникла одышка (редко) • Если появляются проблемы с дыханием. Это может случиться с большей вероятностью, если в прошлом Вы испытывали проблемы с дыханием при принятии других обезболяющих, таких, как ибупрофен и аспирин • Если появляются тошнота, резкое снижение веса, потеря аппетита и пожелтение белков глаз и кожи

• Если у тяжелобольных пациентов, принимающих данный препарат, развивается тяжелое состояние, называемое метаболитическим ацидозом, которое может привести к повышению кислотности крови (см. раздел 2). Частота возникновения этого побочного эффекта неизвестна (частота не может быть оценена на основании имеющихся данных).

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

Отчет о побочных явлениях

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или зайдя по ссылке:

<http://sideeffects.health.gov.il>

5. НАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат после истечения срока его годности (Exp. Date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

- Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°С.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Microcrystalline cellulose, Maize starch, Povidone, Croscarmellose sodium, Talc, Silica colloidal anhydrous, Magnesium stearate.

Как выглядит препарат и назово содержимое упаковки:

Удлиненная таблетка (каплетта) белого цвета, с разделительной чертой на обеих сторонах.

Каплеты упакованы в блистерную упаковку (лоток) содержащую 10 каплет или во флакон, содержащий 16 каплет.

Возможно, что не все виды упаковок будут в продаже.

Производитель и Владелец лицензий и его адрес:

ТЕВА Израиль Лтд., Двора Ха-Невия 124, Тель-Авив 6944020

Данная инструкция откорректирована в октябре 2025.

Регистрационный номер препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения:

176.61.37219

teva

ACAMTEV GSL ULM-KS PL SH1025